


NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



J. Munsie

II Pas

227 pp + 3 p.d.
40 pp



Tractatus
Morborum Infantium
Cum observacib; practiis
et curacib; eorundem,
Quem scripsi

sub D. Laxerme in montepell.^{und}
Universitate antecessore legis.

anno 1737

Dapieux

Handwritten text, likely a title or header, possibly "Lettres"

Handwritten text, possibly a list or index, including "Lettres de M. de M..."



Handwritten text, possibly a signature or a date, including "1711"

*Index morbor. pueror.
ordine alphabetico.*

*7^a Numerus romanus, Cuiusmodi, Latinus vero, historia
morborum paginam designat.*

Sol. Cuiusmodi

mor. historia

177...	alvi obstructio	pag. 41.
173...	alvi profluvium	33.
clxxix.	ani decidentia	45.
clxxviii.	achores	60.
ccii...	apha	117.
clxxviii.	Colicæ dolor.	23.
clxxviii.	Crusta lactea	60.
cxci.	Convulsio	83.
cxviii.	Calculus vesicae urinaria	102.
clxxi.	Dentitio difficilis	31.
clxxix.	decidentia ani	45.

*Ea ̄ Superveniunt infanti post exitum
ē Sinu materno*

cxv.	epilepsia	91.
clxxviii.	favus	60.
clxx.	hernia	48.
cxc.	hypochondriorum inflatio	78.
cxci.	hydrocephalus	106.

Index morborum puerorum.

morb. curao

morb. historio

clv....	Incommoda graviditatis	pag. 1.
clxxxi....	Inflammas umbilici	33.
clxxxii....	Intertrigo	34.
clxxxvii....	Lumbria	69.
ccxviii....	Morbilli	140.
ccxxi....	Macies	146.
ccxcii....	Motus convulsivi	83.
clix....	Periculi partus	4.
clxxxvi....	Phthiasis	67.
ccci....	Rachitis	113.
clxv....	Singultus	19.
ccxcvii....	Strabismus	99.
clxxviii....	Formina ventris	25.
clxxxv....	Tinea	64.
cciii....	Tonillarum inflammas	117.
ccxliii....	Tumores thumori	148.
clxxv....	Vomitus	19.
clxxxi....	Umbilici proidentia et inflammas	33.
ccxc....	Ventris et hypochondriorum inflammas	78.
ccxcviii....	Urina incontinentia	102.


Index mbor. pnesor.

mbo. curao.

mbo. historia

cciii...	Vesicula gingivar.	pag-117.
ccv....	Variola	124.
ccxxi...	Variola lymphatica	144.
clxxviii.	Ventris tormina	25.
cxc....	Ventris latio	75.
clxxv....	Vomitur	19.
clxxxi....	Vomibili procidentia	35.
cxcviii.	Vesica urinaria Calculus	102.

Finis



1

Tractatus pathologicus
De
morbis Infantium

Nullibi parit mibi tyrannis et imperium:
alibi eni atas lenusq; ois communi involuit
affectum et morum conditio, iuq; reum —
natos pariter adoriunt. Si. —

Caput ium
De incommodis graviditatis.

Coniugalit amoris, venas utriusq; resolvunt,
vixq; port. Legitimos amplexus, lemnalis ausu-
ptuula iniquiter Conglascunt, ut plerumq; —
libra suboriente, quales et multas Colorem viridi
facies, in pallentem, fuscum, viridem, aliaq;
nubacula, prothas appetitum, v. ejusd, deparas;
nausea, vomitus, Colicis Dolores, tormina intestinov.
Mox succedunt capitis gravitas, praecordiorum
constictio, ophthalmia, ai Soliquia, Dolores —
Inguinum, tenax, inflammatio mammarum,

Corporis membrorum, impotentia ad motum
hemorrhoides, suppuris, tandem ea quodq. ingravescunt
ultrinis gestationis typis symptomata, neq. ulla
peragenda quis, nisi scilicet scitu: interdum 6. m.
mense sponte evadescunt accidentia.

Cause

Duplicem itaque causam ad hunc modum gravidam
determinanda symptomata, comparata judicamus.
Impeditur semper quibus ventri; effluxum,
atq. insolitam molem fetus, secundinarum,
in pte. atmodum. Similes viæ excretionis, quorum
agentis modum aperit. uadebit symptomatica solutio.
1.º Siq. menstruum suppresio, & solenne
quasi (Ceteris consentientibus) gravidam habet
signum, ita crassa & fluidor. massa, ut in
vacuulis oib. prae se modum redundaverint, itq.
habita tamen portio ad maj. v. mix. jala
derivacem, ex viciniori Communicatione immediata,
lymphatica & Conseru. oriundam, insolito modo
turgescant distendant, unde Magna, tarditas Quor.
In variis gestibus, menstruis, et Ceteris portio
appetit.

appetit^{is}, nausea, vomitus, et tormina intestina^{lis}.
Cum ab eadem Causa impediatur solitus liquorum
effluxus, scilicet pituita gastrica intestinalis, et
juvant et efficiunt digestionem.

2^o magis trahuntur ad repletio uterinorum et
mammariorum vasculorum, et contra sensibiles
inflatio mammarum, et gravium earum pondus, ob
paratum horum organorum Contractum, quo
reflectentes unde, versis utraque, litore uberior
et facilius diffunduntur.

3^o tandem ob molem et intumescenciam
ab illi sequuntur hyemis fluctus, qui augent
Cohesionem molecularum Componentium, et magis
approximate resistit systemati arterioso quam prius
difficilius Exsimitur ex tractu arteriarum
in venas; neque cumulat et Congerit in
auriculis et Sinibus, unde Exartimio, et
animi Defectio, et frequentis Ingravitate
Declaratur.

4^o et ita adeo insolita vasculorum turgescit
atque Coniungi Cum tenacitate Liquidorum, quia
nulla organa magis et minus se praevident
tenacitate, et uberior in eadem appulsa liquorum

4
patiens. hinc modo caput, inter alia pulmones,
gravantis et opprimunt, atq. determinant, v.
Capitis gravitas, Cephalalgia, v. spiritus contentio
orthopnea &c. —

3.^o hae causas kinethomata de Suppressionis
Catamenii, et inundante Cruore uterino —
oriunda fore, suadesa videtur hydraulica Sagg
fluidorum lusus, et communis experientia quā
Congrat. Ovari cessaturum malorum fontem,
dum Ovari de Ovari infans, insumendo
humoris uterini redundantie Congrat. fit. —

6.^o alia vō' supervenire solent, a potius exse
ctis fctis, moli et Compressioni aquarum —
tribuenda est, etiam in maj. extendi requit —
molem, quae vasa haemorrhoidalibus j. mō' stram
mesenterici inferiores comprimant et angust
ent, unde vasis in vasculis anis, tenemus, —
aliaq. dicitur supervenire ex Subsequentia. —

7.^o angustatis et Compressis ductibus hypogastricis
haemorrhoidalibus, mesentericis, angustis necessario
mole liquoris in tractu venoso aptis j. inferioribus
reductis, quā retardatis ejusdem cursus p. radices
ad Carum tendentes, simulq. tota promittit —

3

Lymphaticorum prole, cuius pressiois momentum
sequitur torpor, grauiditas, etiam, pedum, eorumque
intumescencia.

8.^o Termina ventris, anxietate, uterinatensis
et virilia incommoda pro diebus inuenerunt, ob-
ulteriorum fibris aduersis, vasculis, quibus et
Lymphaticis, illatum distensionis turgescencia
et Compressionis Stimulum: hoc aem amemorato
Fonte repetenda fore Symptomata adeo verum-
e, ut nullis sedentis et Compressantis remediis,
seditumque, et viis, quo magis pariter urget typus,
renouare solent.

Diagnosis

Incautis Lepius inponit grauiditas, ipsiq;
frequenter adscribunt mala a Diuersis et
opportuna agnosunt Causam, dum perita-
alia inuenerimus a se salus Conceptionis
et ductus adeoq; nequaquam proceps inferenda
e iudicium in stabilienda grauiditate, quippe
unum et alterum Symptoma rem Comporre
requirit, et oia simul Colligenda et, ut suppressio
mens tuor. inflatio mammar. nausea, vomitus

6
Depressas appetitus diutius Continuata, et —
praesentia clausio orificii uteri, & Dubium ut
Excludit; tunc vero & incommodis graviditatis
novum pondus adiciat, imo et pregnantibus
fustione, et praeterea, reducenda et ad uterum
et hanc, priores saepius fortuita fit, ut
Sapienter h. alto, perquisita valida uterina regio,
altior et insperata formido, vehementior ac
hanc ventralis impetus, verbo infestum
machinam commovere, et efficaciter invadere
soleret; interna vero tendentia vitio quodam residente
inconteste uteri, & ramis diffundentibus, ut
Laxitate, solutione, schivole. Phlogosi advent
itiam in visceribus vicinis, ut intestinis, hepate,
Lase, vesicula, aliisque, plerumque, oriunda ex emmen
agogis fortibus, et male applicatis, opialibus
actionibus, quodamve stimulo peculiari, per
intervenit sapienter. —

Prognosis

Varia instituenda ut graviditatis praesentia,
pro Diversis Circumstantiis, ut natura uteri

conformasse, robore vasculor. uterinor. rita
et mole infantis; v multiplicate numero:
mulieris tpe antea, discrasia sanguinis, ac trans-
vilitate, hereditaria labe, mali impedimento
tuboris continuati et incrementib., citra o-
mnem iuncturam et fortuito quasi rationari et
medici, sapienter in praxi occurrunt observ-
antes pregnantes a toto gestatu pueri discrasia
fuerunt malis et naali et ingenerata fatu -
exclusioe paritui fugando, dum alia illud bene
se habente tpe, ad ultimas deis redacta fuerint
angustias: ingenerata pronuntiari et, id -
periculatorem fore eventum graviditatis, quo
instant in principio, et continuato, pducunt
graviora mala, ut vomitus continuus qui
nullam sinit demoram, tunc importuna,
tenemus, pregnantium, morbus periculosus e.
si etiam termina pateriturorum, aut fluxus
disentericus, qui ex repetita actione mus ulor?
epigastricor? et violento risu diarragmali;
utrum diutius molestant, hemorrhagia uteri,
avulsio placentae qua pleno vivo maneat -
arteriosus Cruor, et presentem o soluta abortus,

verum etiam et mortis periculum Coniicit.
 Casus vò minus reformidanda sūt, 2.º et 3.º
 Si 3.º q.º mens a remittente, ut p.ºe' h.º
 accidit. — *quis Curas, pag. 155 - 156*

Caput 2.º De periculo partus.

Propter graviditatis incommoda, variis
 facilius eventib, divorsaq, subit dissimina
 matis in partu, ut impotens virum ad
 Pellendum fetus perveniat, viam
 inexplicabilem, Defectum aquarum, transtus
 Laxantium, et precipitem Cavendam Litiem,
 Siccitatem et angustiam, uteri vaginæ Callos,
 adnatos in vicinia, et aliam parvam organi
 Conformacionem, sicut et in bacillo non un
 infantis, foras o rat valide impetentis, —
 litum indebitum quo sufficienti etiam robore
 se expedire nequit, inversiorem funiculi
 umbilicalis, acceleratorem placentæ avulsioem
 Calcitratum, Interpositivum ad interiora serpentes
 et q.º, sepe misera mater chasa soli, victima
 occumbit. hoc æm tractatum nullatenus —

respuentia Commemorare Longius foret, adeoq;
duplii illius simplici homali qd partum naalen
v. Difficilem Comitatu, jactis tere jurat, ex eo in
rengel Schior. et feli. Lacti. qd exeat ad
tum, vascula rupla Squira funduat, ex utro
Coarctatum; 1^o primum et Copiosum, deinde
dilutum et pericoratum, tandem pallidum et
paucum Lochiorum nomine, et variant,
quoad Copiam Duratam pro Diversa Constitutione
purpure, et Lactantis: etenim exortis illa —
intendit ad 8. 10. 12. et 14. Sic Extendit, modo
3^o v. 6^o remittit, aut Supprimat, pro Diversis
Circumstantiis qd q, pleno alveo manat, interrupto
effundit: verumtamen maximi momenti habenda
e memorata Gestis, ut puer et valetudo —
pergraves, effluxus oblitus, qtitate, Copia et
intervallo dependant, totaq, adhaereat therapia
norma, ferendo Contigendo, v. intendendo —
Lochiorum effluxus, quem duplii potissimum
noe, alio qm per e modo processuum opinamur:
1^o insolita Copia ex qtitate, 2^o tunc effluxus
vni Contracto, 3^o tandem interposita
Suppressione —

Causa

plurimis de causis intendi, et Lochiorum
 evacuatio, Dissolutio nimia totius massae
 quibus fervore et exanderentia, et ritanti
 in utero lotharis: haec denique a quacumque,
 Causa provocata fieri potest, perinde ac augere
 repletione vasorum uterinorum, et ipsi et maj,
 fluidi mole distenta, nequaquam coarctari, atque
 Constringi possunt, ut fluxus minuatur, et
 momentum Cruoris ad vasa uterina appellenti
 adeo intendunt, ut eorundem retractionem
 vincant, sique persistet evacuatio, rursus patet Causa
 Dissolutio, et vasu factio, reduendas fore ad
 exalidationem internam et externam, sive per
 decursum graviditatis, sive per partum Laborem
 abrupta fuerint, ad affectus ac, quibus
 nimis Commoventes, ad varias species febrium,
 inflammationum, et Rhegoses, et similia, et o idem
 maj. fluxus determinabunt, verum etiam
 ultra solito terminos extendent. Demum
 supprimunt Lochia, unde fieri memoratis
Causis

Tais Diversimode agentib; adhuc ut ex expositione acri
 frigidiori, humores uterinos subito Condennanti, redund
 antia pravor³ humor³ in iis viis, quæ Spiritus —
 Suppeditati, ita inspissant ea Liquida, ut o
 Solam in variis Igneis, verum etiam et in
 Sympliciter, prorsusq; in secretis et excretis
 subsistant, grumis quibus supertib; et —
 emissaria organi occludentib; compressione
 adventitia v. artificiosa, itum Circumiacentium
 visceris a fluentis, effusum Cohibente. —

Quod attinet ad Tum. Certum e Communiori
 Experientia, duplici v. triplici post partum die,
 quæ peras ex improvise Corripit dolore frigore,
 qd; succedunt Calor, febricula, signaq; incipientis
 inflammationis, a Therba f. c. in Lactea nominati,
 et sollicito tenet, nisi erisum foret ignis ea,
 etiam interdum optato pabulo procedere
 videtur, qd;q; graviores etiam a foris, quæ peris
 viculis Luminem concitat tabar. Denique
 parato sensibilitate ignis tum alter,

Levanti. Hinc insidit, stagnat, Coagulat
 humores Lactei, in mamma Dolore inflamma
 one, suppurat, ulcero, v. incorporatâ methastasi,
 in etiam peculiaris organa, aut Igneis, oreanum,
 equo dein p. rariar pte. Diffundit. —

Dum puer e' nat'ali sede Tetu. caput fuit, et
 quādamtanis p'oprio n'ro vase coarctante et
 testitum, ut intra vasa humores qui prius liberati
 ostio p' oia uteri Contextum ac nutritivum et
 inalecentia fatus Diffunderet, jam decrescentē
 et imminutā vasorū uterinorū Diamet' in
 massam generalem et p'portione Latā h' theoriā,
 lymphomatis . . . et p'asortia versus mammaria
 Capiculis reflexis et, q' uberior' squamis et nuci
 Lymphaticis q'titate tergent et implectis, liq, maj,
 Columnis squamis et p' tubularias vertebrates
 arterias impulsis, affert resistē, unde Dilatō maj,
 Casaliculorū lacteorū, Deviatio succi lymphatici
 et permixtio cum reliquis humorib, fortior retra
 ctio. Odorū inlustrancū quasi Plurimū, et
 Cont' horror, inalecentia, itaq, provia inspira
 ois Lymphomata, majis aut minus Lusata,
 p' q'titate, Caput Lactis permixti Constitutio
 Lactentis, actione visuum attenuantium, et
 aperturā rimulorum e' q' humor effundi. Itā
 nutritivum fatus.

Curtas pag. 139.

3

Capitulum 5^{um}
De iis a supervenire solent
infantibus immediate post
exitum e sinu materno

Innumeram jam relinquimus ad amalectendum
et fovendum statum; qui fletibus et continuis —
placitu misericordiam movet, et auxilium la mat,
simili ac jam caput statit: etenim inarupto —
lumine, illapso fluidi aeris & raris tracheam,
actionem minus, qui piane inquirant, imple-
re conit, et injuriis externis, diversâ circumstancie,
& potissimum mechanici, & papaveris stimulis —
revelantur et inicitur, plerumque ex dato ad humanam
vitam aditu et proprio obitu malis, ut nausea,
vomitus, convulsio, singultus, stertitatio,
pervigilio, febris, et aliis terream machinam aeris
opprugnantibus: hoc aem, nisi ad fuerit peculiare
quodam in prope vitium, reducenda est & mechanico
latitante in venticulo et intestinis, seu & madâ
tenaciori quadamtenus flavescens, & magis —
admixta nigricante, a parietibus intestinorum impacta
fistula per gravitatis decursum seruat, aq, ad eam proferens
vicina e infanti, dum aeris appulsi miscela
alteranti elementa, et molecula mucosae, pituitosae
et graviora mala, et pestem ipsam per reorum nati

progre et.

Hinc fieri succedit resor? affectuum illis ab ipsa
nutritione oriunda: sicut em ex debilitate ventriculi,
atonia fibrar? & deturioni natâ indole Sæctis, alimen-
tum illud diffundit? & indebito modo Consequatur, -
perinde e? Conspingit? in maximam gravem resorem
aut varios & varios parietib? ventriculi, fistula
intestinalis, pertinacius adherentes, & omni effluata
vomitus continuos acidum & Dolentes, & putredinem
quendam spirantes, tormina, flatus, Dolores, dysenteriam,
Rejectiones virides, nigricantes, sub. spec? diarrhoea
determinant, & sequis Consequentis insultus epilep-
ticæ, Convulsiones, & motus Convulsivi, uno verbo -
Totius machinæ turbam? in diutius in statu tolerare
nonuit. hinc fit ut ois accisendus Sabor et Cui ad
Puerum nati valitudinem, in diutius remanenti,
glutinosus, Cancrois, qd? asphyxus, strumacina, et -
Intestina repleti, sicut et oligendis nutriti, ac
exacte Conuenientib?, & quælib? expendimus -
artibus.

1^o Diversa e? pro Diversâ regione natos reuente
ex duos tractandi methodus, etiam quæ, his nam
et Itali funiculo umbilicali prius filo ligato,
et mox umbilicum resecto, sicut ap? Brit? in
in utero Contractis, ablutis, tamen pro in -

13
accipiant lentis, calidis et fervent, ut cum ab eis
amictis, vigore evare possint, dein clauso quodam
spore quo vomitu solet regere matrem illam viscidam
necronium dictam, ex his et infanti, pammum
mellis narborensis, interdu cochlear vini, et, parvuli
mamme infanti, offerunt, et ad germani, cataris,
ausili, aliq, repositionalia, elagatum insola, alio
modo se gerunt, quippe statim ab exclusione profund
ius resurgunt infansem in aquam frigidam, ad
robendam ut, ayunt macinam, corp, per foras
laboris, et pinnis externis actiones efficiendo, ita
ut si vividus in aquis agitanti, robustiores, et altioris
ai fore omnino, si contra praeter, paccant, neq, —
motus edant sensibiles, ignaros et imbellis pronun
cent. Deinde e facto revivulo, liquoris cujuspiam spirit
us, cochlearum unum exhibent, quo revivulati, visib
pneumabulis, rixā fardarum apparatu, quā cautela
vulgo acci gibbosi, vari, et alius vitiosis conformationib
deturpatis observant, ut in medicinalibus curis —
contingit.

2^o posito qd infans necronium nequaquam
vixerit, videt labem utero contracta, seu vira
extincta fuerint intellectus et transitu. Cum illud
valet graviora mala jam recepta producere —
duris ois navanda e opera ad illud revivendum,

Sequens igitur paralyti pro.

℞. flor. rosear. ℞. ii. Coq. in aqu. font. ℞. iii.

Dissolv. man. ℞. p. Coct. ex unim. divid.

in 2. Dos. Cupus in statim assidat infant.

Si prior vomitus aut faecum e moveat, -
elapso quodam tempore, altera sumenda e, jure
et dat a maj. tenacitate mas in ventriculo et
intestinis impacta, et graviorib; declaratis -
Symptomatib; ut Continuo clamore, Convulsio
et motus Convulsivis, et humorum refrigeratioe,
faciei pallore, aliisq; similib; prescribi debet vini
emetici ℞i. Cum Cochlear. infus. rosa. et Syr.
globat. gutt. vi. Cum Helle Confect. de hyacinth.
repetendo adhuc leviora qtuata Sactis ad
dilueendam massam et remediis videtur obviare.
..... Cum meconium reiectum fuit et h-
inferiora amandatum, sac tutius exhiberi pot
infanti; circa qd plurima et annotanda; 1.
Circu nuto iterum; 2. Circu naan et indolen
illius humoris.

Quod postulat ad; un. feligunda e mulier,
et ne iniquioris; nec ex tuncati tramentis
et mioris etiam e sufficientem fundunt
Lactis copiam, postiores vo exoreant hucum
et nimis calidum v acriorem, tenella proli

12

provisis inuicem, mammae, inuicem nutritis, -
o ampliores, neq. deperire nimis facile, et o
pinguedine turquantur papillae rotundae et coloris
rubrici soliganti, nisi nutritio benigna fuerit, in
quo cum areola et papilla, sed ad sumum.
Colorem accedunt, independentes etiam a continuata
diutius Lactatione. Comprobat et vulgari, praevia
puerperas et nutritis, memorati experientia, et
Conformationis Tutae mammarum, nutrienda et
multiplicando proli et aptiores, deinde ad
corpulosis attendendo, v. minimus et tenuis
erit plura movet et dicitur in Lactatione p
totum vita decursum duratura, hinc proli -
varis contaminatus affectibus, ut hic venerea,
iuxta huc, rabie, Cancri, chisris, obstructioib. li.
o inquinata mater infanti victima, simul -
Cum nutritione subministrat. imo etta iuxta
vulgarem opinionem Lactis Cum Constitutione
futura infantis affixita, atq. Consensus, ut
illud tpm iam malor. Labem operis vulgus, -
o Luct ex toto rerum o proficuit, in bona -
Continua diutina nutritionis vitia, ut prolix
itatem ad praecundiam, potentiores et iustos d
venere, timulos, ebrietatem alicuius impressionem,
antidii imaginem, magnas mutationes et alia.

Sæpi allatas. qui vni pnt imaginari affectu;
examinanti itaq, parentes multū, et an mania,
ne spiritus, Delirio, melancholico, v quādam floriditā
Laborentati fuerint, et in ipsis defuerint, et
aliunde nutrix junior bonis morib; imbuta, menti
vni fluxum v patiens, et alia id genus superius
allata et memorata habeat, Concedenda ē recens
nata.

¶ Cum spectemus o min attentior matris,
nata et iudoles lactis: siquidem o pauca res
deprendes nutritrix, quas forma venusta, viridis,
laici color et crispis nectis, plenum, ad perfectam
Lactationē paratior, Constituent, et tā internis
neq, lenior obuiis Corum mētē malis, lacq, —
per vna iudoli fundunt: illud tēn Bonum iudica
bit medius, si albius, Dulce, et mēte sit Conuicta,
ita ut nē Crassius, nec tenuius sit, vniq, ad
feliciorem electioem, lac in iudicandū p oculum,
q si iucundius ad natam titillat membranam,
erit bonum, si contra asinus ab eo vellit, malum.
v gutturis a fundenda, siq, angrem; si pro
nis dilabatur, tenuius et aquosum nimis, Crassius
v si nimis atherat, et ex simplici prospectio et
muletioe Lactis in manu pnt ac examine
nutritrix, Lactis mātē, ut felicitas determinat,
vnde et nū auxiliis, Caliditas, asinonia, et
pejos —

rejos Coniuncta, & velanda et apprimé dignosci
 hnt. tandem ne p^{er}nam Deficiat jelectio re
 optimi Lactis, Consulendum novitati, aut vetust
 ati Lactis, si i^o titulo p^{er}uenerit. Cum nimis aquosum
 et fluidum sit, infantera nutrire nequit, Lepusq,
 Diarheam movet, si v^o Crassius extiterit, G^{ro}ri-
 acumit, Crudem ingratat, vasculaq, obstruit.

Caput 4^{um} De vomitu et Singultu

Solemnior et frequentior e in pueris qm in adultis
 utriq, affectus, sive em p^{er} voracitate mag^{is} qm
 p^{er}ate Lactis copiam Inguat, seu illud variis modis
 in debiliore ventriculo alterato et Corrupto, alim
 entum regere, & Singultu Corripit Solent. is t^{em} m^{od}us
 si nulla functione Larice tipatus accesserit, nequaquam
 habendus deterior, Cum sola aetate et robore Rhomachi
 dismutato, verius nempe Quam v^o Decimum mensem,
 sed hic agitur De vomitu aut Singultu in p^{er}stantem
 molestantib, et a causis peculiaribus dependentib,
 Resoluit q^{uod} p^{er} p^{er}sonali, et violenta horum e in
 ventriculo continenti, p^{er} Superiora Reijectis, Cum
 variis agnatis Symptomatib.

Differentia

pretendat inter Discrimina et prore periodico, nisi
rejectioni, Coloret varietate horretorum, sicut et
vitio fugaci ventriculi, v. Cuius in ipso residente

@ auso

Caam proximam vomitus et Inguultus resund
eandem de Censemus, ja subitaneam ventriculi
distentionem, violentamq, orificii praesterni super
oris irritacionem, a Copia nimia Lactis, v. stimulo
oriundam, qd. v. blivm fibrae gastricae, ad incommo-
motum irritanti, v. etiam vasaphrenica, diaph-
agma, et musculi abdominales ja consensum
habenti, ea quippe' dato et anatome jntel memo-
ratis pte lymphatica, ut una gravius afflicta requat,
quis et altera molesta, quippe' siq, Lactent es-
maj, alimonia qtitatem, qm ut a Thomacho
Semi pnt assumserint, v. ingestum Lac novu
qtitate peccaverit, ut tenuitate, avarimonia,
aliq, pende' distenti, summe et violentior
ventriculi ja Contenta actio laborient, et
Contat p superiora rejicienda st, si irritus ovarit
vomendi Conatus, et aliunde' magis laboraverint

vasa phrenica per gastrica, singultus, doleant.
 Et Communiores, tunc vomitur aut singultus
 in infantibus, producentes, tunc et alia accedunt a
 officinam illam inventare solent, quaeque ad internam
 et Externam reducimus.

Causa Externa desumenda est, ex jactu, Corussioe
 Capitis, agitatione insolita Lunabulorum, attentioni et
 defixio obtutu, verus ignem aut solem, stimulo
 externo, ut assiculis involutis, Cistis lintea, et fenellae
 ubi Scleris; Lac stonim impermissis liquidum nervum
 commovendo, et violentius fibras nervosae Accutendo,
 rases reflexus in ventriculum determinant, qui
 accelerati Cunctas, erigunt et tendunt fibras nervosae
 ventriculi, et ad Externam Contentorum adigunt.

Internae vero nominanda est, a in Contentu fibrarum
 ventriculi delitescere possunt, ut schismus, callus, obstru-
 ctio pilori, aliaque, descendunt Lactis verus intestinalis
 fistulam obstitentia, et, variis in quibus observant,
 et e quibus Lac succedunt et Depluant in illud
 viscus, et frequentiora sunt, ut perara indola ruci
 gastrici, tenacitas nimia et Aeris nimia hujusce
 humoris, et propria vi sufficienti ad rejectionem
 ventriculum oppugnare valent, videretur Lac
 alband. Corrupto, memoratum effectum
 potentius adhuc determinant.

Symptomata.

1.^o violenta fieri nequit Quotis Concussio, et intendi musculor? fere' omni actio, quia accelerato liquor. Circuitus, atq. vasa tum congesta tum lymphatica, Impensius turgescant, et distendant. unde Calor Et rubor qui ex vomitu solent declarari, quippe in pueris et pueris spurto sanguine, v. haemorrhagia nasium, cum leviori de lat. fenella, in ocelli machine vascula, dilarent et turgant.

2.^o Nutritio, pervertere nequit protaenalis illa excreto, quia & continuata Concussio atq. dissensio spirituum Quotis, etiam, disiciant et Consumant vires, unde Fatigatio, imbecillitas, imò et ac. deliquium, et urgent in vomitu continuo pueri.

3.^o Indis. Contabescit gastrum, et maie Consumit, ob impeditam reparatorem humorem, quorum magna pars p. superiora effundit, altera vò p. indelito Conecta moto, quini. iuppeditate. ventriculus ex irritatus, aut Laing. tum gastrum nequit, v. male inagratum ad instulam intestinali detrudat.

4.^o Data mai. actioe diaphragmatis, et musculor. abdominalium, magis diemurto et urgentis vires, abdominales, praesertim intestinalia tendula, et p. lavi abdominis fluctantia; et mai. vires excre

20
Dant in molem oppositam & pte annulorum, qui
s' vincant, hinc procedunt varia genera hemicarum,
frequentius in recens natis contingentium, ob laxitatem
ptium. Glidarum. —

h' tandem is adiunguntur anxietate continua, —
vigilie atq; febriles motus, haud dubie deducenda h
Anulo acriori, et Continuitate irritate qd, fibra
res nec violentius quatit, et liquida ea in calidiorum
motum Conitanti. —

Diagnosis.

Latis innotuit mtes, quibus ulla Supplicia sunt
Signa Diagnostica, ea qd, dependent aut s'vrent
Latis, Difficilius Erunt ut interea statuendum e
ingerere communiorum vomitus origines. —
referendam ut jam dictum, ad nimiam Lactis —
Copiam, v' ejusdem depravationem, siquidem alia variis
occurrunt in vitiis medicâ Lati. adeoq; statim —
Examinanda nam Lactis qd in Lano legit, et prendenda
resecto, si tunc nullâ qualitate peccaverit, nulloq;
Contaminato vitio Lactis, sola atonia vortit
v' nimia ingesti q'titas iudicanti, dum v' Coagulationem
Lac, cum maiori flavis aut viscidioribus eliminatis,
veteriores humoris indolem, et pravorum succorum in

Prognosis.

Pro diversis Circumstantiis aut Symptomatibus
 variat in pueris vomitus periculum. Et tamen darsi
 Contigerit, nullamq, aut Sensibilem. Sæpius functionem
 Lesionem adjunctam habeat, Levius judicandus est,
 Scilicet vbi dum Lepus Revertit, vigilæ et motus -
 Febrilis instat, major Comitatus. porro nullius
 quæsi momenti habendus est ille vomitus in quo
 nec sic alteratæ reperiunt, neq, violentis in fan-
 tatis Convulsioib, dum summan pro salute
 mentis formidinem, rejectis alimentis Coagulatis in
 grumis, vbi præterea cum magis fatentibus biliosis,
 acidumq, Corruptione spirantibus, et major adme-
 perandis periculum, si nigricantia Urinentur,
 Lemius variandum est. Ventus pro Duræ et
 Constitutione infantis, qui tamen ultra' quæ v-
 decimum mensam Stendit, simulq, cum Febrili
 pusilla Epære Coniungit, sinistra hæc ominata.

Caput Ium
De Colicinis ventris
 seu
Colico Dolore

Non minus frequentis patitur ventriculi intestinalis
ac ventriculus, sed etq. Lactantes et quia Colico
dolore tentantis intestinali, qui gravius etiam movet
atq. accendit. Liquidum ex abdominali timore,
(latib) p ventris trumphant ib. et distensione nimia
villor? mezentior? putat Dolor acerbior, qui epulatus
et Lacrimas licet, et infante ad ea vident angustia,
ut motib. inoleti, agitati, mammae aversanti, pabul
umq. recusant. Dolos ille citius aut tardius movet
o dolos evadit, modis conjungit cum aliis fluxu, et
excessu mearum Liquidar. et paterentium, qdop.
alvus claudis, et nutus v Capitis ventris edunt,
hic vero sensus Levaminei motu ille defigendum e,
visti et molesta ad sensum, a tentioe nimia v
intestinali, v villor? Contextura efformam oriunda.

Differentia.

plures vbi videntur Differentias Colicis, Dolos
intestinalis. Resumendo a naa, Causa, Sed et;
motus ipsius intestinalis, quod a simplicitate, sicut

et Stimulo Latente in vasis intestinis. Si tum
spectamus Colicam Tridactylam in humoresalem et flatulentiam,
an, id debet humoresalem acrioribus et effusatis, sive
Lactis v. liquidis ad intestina confluentibus provenire, dum
quæ species, tribuenda est flatibus Copiosis & Tridactylis, v.
nimium salsis. Si 2^{um} alia est, ut fixa v. vaga,
periodica v. accidentalis, altera levis aut gravior,
tenuiora aut crassa intestina afficiens, denique idiothetica,
lymphaticam, mobilem aut constantem statuimus,
prout raris aut raris nativitate intestina, et a stimulo
perstinacius adherescentia, v. rapidius præterfluente
procedat etc. —

Cause

Et videntur plures in quacunque, Dolore, præ
affusis visceribus nervorum, et mutationem quædam sume
ntis nervis nervis illatum in: adq. causam proximam
Dolore Colicæ defundimus pro violentam distensionem
intestini, et quorundam vasorum illud correptantium,
a Licet e' multiplici fonte proditura sit, in loca reduci
ut ad mæas et flatibus contenta in intestinis, et ad
compressionem nimiam fistulæ.

maas acm præternaturalem illam dicitur, vasculorum
intestinalium statum, et ita augeri mole et
acrimonia, ut in fistulam agere proveluta, moveant
et congerunt in flexibus, ambulant et distendant
nervi.

nimi, parietes, & in Deoem potentia, insistent, et
 vellicent fibras nervas, neq. utraq. modo ad nimiam
 tensionem & Solorem determinat usqueanti intestina:
 hinc exuperans Lactis ingesti copia, grava & cunctis un-
 convenis, & Coagulat saltem; & instantib, crassiora
 vo et opiores cibi, & juveni gustu porro et immaturi,
 intermixta alimentor. a sumptio, frequentiora stuant
 ubi Cunabula & qum in oib, ingesta nequaquam,
 sufficientia sunt in ventriculo et intestinis, preparari
 et elaborari queant, proximq; augeat motu contentor.
 & totum; nam muleto, & Diametrum et Capacitatem
 fistulae supando, vascula componentia ulterius
 premitt violenta distrahant, et ad tensionem quam uberior
 & et fortius liquidi nervi flexus et reflexus, & omovet,
 incitat.

Non Diapari, videri modo memoratam Liban
 receperunt Platan, in fistula Curvati, & nimium
 Anansi, procluso ante ignis aditu, molecule aërea,
 vasificationis & intensionis elatere tremultu fragit
 ata, fortius in parietes impingunt, dilatant ultra
 modum, brevq, totum in tensionis momentum tollant,
 vascula nerva, & labores et status roris crebri
 rapidius communicant: hac aen. Catuum congestio
 debet rarecentia magna Confluentem ad intestina
 rora uici gastrici et biliosi funis facile exardescant
 um, alimentis viscidis et crassiorib, Lactis partiente,
 sicut et obstaculis solitum motu descensum prohibent ib,

et in fistula intestini diutius quae per a Cavitate, ex-
dunt, reserit, et fibrasum tensionem intendit.

Denique, Capacitas, inferior minuitur, et Cont-
Constructio fistulae determinari et immediate et mediate
Cum continget, si idit peculiaris stimulus agens, in ad-
stamina reseruat, ut vermes, larvæ in quibusdam intestinis
primis et acrioris macis cumulus, et ad prae-
cipuum, ut apicula, et similia:

Quoniam vero Declarabit, ex affectu vividius ingere, -
aeroristat, digesta phlogistica rerum, vestigia, presentia
caluli, in ulseri Cavitate derivata inuoluntaria, -
et anni praesentiam, ipsius adstrictum, et anni
praesentia acida et frigida, regulas diutius continuat,
Desensus epiglottis intestini, ad inguina lotum, et
intempertiva applicatio aromaticorum calidiorum in
regionem umbilicalem, ad rugendam verminum praesentiam, ut
vulgo sunt mulierula, et ad eum finem variis oleis, -
Similibus, umbilicum pungunt. -

Impthomata

1^o villi nervos intestinales, nungit et divoximo de-
juncti nequeunt quia variis exurgat dolor, in di-
tensionibus, gravatibus, inter dūm Continuit aut intum-
ens, Cupit gradus et perennitas hae respondere
tensionis vasculorum. presentia Stimuli, et statum
reserentum dilatandi.

2^o Inhibito Desensus macrum, et praesentia Stimuli.

rupturis aditu, ostentum urgeri dnt membranae os
et musculi abdominales, unde tumor et ventris
elevato, magis aut minus ventans pro Caa in lenda

3.^o Intestina aliter distendi nequeunt vascula,
mesenterica et quicula, reser Lingulatica, quis
solidi, p eadem p eaducti suorum lura, proindeq;
notus ad am derveti ad gastrica emulgentes ramos
hepaticos, sine nausea, vomitu, urina suppressio, v
reprehensio Dexte Doloi, qui sapit in Colica delatanti.

4.^o nulli rersei assiduo fatigato stimulo, a tono dicitur
dnt et minuti alio solido in liquida jam torpenta,
et uberior cumulata, qd magis ac magis p eaducti, quini
effluxus, Reriq; innotat debilitas, pulsus, pallor facies, —
ad os. si.

5.^o si intestina validius agere possent in contenta, rigent,
excellis v maxia congestam v glater ducervatos, quo
uticis momento, totis p eaducti humores p mferiora
detradet, v tripitus p abduces diragabunt. —

6.^o tandem Continuat aliqndu terminib; fieri —
Immoveti totum p eaductum p eaductum, anxietate, vigilis,
ciculus delatanti, p sapit p eaductum, Convulsiones,
aut Convulsivos motus, febrem acutam, v affectus
oporem determinant, et involitant liquidi rersei, et
quines ag itatem, Capricios et inordinato motu ad sapit
aliqua viscera ruentes.

Diagnosis

Colicum dolorem ^{per} ~~habitu~~ nisi Conspiciatur, exiguus
 fuit, valida remp^{te} commo^{dit}, hinc et illius partibus
 continuo plentia, et mamma^{rum} ^{aversione} ^{puri} vo
 paulo etate proventiores, malum regionis abdominalis
 lat^{er} evidenti^{us} designant. ita vo emunt^{ur} ex progressu
 et comitantib^{us}, v^{el} jam fuerit casum p^{er} sup^{er}iora
 aut inferiora Lac Conruptum, v^{el} fluxus alvi Crocus,
 v^{el} v^{el} v^{el} cum torminib^{us} conjugati, moriet quasi —
 indubitatum Colicæ humoralis indicium. Qu^{ia} vo
 dolor interdum remittit, interdum exacerbat,
 invisibilis adest ventris putrescentia, et vultus,
 facis signis, presentibus signa sudoratis et
 latu^{us} evidenti^{us}, et tandem tormina p^{er}
 Lactantib^{us}, Communius a Lacte v^{el} humorib^{us} —
 aversionis, p^{er} puris vo^{el} m^{at}ris viscidis aut vermib^{us}
 Communib^{us} procedunt. —

Prognosis

Colicali humorib^{us} aversionis et Lactis putrescente
 ortum duens, intensior est ea quæ producit v^{el}
 maxime viscidam congestio^{em}, v^{el} latu^{us} resistentia
 priorem febri, phlogosâ intestinali. Cuius
 Comitante, et v^{el} perduraverit malum Convulsio
 epileptica, cum virium prostratio ovari duarum,
 p^{er} posteriori acie, neq^{ue} tam continuus, nec adeo
 vehementior ardet dolor, et promptius resolvit^{ur}.

periculosa indicat, & a vermibus pendet, quibusq;
in vehementiora tormina, dysenteriam parit lentam
recedat. Tenuis color doloris periculum, pro
febris, si fuerit viridis, aut nigricans
fuerit, pessimi et omnis, et ultorem rumorum
austriationem comminans, sed si voluerit clara,
nullum statum spirans, doctorem exornat.

April 6 um
De Difficili Dentitione

plures quoque in Aetate persequens morbi, amica
fortuna materis hinc valetudine, v. Lactatione
thoracis fugere potest infans, & oib; manet dentitione
incommodum, neq; unquam aae obliviscit instrumenta
provisum necessaria ad accisionem proli: licet aem
opus modicis et molibus, in ppter accidentia &
symptomata varia admixta, prodit nobis titulo
mibi gravioris, & Dentitis simplex, & Difficilis: etenim
dum ab oculis morbi pungunt et perforant
gingivis, acutus dolor, vigiliae, inflammatione
gingivarum, alvi fluxus, Convulsiones aut motus
convulsivi, solent accidere, & pusculi exire a modis
collant.

atque ppter in alveolis, et gingivis teque h
infantum dentes dum in ducem sunt, gingivis
amant plures. Cum dentis emissentibus in auras
prodire, sic refert Odalvinus rousen de pueris.

cum duobus incisivis videtur, sic Ludov. magn. seu XIV.
gallia regem, duobus denticulis instructum Lucem videtur,
et multa de. alia. & varia Villa Comitia: produunt —
Item circa 6. ann. sum, & 8. ann. mensen. p. ante, et —
quodam it. incisori quos aliquo temporis intervallo sequuntur
canini dicti, tandem molares, ne subitanea gingivarum
closure et multiplicato motu, acerbis patiat et
fatigat infans. Interit magnam incisio ingenerat —
insufficiat pruritum, interdum postea Dolor, usque omni
alio, copiosius emittit. saliva, alio profluvium —
curat, instant vigiliis, sepius q. Convulsion aut
more convulsivi exstant.

Differentia

Varis statuiant Difficili. Dentitionis gradus,
rare nimium, et glutate Dentium eruptionis,
et vehementia simplificatione dum alia, erumpen-
tibus dente, et firmiora gingiva textura obliant,
datis graviora Dentitio, cuius la Contraria remittit
videntia, & pariter Continuo p.orent, et inquieti-
sint; infantes mammae aversis, aliiq. jactante
memoratis eventib, acutior evadit morbus, qm si
ca Defecerint: tandem assignati aliorum Dentitionis,
genera circa 6. ann. aut 7. ann. a. sum, dum compe-
dentes lactei Denti decidunt, aliiq. Duriores, firmiores,
succedunt, & cum iam preceperit gingivarum renovatio,
et potest utis Somnium, id sine dolore contineat,

Causa

Etiam proxima ad difficultatem producendum
 symptomatum, testimonia a Rhinulo applicato sibi.
 nervi gingivarum, eas proutmodum rurgente et
 sic habente, cuius rorae sequentia laboriosa est, se
 imminere et al. blae, p. idem et vasculor. gingivae
 compositionem, quin et atq; illi communiter i. p. idem
 etiam, atq; immovet deimprevisio molis tã quã
 vividius aut levius afficitur pro liquidi nervi-
 monente, tenax fibrar. et cruentã conundem
 succursio re, iuxta statutum ad Cum Goro
 commensurum, unde auctior et remissior Dolos, qui
 et maj. et min. plerumque rivulos, continens
 intermissos planctus Cubi.

2^o positis semel vehementiori fluidi nervi-
 rositate, et intensiori fibrar. quã hoc veridice
 in limbo, tumultuanti spiritus, qui inordinato
 motu huc et illud copias mittunt, unde perpetua
 fibrarum representatio a vigiliis, et fortior quorum
 astutem molis, qui convulsiva aut molis convulsiva
 determinat, prout inaequali rivulo, et constanti
 et levius derivant.

3^o solviti modo alius, interdum ad hinc, et
 maj. et min. nervi h. e. nervos, molis, sunt et
 Congestioe pravorum humorum, dum en Calor
 intensior urget, vascula tã leviant, atq; adest

mastrum cumulus, supprimitt alvina hæreo, seu
t'o r' fluida copiosius ad intestina derivant, et ma-
rarefiant et expandant, variis ad est profluvium
pro gradu q'titatis, Connictæ, et corruptione mæn,
religua symptomatica ær. uocare possunt, ut febris
propterea appetitus, inflammation oris et gingivar.
ex eadem theoria facile diducunt.

Diagnosis

independentis a loquela et humoris in fontem
auxilio iudicari et Tentatio, ut si urgeat solitum
eruptionis typus, et dignitas, lapis fricans gingiva, et
in rugis papillam faciat, nectis adtingi recipiat,
aut ipsa amet gingiva albescit, tandem et agere
improbatum a nullam externam aut internam,
causa indicant.

Prognosis.

Parentis de Chura prole, nisi facta eruptioe -
dentium tranquillitate et gaudio indulgent: hypo-
plasia ab ea extinguitur; et tunc omnium simulum
statuendum e, qui reflexus et longiori tpe -
exurgunt, et graviora instant symptomata, ut
febris, convulsio, deliria, inflatio et peritinae.
Necnon et tpe autem iuniorum, varia
mutatio constitutio, et lactis conditio, sicut et
diversa tpe, dentitionis eventum maturabilem
quique

quippe hyeme per aetate gaudent. Vnum parit ³⁵
et promptum atq; cunctis promovet. Insuper, per
inquinat. Vnde constitutur. curio pag. 171

Caput 7^{um} De alvi profluvio

amittit malum infantum & alvi profluvium,
et statim hoc potissimum deinde incommo-
dum, molestum esse videtur, in decursu vasculi fistulae
intestinalis ita emungit, ut debilitas summa,
vivum prosterat, pultes, mases, aliq; hinc penduntia
supervenerint symptomata, illud aen definendum
et suspicio alvi fluxus in quo mase liquidiora et
coloris albi sine torminibus decurrunt. —

Differentia

1^a Numerosa et in infantibus alvi profluvium —
differencia: ea potissimum deprehenda et ex mase
Lacris, et effectus: 1^o rase mase brevia plures admittunt
alvi fluxus, datus est Mucosus, argiloneus,
serenus, flavus, viridis, biliosus, ruber, chilosus,
et oia. bla maseum Lacratione patent.

2^o rase effectus: alius dicitur Criticus, qui puerum
a pluri impendentibus malis Liberat, ut in
affectu febrili Difficili Sentione. Si alter vo
symptomatus, qui cum febre putrida, variolis,

32
Sundantes si et animi nutrix a alij in Santon
de den Constitutionem obtineat v aliquid aliunde
aquis, viciisq; vestiti, Santon den naa fundet
quo Stim abest ut vegetiora Stim qre reparatio
ventriculi et intestina, ut ingesta. Debita Consequi
potunt, quia robis efficacius labo factum Collis
Serua redundante, quia lota fluidor mole nimis
diluit, ea humor horrendor. Cola Relaxante,
indeq; magis ac magis debilitate tota inbelli
machinula. portius Communior vo deducet
originem a nimia qritate, v prava Constitutione
Lactis, in q tem Nacris Calidior, exterior, ita -
potentius fibras intestinales stimulat, ut inde fortius
et frequentius Contrahant, quia fortiori Contractio
Citius expellunt mao contenta, q etiam a
intelligendum de qritate Lactis, præsertim si infan
Solidiores Cibos Simul ingerat, tunc em male -
preparata et subacta in stomacho alimenta ad
Fistulas intestinales in Crassiora revertunt, dein
in prava viscos mutanda, q ita stimulante fibræ
intestinales, ut Cipalis debeat Supervenire Stentis,
et pro diversa molecularum Constitutionum diversos
exigere varia profluvior. Discrimina hæreticæ exigita.
eundem Stim effectum prestare non vigilæ, difficili
ventitio, varieg, aculei, Cur, in Conservum nervor?

Labor ad fibras fistulæ intestinalis facilius tendit,
atq; fortius interit atq; succutitur, ut quæ
Cæcior hæmorrhæia manuum contentar? in intestinis.

Symphomata

In ventris profluvio frequentius adest Diæta —
maximè fluidior? & solius ob laxatum fibrarum
intestinalium tonum, & descendens mater selecta
ndi prorsus improbat. It, verum etiam ob copiosiorum
eorum mucum & vasculi intestinalis diminum,
qui contentas mæas quasi in fluxum redigit, nec
atq; dejectis in thoracis sero lymphatico fluxu,
nullum productura e Dolorem, ex ætiantibus et
Laxatis fibris, magis atq; horribilem, inflatio
viridi Oris, locum mater ætiorum, & —
Hæc intestinalium potentius stimulant; 2^o
diversus e Color et odor eorum & Remanens, varia
Indoles, Consistentia, atq; fluiditas, dependente a
varia Crassi liquoris fluiditatem mucum intestinale
mag, & min; relaxat Ductum atq; dimini-
oncoctis modo, mæas ex laceras suppeditante.
3^o fluxus serous. Caput in hæmorrhæia leucorrhæia
atq; degestæ, ob diminutæ fluidum æqueum
in præstare liquoris vasculor. laxitate et obstructio
visceris qd. fit tardo gradu liquoris lymphatici motu.
4^o profluvium viride & Oris æqueum terminati.

inflammatio aut dysenteria ex ultiori febris. nervosa.
 intensio, et maj. squinis p. ramos meentericos —
 insculantis fervore, et stimulo, mater un. Conitatis. —
 h. a trophia et maus, mbum parr. inv. et naturam
 Consequenti, o. solum h. continuo p. h. mucilaginoso
 Cuoni digendio, quo vascula ... et vira. al. siccant,
 verum et impedito transflu. chile. p. squines,
 qui o. male preparati, aut statim laxitate intestinos
 ad inferiora pellit.

Diagnosis

Cognita facile cetera via frequentiori dejectione —
 manifestati alvi profluvium. T. multi inter est
 diuina. ejusd. sp. ex probe allegi, id tē ob. tēti —
 et detegit statu symptomatum et inspectione —
 et aliorum in exhibitione.

1^o symptomatis novitate ac Critica ut fluxus; diuina
 heragis Cum Levamine, in fantes, et adest ad em
 relatio et agnitio cum mo. quo jam laborat, ut
 dentitio et diffici. affectu roboris, o. symptomatibus,
 cum Conitatu p. siccis exaratio, malum, intendat
 et Deterior fiat status p. uari. —

2^o inspectioe Exarationis patebit fluxus p. uari:
 in siccis em molliores, et siccis observant
 dejectiones, in siccis Liquidiores, et lymphaticae —
 a p. uari, in biliosis densius humore mat. lactea

Flava viridescens, haerens. Causa a q̄b. obolat
 affectus facile discit medicus, Exposito Lacte
 nutritici, cognitis cibis q̄b. vesitis, rariis a ignis
 Constitutione, tandem an solis & cum alio Conjun-
 gati m̄to, ut difficili dentitione, accensio simplici
 atum Hamore Ceteris lit.

Prognosis.

Cuilibet alii Prognosis speciei sua convenit
 prognosin et peculiarem suam. Quia ventum
 observat cum rariis aliorum salute et rep.
 difficile insatu, modo in diutius & observat. tunc em
 o caset periculo, praesertim si osseti fuerint vermas
 dejectione gravitas sciant, prodesnant visa, et
 appetitus, et accensio cordis turba: at vō si
 Solitos limites exierit, nequaquam suppimentum
 cum volentem, frequentibus Convulsiones affutur
 Sopororum intulisse constat, Contra vō Soporum
 persistens durat, et sensim et sine sensu Consumpti
 viridis, Leucophlegmatica et hydrope terminata.
 periculum habendum e biliorum, in quo
 dejectione viridis, Flava et aures Dependent,
 Simul cum ventris intumescencia et febrili
 organo, a vō violentiorum. Simul et
 irritanti fistula intestinalis fibra: ut exinde

41

indisenteriam, inflammationem viscerum, et
suppurationem degenscit, unde manus et atrophica
tubercula in partem consumunt, deniq; si acriora
taceant & nigra fuerint & brevia adest suspicio
Fistulam intestinalem futura gangraena proximam.
Curae pag. 173.

Capitulum De alvi obstructione

ape' accidit ut alvus & dolet de Ebrietas et Quies
in infantes lacte nutriti, ob victum humidum,
et laxitatem intestinorum tardior contra' et pigra
erant, & constipatio alvi nominata, rectis deficien-
tibus soluta immixtio alvina cum gaucum Cur-
varius adiunctis Symptomatibus. —

Causae

Præam proximam adducimus & imminuit a-
ctione fistulae intestinalis, qua faeces alvinae
insufficienti vi per Baeteria intestinalia nequaquam
impelli possunt, deficit autem & imminuit, siora non
intestinalium motus, Duplex potissimum ratio
i. nativâ & Congenitâ Sæpe villor' per præteritis ob

Laxitatem debilitatem aut Comprimiorem, si mulier
applicatum o sentiant, hinc alimenta acida, & frigida,
deumbeus in locis humidioribus, Lac aquosum nimisq.
crauum, quibus diuturnum, et contumeliosum rem
dilectum pancreaticum, dilutiorem vapidumq. Retine
nabunt, pro Cuius rimati habenda sunt, si vitia maxime
a p. fistulam intestinalem provocant, si em nam
u. a. habiores. Et viscidiores Retineant, Retineantur -
Deinde pariter, intestina adhaerent, et mucos
quodam tenaciori & Crusta fistulam intestinale
roducant, prout qm qd Difficilius, p. nervus et quos
intestinales moveri possunt, ob Cohesionem moleculam
accidit inuicem, ut nuncum Inferant irritacis conuen
f.bris nervis, quo vili muscularis ad Contractiorem
colligantur queant, proutq. minime actus intestino
jalententia: hinc Lac coagulatum & nimis
viscidum, alimenta ejusdem generis, qd, viscidum
& Demum Siccatas nimia intestina, Rari oporita
priori Cui, alvi Constipationi natales praebeant.

Symptomata

1. alvus adstringi, et Contra Laxamenta in
intestini moveri nequeant. quia mole qtuata
parietes distendunt, et distractio idem Nervis
Inferat, unde Dolor, Comprimiorem, et viciatam,
& Spontem et quietem necessario Interruptent et
anxietates

anxietates advocabunt.

2^o Comprehis levi⁹ intestinis et p^{te}ib⁹ Circumja-
centiis, a mole et q^{ti}tate fecum, retardatis nervis
Liquido⁹ vites in abdomine, unde ventris intuma-
centia, e modo⁹ Conjuncta Cum Calore, siti, vigiliis,
et calore, interdum ab eisdem separata, prout Contigit
foetui a matris rarefactis et intestina exsiccantib⁹, v a
Laxitate et inertia fibrar⁹ intestinalium. —

3^o feces, liquiores et induratae in transitu gravita-
afficiunt, ap^{te}usq^{ue} vascula minima Diacerant, —
unde a^{te}ri v⁹ p^{te}duis tamina, sicut et ex^{te}lusus
quorundam guttularum Iguinis, adeo, ut iocum
Comitant.

4^o tandem, si affectus perseveraverit, macies et
atrophia declarantur, v⁹ blum ob vitiata^m chylora
varium diem ob impeditum hanc fluxum chylor⁹
Commeatus, et inertia fibrar⁹ muscularium, intestina⁹
Morboe is illata, dependenda ab impedito fluidor⁹
p^{te}ra morant⁹ circa Cistit⁹. —

Diagnosis

Nummeratum alio vitium p^{te} manifestum,
et relatu nutritio⁹ v⁹ famulatum evidentia⁹
natet: Ita v⁹ detegi p^{te}nt simp^{te}ratum et
Lactis exploratoe, si etenim ventus tumidus

aleat, infansq, siti, anxietate et vigiliis permat,
 simulq, facies multum indurata exarscunt, jndicium
 et alvum additum. Siccitate scilicet intestinalis, et
 timulo applicato: scilicet vobis Dilem nullus argat
 calor in tumefacto abdomine, qui habitus acido-
 si superiora emittit, et excreta sanum viscida
 et argilla deprehendunt, jndicandum maxet
 signum, alvum constipatam ee, ex tenacitate
 mearum in intestinis contentarum.

, prognosis

Clarius contingit ut infante: qbi alvum additum,
 saniori diutius vivat, tutiusq, tunc alvum
 sanum per suppressionem ee. et tunc alvum additum
 siccitate intestinali et timulo latente dependet
 cum tormina, sitim, vigiliis, per adiuncta hnt,
 herniam. Sapiens Determinet, et in graves
 et talesq, natos degenerare possit, magis portendit
 periculum ea a laxitate siccitatem, simulq,
 tenacitate mearum originem ducit. De minimis
 notabilior. Succorum copia cum. Quine Confund
 atq, et ad Suppressionem mat, tunc Soporos et
 delirium a gravi puero, ingulant, cum jan

45

impedito. Equidem p. inferioraliumq. major
gulas ad truncum accidentem derivet, unde -
Crani inflammantis meningos, & opprimit -
substantia Cerebri. Cuius pag. 172.

Caput 9^{um} De ani Secidentia.

Naa est, pte debili at. p. infirma deprehendit
in infantib, Leviorq. conatus, ipsis noxi
ce solent, saepius etenim contingit ut post
alvi deponitionem live frequentiores, live naalem,
anus proiciat, seu qd idem e, recti p. h. m. ita
extra anum remaneat: tumida admodum, seu
abq. inflammata, & dicitur in hunc locum
reposita, rarius ex. e. p. h. m. dicitur, & redeuntis
egrediendi non tenet, donec tandem continuata
Longius huiusmodi ej. h. m., vix. p. h. m. suam
naalem relegere possit.

Causae.

Caam proximam ani proidentia tribuimus
laxitati villor? Compositum membranulas
recti, et Relaxati p. h. m.? Carnearum p. h. m.
ea quippe e vasculor? Laxior Compages, ut v

46 nimia Sere humore q̄titate, ad quendam xtem
Depluentis, & violentiori nisu, labit & tenum
Dependant Conceptacula, et difficiliter ob candidam
Caam restitui possunt. Illa xtem. Labes pro illis notitiis
et flos Carneis sphincteris, his etiam ita laxati
Compages aeti, & minuit actio sphincteris, ut
impulsi et descensus maxime nullatenus obstant.
et tunc uigenti, proindeq; anus quasi propendat.
hinc ea ea de fluidorum ad intestina fluentium
augere q̄titate, ut Cachectica Constitutio, nativa
laxitas glandularum intestinalium, deorsum
in Sotis humidioribus, alimenta ejusdem generis,
de nimis equorum, & ex alia rē feces nimis
induratae, mole majores et coarctatae, diutius in
Congestis aut morantes, & sphincteris vim
et frequentius inferentes, pro Caus remotioribus
habenda sūt.

Symptomata

1.^o Saxari. imulq; stagnantes, fluidis
in farcine nequeunt membranae intestini recti,
quoniam pars illa impensius turgescat et distendat,
unde. Semel prolapsa, tumida, notabiliorum
tumorem efformat, qui si ad hanc pervenerit -

47
modum ut angustentur vasa squifera, et summo loco
retardato liquor? Circumitus, dolor, livor, dulasabunt.

2^o non illa ex statu nuch. dimota, Congluentibus
et torpentibus liquidis distenta, sicut et externa,
nisi injurias, nequaquam restitui, aut si reponati,
Consistere nequit, ob ultiorum vasculorum cum
dilataam superantem Capacitatem ani, v
inertiam Sphincteris, debilius, depositam. Externis
atem ani, restituentis.

3^o penetrante tumefactis et visorumpunctis
membranae viscentes, effundunt Liquida, fit
Suppuratio, a putris retenta, febrem hecticam
marasmodum producit v. sinus, Callus, et interdum
gangrenam determinat, ob Suppeditatas Cruoris
particulas pusulentas, facit amq. pthium vicinas
vulnorem.

Diagnosis

Cum in praesentia, varium ipsius eventum
determinare solet, quoniam ingens periculo
vacet, nisi tumor in lumen, exoritur, v. alius
pusillio. Ledit gravius tractetur, aut ad prolam
morem Et Suppuratorem vergat. Ita nimio
egerendi Conata pendeat, faciliorem dato maturius

auxilio Curacem sumit, quia rari. Sanguine —
 vasculor^{um} rimalq^{ue}, Cum alio fluxu conjungat^{ur}.
 Denique quo^{modo} anas extra^{re} natalem sedem ductus
 remanet, eo alterato, et difficilius reponi, aut
 retineri potest. — Curac^{em} pag. 179

Caput x^{um}

De hernia

De bilis tant^{um} ad omnes claustra solumq^{ue},
 prestat peritoneum cum musculari epigastriis ad
 sustinendam partium contentarum molem et
 impetum, & videri facile videtur ob pagalis
 refugium mutant, exsolabunt^{ur}, & inde realit^{er}
 motis apposite vitas sensitivioribus & inveniunt^{ur}
 in infantib^{us} & solum ex molliori vasculorum
 compage, & potissimum ex aucto momento
 viscerum flouitientiam, & contra ad Curac^{em}
 clamores, violenta sarpina, fletus, vomitus,
 & inordinatos motus, faulion Delac^{em}, et
 Leniori Stimuli Commota officium nitunt^{ur}
 ut p^{oss}int Continentes actionem superent, et necessari^{am}
 mechanic^{am} e^{ss}e sede natali solabunt^{ur}. Sine pueri
 magis et obnoxii herniae & definiti et tumet

49.
oriundus a vasa in intestinis & epiploontis aut
utrinq, simul p annulos abdominales.

Differentia

Multipliciter, ratitate differunt Hernia, et Scrotum
Dividi in completam et incompletam: ita p
Vat. Dum intestinum aut epiploon in Scrotum
Descendunt. 2^a vo' Species Designatae tumores in
inguine: porro si intestinum solum Descendat,
Intersuale, si epiploon, epiplocele, & utrumq, —
Simul entero-epiplocele nominato. Tandem hi —
vario et praecipue Herniarum Differentias, illas addi-
unt a hujus loci ostium et ad tumores Scroti —
pertinent, si nempe Scrotum a flatu intumescat,
Herniam-Flatulentam, si ab aqua aquosam
appellant, & idem Communiter accidit in inguine
dum nempe peritoneo solto, Humor aquosus in
abdominis Cavo jaceat. Hujusmodi, proficit in
Scrotum, et in tumorem attollit.

Causae

Si vincta sit et tunc Continentium et Supra-
 repagula: Conditio e Contenta in patentem Locum
 clabit, adeoque, Caam proximam Hernia refundimus
 in protuberantem Laxitatem et ruptioem pluri
 Continentium et praesertim pectoris, quorum
 tace intestine et omentum in inguina et Scrotum
 descendunt, prior Casu Communiore a Hernia Soluta,
 etiam membranam dilacerari aut rumpi potest,
 quasi impossibile videtur, nisi Casu violento,
 vulnere et ingenti Conatu et fibrae Contingentis
 Confestim Scindant, et a mutuo Contactu Separant
 et quidem variis Contingere Solent dum Laxitas
 modo determinari potest, et aucto nisu et
 momento h. ille Continentium, prior modis
 tribuendus et praesertim in infantibus, vomitionis
 nimis et stultis Continuis, tunc inguitu retent
 ion jactationis indolentis, difficili et graviori
 Tumoris ejectionis, et ita argetur et Contactio
 nimis et violentiori musculorum abdominalium
 et Diaphragmatis actio viscerum et lumentium,
 et praesertim Intestinorum, et validius quae
 impingant in membranas laesentes, Sonum
 ac sine Sonu h. horum Urgeant, et resisterent
 ultra modum extendatur unde, praecipue Herniarum
 quae e

qui odispari modo laboris in visis, ob equitatem
 scilicet, ponderis, gravioris elevationem, inest flatum
 laborum, vomitus, & violentos motus, qui muscul
 arem nunc intendere, & liquidos? circulares
 commovere accelerare valent. —

Posterior vero motus dependet & laxitate villorū
 Componentium pte Continentis. qualis observato in
 pte Constitutione Lumborum iqueum Latissimum —
 Copiosius suppeditante, quo imbuta semel fibra a
 tono decidit, et nullam resistantiam opponere
 valent alimentis. Porro, & dū hinc ejusdem generis
 subministrant, et reliquam suam massam exsuperante
 aquae Latius pteciunt, ut oleum, gelatinosum, aliisq,
 ceteris, plurimū Laxantibus, Lacte caritis, nimis —
 aquoso, Deambula in locis humidis, in temperata
 balneato, et in modico non diutius refrigerant,
 a ea Laxitas natale, probare poterunt, in quibus
 minuetur actio et vis villorum membranarū Coeantis
 Componentium, & sic debilitata, et impensius —
 dilatata, nullatenus obstitit.

¶ Symptomata

1^o adeo in diuini pte, ut iniquis, seroto,
 aeternis modo magis, modo minus notabilis, —

veniens aut laxior, facile ē egressus fluxum pro
variā tunc prolapsus, et nōā plura ē de lapsu
fuerunt. etenim si substituerit intestinum ē epiploū
in longioris annulorum abdominalium tumor
apparet qz inquirere, si ulterius vō transfluxerit,
prehendit in seroto cuius insuper determinata
mollitas ex lapsu epiploūis, major vō resistentia
ex intestinis. Descensus dicitur.

2^o nullus dōq, dolor, intestinum vō gravior
intat pro vivo tranquillo gradu et immobilitate
liquidorum. Circuitus. Dum etenim Cavitas
intestini facilius patat fluentior, repleto, neq,
ulterius impelli potat, brevi patat modum.
Intenduntur navates, Comprimunt vasa cūq, quā
supprimunt liquidorū affluxus, quorum rāte
has inflammato, et dolores atrocissimos, simulq,
rātem iliacam Constat.

3^o prolapsu. Semel pta. facili negotio qz
mixtum statum restitunt sādē pportioe
et facilitate, ut pote cum tumor nulli impedit
obiecti impulsioe artificiali, nō tractioni, et tunc
internarum facilius cedat: rāteq, ob multatū
tenere litum, et patentem viam. Statim nō pte

possit

4^o si strangulatio intestini in omenti ad eum quodam
 pervenerit ut nulli vini pot medicaminibus, aut
 doctissime manibus; brevi pars gangrenata et -
 phacelo cum motu commutanda, promptius -
 Comipit, cum exinde suppressio. Quis propterea
 illos negotiorum infarctos circumitus, qui deinde
 Comipit, Labemq; vicinis, atq; inter arci
 communicat. -

Diagnosis

ipse quid tumor scroti, live hernia p se nota
 e; hoc vero Diligenter Considerandum, an tumor
 sit intestinum in scrotum prolapsus, an vero -
 ex aliquo humore eo fluente, quod facilius dignoscitur
 In refectione tumoris: atoniam hernia tumorem
 Constituit qui in scroto o Circumscripto, et ad
 annulos subdominales inguina versus extendit,
 e contra vero tumor aquosus seu hydrocele -
 terminatus scroto, et protuberantia acuta candelae, -
 diaphanus descendit. rursus inquirendum an
 omentum delapsum fuerit quod doctes mollior et -
 inaequalitate tumoris, et defectu murmuris deo
 Comprimis, in intestinum, tunc enim tumor e -

49 duris, elasticis inaequali, factaq. Compressioe murmur
flatum percipit. deinde sō Cognosces enteroc-
eploeten. eorū omentum induratum simul
desapere fuisse, ex signorum jam deservitorum
unione: tamen maxime cavendum ab errore
indigenda harnia incompleta, sive Bubonocle.
aphtegmone, atq. in Bubonocle cito erumpit, ut
proximum nūc praevisio ullo Dolore dante
tumorem efficit cuti Concolorum, et annulorum
foramen replentem: ex adverso phlegmon paulatim
invenit et protuberat. Cum Dolore calore et rubore,
glandulas inguinarum ut proximis occupat. Dum
Bubonocle in foramine musculorū abdominalium
cadit.

Prognosis

Enterocle in infantibus facilius curatur qm in
adultis, cum peritoneum adhuc mollius sit, et
facilius uniri possit. nonnulli qd in harniam
aquosam deterior rem eo enterocle statuunt, & in
infantibus id salum ē: tunc tēp. experientia
facile discentibus adhibitis harniam aquosam
curari, uno saepe aetate, magno in assumptis
humoribus posse evanescere: contra sō sō —

resicula valet intestini prolapsus in infantibus, ⁵³ —
Sicet faciliorem medellam suscipiat qm in adultis;
etenim si scies ad ptem prolapsam proveniant, ibiq;
exsiccatis et induratis, usq; ad diuina futura
inflammatione et paronem iliaca, a breviori tpori
spatio infantem e medio tollit, Demum si intestinum
prolapsum diutius in seipso permanserit, adeo ut
intimus ipsius testis adherens ut amplius in pristinum
statum restitui o possit. — Curas pag 140

Caput XI^{um}
De umbilici prominentia
et ipsius inflammatione

Connatum e malum hernie umbilici prominens,
iquidem pars illa in infantibus ad tumorem
attollitur, interdum inflammata umbilici, &
inflammata solet potissimum succedere umbilici
abscissioni nim. em ex dolore si Ligatura o recte
profecta fuerit, v impressionibus aeris externi
quibus eo derivata atq; tumultuat, brevi —
inflammationem Determinare pot. —

Causa

Duplex huius rae prominens qd umbilicus, v
inducta ipsius praecisione, qua dum ligata, —

46 maj. qm pars e relicta portio, superius in
altum attollit, atq; protuberat, & laxitate aut
dilataoe nimia paritoei, cujus rae eo Loci, -
umbilicus nimium distendit, flatu et humore
aquosi sese insimulant, et tumorem produunt, qui
si ex inflammaco & exulsaaoe umbilici
dependeat, simulq; adit prolapsus intestinor.
malum ppe ex umphalus, et umphus te-
appellat. extrorsum aen urget paritoeum
aucta vi musculor. epigastriorum et diaphrag-
matis, & a ex Laxate prius Contextu, ab
aquoso humore plium Contexturum p ius,
imbecillius qm pars e reducta. hinc pro Cui
tomeis umbilici prominentia, habenda et molestia,
et Continuada nimis infantium tussis perennior
flatus aut clamor, motus inordinati qui Comm-
uniores et p pueris. Licet plures alii p adultis -
obseruanda, hic locum ferre possint.

Symptomata hujus affectus adeo brevis -
existimanda et momenti, ut peculiarem narraoen
requam necanto, aliter si a factis singla -
fuerit, qd si cum prolapsu intestinor. & umbilici
exulsaao complicato, vicia haec, hernia aut
inflammas aliarum p fiam sibi vindicat -

symptomata, addeq; ad diagnosis veniamus. —

Diagnosis.

Est et evidentiū umbilici tumor, et solū modo —
disqueendus ē ab inflammatoe, & Quittiem, ruborem,
Calorem & pulsum qui nunquam in simplicia —
Prominentia umbilici Depreciuntur, proterea —
inflammatio umbilici promentiū emittit, prominentia
vō intuitus persistat.

Tūc vō Detegenda sūt ex diagnosi ut iis —
Consequenti, etenim si umbilicus o recte praecur-
sus sit, facile ex mole et q̄titate apparet, si vō
aratum sit peritonaeum, tumor nec in Clamore
& letu incrementum majus sumit; Contra vō —
rupto peritoneo sepe vagatur et dum infans supinus
jacet, vix percipitur, qui major evadit, dum flet
clamat, aut agitate.

Prognosis

Si umbilicus longior qm̄ nunc ē relictus fuerit,
imperiū obstetricis, malum immedicabile censendus
ē, qd̄ tū plus molestia qm̄ periculi. Cum Absit,
at vō si post partum jam consolidatus extendatur,
nimis prominat impenitus, et saucioratur, eo —
gravius judicandum malum; v̄ Difficiliorem suscipit

Curac
pag. 181

curatorem, quo magis irritetur; et cum nisi in
fereis superetis annis, ex prolapso et inflammatione
intestinorum, Uterumque ad ulteriorem deum et inducere.

Caput XIIum De intertrigine

Si Cuticula Coxis, Cervicis, perine, v. Confinis ania
vera Cutis separatur et quasi abrasa, Dato
malum illud intertrigo nominatum, et frequente
maulento infantes, variis obor, aggreditur, Cuius
notabiliora Symptomata, pendent a Rubore insigni
memoratarum et Tum cum dolore, fere Continuis
anxietatibus, et vigiliis.

Causa

Causa proximam intertriginis profundius in
abrasione squamularum Cuticularum Component-
ium, simulq. irritationem factam in mollioribus
Cutis fibrillis, et gravibus qm parte a Proximis
ambientibus, prementibus v. extensi acis Insuper
Facies, Dolorem Calorem et ruborem in se
determinant.

pluribus aem Cui, 1^o Lintramenti qd involvunt
infantes, et si rudius in plies implicata v
Tordibus

[illegible]

Symptomata

1. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 2. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 3. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 4. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 5. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 6. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 7. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 8. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 9. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*
 10. *restio* et *restio*, et *restio*, et *restio*

[illegible]

[illegible]

Trichomonas varians Desportes, 1911, - nomen et
descriptio huius Trichomonas ab illis, meo iudicio,
non auctoritate, sed a variis locis, huius
motu, forma et Trichomonas radiis, et coloribus
mutabilibus, unde nomen, varians, interdu
a'deum, aut fuscus, et ex rumpione effluens, huius,
- ex parte et tunc et ita nomen et huius a'deum, et
- huius Trichomonas nomen, adq. ad prognosin

Prognosis

[illegible]

Diagnosis

Infantum prae differentia patens ex vultu et uia
 elati, ac ut indicant ex propriis et salientibus
 vitiis et sic, et incontinentia, uicaria lateris et alia
 illa in gravitate sunt.

Prognosis

Infantum prae curam sua via sapienter non cum
 acribus, nunc a eam statum peruenit, infra
 a seculo in uentem et hunc, aut quoniam hunc
 Infantum post remissionem vario in fine curatur
 Infantum etiam et eorum et alia sunt ratios, et in
 quibus non gladius aut uicidia sunt, sed quod idem
 uicidia deprehendit, etiam in uentem et a per diu
 uicant, et prae sua et curam et. *Curas p. 186.*

Capit. xv. ^{186.}

De Thyriasi

Thyriasi venter, Thyriasi, adtem aduentione
 et sic et alia venter, non, dicitur, et aut ...
 Thyriasi venter, Thyriasi, et obnoxios per
 Thyriasi venter, Thyriasi, et obnoxios per
 Thyriasi venter, Thyriasi, et obnoxios per
 Thyriasi venter, Thyriasi, et obnoxios per
 Thyriasi venter, Thyriasi, et obnoxios per

¹⁴⁶ Taliglo, in. ...
...
...
...
...

Causes

[illegible]

Capit. xvi.^m
Decembris.

Inordinati motus sunt fluidum viscerum, atq. locat.
et hinc humorum pueri et sym. calie glauco
in oculis vertuntur ramos unde oculis motu
in oculis sunt ducunt, prout iniquitatis, -
aut equali modo comprimunt hinc locat. et
ad hunc tractum, o. corrent aut iniquitatis fluidum
locat. locat. -

2. rorari pueri, dentium hinc locat, atq.
humorum in hinc locat exitate. hinc rorari
et hinc locat. prout iniquitatis, et hinc rorari
iniquitatis utramq. manitiam aut interiora ori
locat. utram aut alteram. Iniquitatis
rorari.

40 ventis adeo distenditur pulsatur, tum
motu rorari, atq. distenditur aliquid iniquitatis
maxime, iniquitatis aliquid et terminatur gravitatis
ut pueri in oculis glauco et maxime exilione
et hinc rorari iniquitatis. prout iniquitatis
et hinc rorari iniquitatis, iniquitatis prout iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis
ad iniquitatis prout iniquitatis.

50 interdum contraria accidunt, ut iniquitatis
et iniquitatis iniquitatis aliquid, iniquitatis iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis
iniquitatis, iniquitatis iniquitatis. prout iniquitatis

ruit enteritatis quae frequenter et gravior
 extenditur. Tolerantia vero et utilitas per
 albos, stercora dentium, proinde per os
 rariis prae sita quae plerumque infantes, Tigis,
 inueniunt opem calorem facie qualitate, et malis
 interitum rubentibus, nausae frequentiori et
 hinc ante vomitu, inuicibilis appetitu Tolerantia
 enteris. Cum aluo suppressa v. plurimum laxata
 salubri acido ex ore erumpentibus, urinis albuantibus,
 et incocto extenuato sporis, sic etiam manifesta
 interitum, rigide, Convulsiones Leprosas, per
 ingruentibus, et verminum praesentia indicant,
 et magis impetunt longum et acutum per uelut
 albos interitum.

qui non solum Lumbos laborant, Intestino,
 Liborum ac pestis divergentes, et non offerant,
 matriam ventriculi et morum abdominis
 experientibus, ita ut aliquo tempore omittant, si
 non reliqua terminant, et tunc posteriora et regerant
 ionavio et stenit Lumbos. Item in latere
 et interitum, non solum solum in latere morant,
 et in interitum, et in interitum, et in interitum,
 et in interitum, et in interitum, et in interitum,
 et in interitum, et in interitum, et in interitum,
 et in interitum, et in interitum, et in interitum,

Tandem et aride solum interitum per uelut per uelut

Tringente fere per centum, morlem. quibus ali-
cuius para.

Quo attinet ad naturam humorum, morlem o-
piter, fronte interdum exigit, & fere per centum
nisi copiam accersit ut praevis vultus moris
prouit, & aliam causam Concursus, qd. omni-
bus et alio huius ab eo vixit Concursus
exhibetia locit.

Tandem amittit nullam in lachrym-
corundum et periculosa, & propter stimu-
lationem et proportionem quendam cupiditatem
ultra ani et abierit. & istulas immunda bilis
Spiritus determinant. — — Curtus pag. 147

Capitulum XVII.^{um}
De ventris et hypochondriorum
inflatione.

Si in lactis vixi fontibus latuans polenta
memorata in humectam roris datu-
bus et alia quodam vixit huius
intumesceat, et inflanti hypochondria; o statim
ingruunt lymphomata, murg, eandem ita
soluere vixit, vixit clario quodam huius
in huius vixit abdomen a huius, Dolore, Languet

appetit, sibi, autem non, prosternebat, 79
 pda. et fusa intumescunt, huc cont. casset,
 intardum mollior e et compassio capax abdominis
 tumor, modo durus et renitens, praesentem in
 inguendris, d. in adiungit. In decursa febri
 -cula cum inaequalibus citius.

Cause

nam immediatam deducimus & inducimus, ali-
a de quibus, et obstructionem vasculor. morbosos.
tuorum vasculum a stagnante et congesto
vasis morbo, hepaticis, splenicis, gastricis,
quibus talia obstruuntur in glandulis. Englobatio-
nem entericam, lymphaticam appellamus, via reser-
vata et magis et magis tanto gradu, et impetu cum
venarum, obstruuntur, et, inveniuntur vasculis
reservatis in collateralia vasa, et proportionaliter ad
restitutionem novae molis momentum surgent,
distendantur, breviter, compressionem ductibus squib-
bus, in pressione in ferunt, ab utroque liquoris
propter vasis modum cumulat. memoratum
cum lymphaticum contrahit solidum et
fluidorum laba, vasa in contaminant
ad fovendam obstructionem si quæstia & laterint, et

40 ignavo motu insurgunt in jam torpentem
rumorem, aut precipitantur in rivale, & rivas, ali-
quando tenuiores, & alveum ampliores
aliquando effluvisis offerunt, qbi vasa jam via, aut
in ipsis limor it. limor demorant. & tunc vi-
detur in vasis determinant, & coarctant,
transire, et molecularum cohaerere peccaverint,
ita ut in totum sumum, atq. meandros ducunt.
Ibi e transgredi nequeant. hinc alimenta virida
et tenuia, intestina corundem aspergunt,
humiditas in locis humidioribus, pipatorum et
arum frequentior unus huius casus remota latet
et.

Symptomata

Tumor adit in a Romine et Lentorem & tendit
et vascula nigrescentia & interlinea obscurantia
ens, in it. hinc enim dicitur de motu
Et tunc jam in eis augent, et tunc compressionem
patientis et laxiorum venarum et simplicitatem
in vasis compressionem.

2o Tumor et laesio ad unum vel plures tendit
in vasis hinc et Lentorem hinc et vasa
in vasa laesio moram hinc et quod tunc
expandant, et rarefiant, qui motus

[illegible]

4^{to} sursum emicant et ^{sub} lenta² conueniunt,
et ^{sub} videri coarctationem alimentorum ingressionem
et immensum fœcibus titulo Cyriam verum
stiam ob lippiditate. Quia vixit, nihil molecula,
et nullatenus Digestiva² Lympha² elaborant, et
vocalandi membris impare evadunt.

50. *Gaea pallida* et *Paulos observata* 2 -
impedita gestatio globulorum nervosorum
dependentis a formata a matoris. Injuncta
rapiditate et effusa moleculis in varicula caputina
et in una trunci uti procedunt.

60. secundum intumescantiam et collectionem aquar.
in cavitate a dominiis, et ibi repertis ex vasculis
siccatis in vasculis cum reagentibus repositis.

Ex pleniorum mole, et immensa Tuori et
 Simplici inferiori, reductis resistentiam
 ostendo, stagnationem cum in sympathia, quod in
 officiorum, v. oblationem producant. —

Diagnosis

Cognoscitur hac affectio, quod ventriculus et ingruenda
 sint dura, congesta, et patentes angustiam sunt
 officii superioris Communionem quasi Cardiacam
 habuerunt: ad nec accedunt quod Difficile habent
 a peritum, vix, prosteruant, pallida sit facies,
 et acutius quod habitus, cum ventris
 intumescit v. pedum notabili tumore quas
 v. indicant ea a proteruere, et victus tenacior
 v. humidior habet m. magis. Satis intermittit
 entia et similia, a v. ita et quida a m. —
 Contaminare valent quo requisitis ad producant
 v. quod ad dominatorem obstructionem. —

Prognosis

Indus iste resistentior, hanc opinionem vulgari
 iudicanda, et fore m. in affectu immediabilis
 deservat, potissimum si mali radiis in ipso
 v. ex cindunt. etenim in maxima non parum
 qui chronico m. obtingunt, obstructionibus
 neque aptior

mentis. miris, et in iis induat tentat,
 e Dein ea accedunt, singl'ata. In roens agilis
 actione huiusmodi modo recta dicta vni accedat
 liberi Divitum, et tam frequentia quae rursus
 et naupium. hic motu accedat, ob Diversam
 alimentorum rationem, et in angustia. Tunc sanas et
 prae nova. et eductis nervis, dum quid non abiles.
 Eodem tempore et huiusmodi. tandem si malum
 praesens sit, quod ingens febre. hinc et emaciatione
 Consumptus fuerit cum acie, et abdominis tumore,

Curtas
 pag. 190

(universalis virorum aetate, praecipue virorum
 infirmitas cum inge' de functione Cerebri —

Caput XVIII.
 De Convulsione et motu Convulsivo.

Convulsio et motus Convulsivi quibus, praesentibus
 frequentibus tentantibus. huiusmodi praesentibus affectibus, et
 symptomatibus. Latentibus aut singulis
 animalibus nullatenus habenda est, verumtamen.
 Cum faciliorem parata habeant. huiusmodi ad
 notitiam expressa mihi gravioris et communiori,
 tenenda etata, eadem paulo fusius immorabimur,
 ut nil praestati emolumenti nobis Dehabeat.
 Convulsio aem nihil aliud est quam contractio et
 permanens Contractio musculorum. Dum contra

motus Convulsivus tendunt eandem contractionem
 & inordinatis motibus agitantur. in 1^a causa videntur
 p^{er} se, tendunt in p^{er}sonam sine ulla causa musculi
 eandemq. p^{er}severant. Sicut Differentiam: in 2^a
 v^{er}o de motibus Convulsivis, membra in se p^{er} se
 quatunt et agitant, et contr^o aequali directione
 in eam conservant fibra Carrea.

Differentie

Varia Differentia p^{er} se videntur, m^odo. Acutissima
 demenda h^{ab}et numero p^{er} se affectum, et
 2^o de Convulsione et motuum Convulsivorum,
 et Lib^{er} p^{er} se p^{er} se a affectum Convulsit,
 demenda h^{ab}et complicata motuum qui p^{er} se adu^{er}sus
 sine varia p^{er} se nomina p^{er} se p^{er} se variis
 p^{er} se Convulsivum p^{er} se innumeris, p^{er} se
 et fixum, sine et am p^{er} se de Convulsione,
 et vocat^{ur} p^{er} se. ardens, dicens, p^{er} se p^{er} se
 voc^{at} Complicata alia p^{er} se Convulsio imple,
 altera v^{er}o composita, p^{er} se simplex affectus
 nervorum, aut vitio fluidi nervi Determinat,
 v^{er}o insequit^{ur} p^{er} se p^{er} se, febrium putridarum,
 malignarum, recurre p^{er} se p^{er} se et mania,
 et aliorum affectuum p^{er} se.

Causæ

Nullum Divisum assignant veteres, inter
Convulsiones et motus Convulsivos, adeo, tam
proximam equalem statuunt, verum aliter
sentientes, judicamus longe. Divergentes dan-
ce, quippe Cum Convulsio, hæc Dependat a
majori et perverrant, per fluxum Lympha
serosa, per fibra musculare, vasa lacerata et
paralyti musculor: antagonistantem; Dum motus
Convulsivus necessario Libenter et inaequa-
litate et quasi alternata immixtione per eadem
fibra, quarum rorore Divergo et inaequali motu
ritur et Contrahuntur.

Præterea Convulsiones apertius Demonstrantur in
natis, licet sit musculor: id ulla ratione peragi nequit,
nisi a remota inflatu fibrae carneas replente,
unde si mater extiterit, neq, interrupto cum
movente spiritus eunda, Constantem Intusan-
te musculorum actione tota; interea licet
o uideri fluant spiritus ad partem muscularem,
et nonati paralyti obductio notabit, per
correspondente nuntio, equali subiectum est
affectus, etiam Cum et hoc humana machina;
et ibi invicem Contrahuntur, quidam supposito

nisi alia vitia exist.

potest, ut v. a. referat ad motus Convulsivos, patet
et aliter in casu producentibus motus Convulsivos,
verum etiam in modo quo se habent mensura.

Causa autem est aut acriam praebeere Convulsioni
et motui Convulsivum, deducenda sunt in compressos
equales et inaequales tuborum nervorum, pro, et in
in originem hinc vulnera capitis, percontantia, Concussio
violenta Capitis, et termina Dolorifica et Domini,
Alia ventriculi, renum, inflammationes variae,
alia acrium, tubula in viciis, tendinosis putrefactis,
ubi protuberantia, laceratione interna nervorum, et
acceleratio fluxus liquidis nervis, aut in viciis
solita quidem Dolorosa, quoniam Causa remota habenda
est. alia in infantibus frequentior, natalis ducunt
ex praeavi succis in ventriculo congestis, qui
nunc et tuborum suppeditati, solitum Cursum,
praesertim in tenuiorum vasculorum Cessante meandris
retardant, unde modo aequalis, ad Convulsionem,
modo inordinata ad motus Convulsivos determinati
imminet modo oculis, Labia, et alia, et v. v. v. v. v.
Labia, et affluunt, prout in Diversis Aetate
Tractibus notat et stagnat Cursum, et a viciis
Reliquantibus in ventriculo et intestinis, qui Continuo

morum fibrarumq. Hic sunt v. intestinalium
 violentos incursos, in ipsis constansque essentia,
 et faciesque et corruptum, ab ita vis medic.
 Hic sunt, v. intensior graecia juncetur, acutis-
 simum, v. Colici Odor violenti, Convulsus aut
 motus, Convulsus in infans, v. ut determinat

2. *symptomata*

1^o adest p^{ar}ti Convulsa Continua Rigiditas, obpressam
affluxum liquidi reserui, musculare. fibrae tendente,
orundum e' Comptione cerebri Substantia medullari,
e Columnas spirituosas e Conceptaculo. h^{ab}it exp^{er}imit,
et ad origines nervorum p^{ar}ti Convulsi Prospicientia
Continua urget: h^{ab}it aen rigiditas, universalis, vel
partialis in p^{ar}tem e' superiorum v inferiorum;
Determinati prout plures v pauciores origines
nervorum cerebri, v medulla spinali a f^uerant.

2^a uterium quasi hyperemittit in m. libe-
rionibus, namq. motu inordinatis agitati,
non supponit inaequalis & interposita merin-
gionis, habita. Ceteri, a modo maj. modo minorem
spirituum affluxum promovet.

aboliti & immutata functione actum
Lacrimarum, si compressio attingat quoddam à di-

... cum exinde vix solo v. partim premante
 ore musculares, replantantur: idcirco, elidendo
 huius Testinale; Libera aem remaneat eadem
 Functiones, dum illo cerebro, Libera i patitur
 pinita in Imperio, et fibras in debite Constituta
 tono, quatiunt, solaq; afficiat medulla spinalis
 a Disiunctam opem Coram pnedot, & efficacius
 pta musculares ipsi subiecta. subactat.

4^o Longius v. brevius protrahit & Convulsio
 vel motus Convulsio, prodiverit ad Compres-
 ionem concipiente v. vario in fasciculis vasculorum,
 qui modo conjungit cum affluente liquidum,
 interduo colliguntur organo & quibus munit
 ad Circulum vel adq; producti a compressione
 fugaci et instabili.

5^o perseverantio Convulsio aut motus Convul-
 sio, et talis causa efficacius agente in subiecto
 Cerebri, in perierunt affectus, et vitalia concept
 acula deis afficiunt, et nota bilorum instanciam
 in vasculis meningis et Cerebri, & tandem
 attinet vasa Cerebri propriientia lineam
 cordis, et regionem pulmonal; unde imminutio
 motus Cordis, et difficilis respiratio: et tunc cum
 affectu sola medulla spinalis, actioni vacat

malmores et al, & pte interna contabescunt et
macae conueniunt, ob id et tunc totam opem
generis nutriti, sanguis et motu immodico, vel
nullatenus subminuitur. — a pte. inappetente.

Diagnosis

Convulsio et motus Convulsivus facit argumentum
quod videlicet non recta voluntatem contrahat, et
rigida maneat, et ad mentis arbitrium electi o, post,
et in motu Convulsivum rari, varia Concussio
et agitate. Dignit. Spasmus, seu Convulsio a
paralyti, ad membrum Convulsivum s. sine dolore
maximo, v. etiam dolore ex tunc, fit, praesens in
Convulsione motu et tendine, rigidi ad tunc
resurgunt, in paralyti v. Laxi et pte. hinc
non Convulsivum motu. Resonant quodammodo
respirat ab eo dicuntur. Id in ultimo. Hic Convulsus
voluntarius motu et pte. hinc rari rari
peragat.

Causa v. quae plures catervatim, reducenda et ad ea
a pte. v. insultum concomitantem, ut progre-
verunt. Hic et, vulnus in Capite, Lapsus —
violenti Haemorrhagia, tormina in intestinis, —
irritatio medicamentorum et similia a prima causa
medica Laborem indicare possunt. —

prognosis

Convulsio et motus Convulsivi in genera
articulorum statuendi. Itaque interea affecti quies
et promptus Convalescent. Cum etenim tenuior machina
et leviori squamis et lymphis nervos humiliter
concutiatur et Labefactis, facilius quoque, restituitur
tranquillitas, et restituitur ordo Circulatio: verum
quo motus in Convulsione et motibus Convulsivis
vehementior et Disturbior, et plures vicinaque
Cavere partes occupat, eo gravissima in se habet immutatio
mala, ut virium mortuorum, rigorum, sufficiens
spirituum, aliisque per Mortalis ominis. Facilius
insuper Curati Convulsio, si Labefactis et Consummatis
Labefactis ut actio Stimuli Cypripium vermiculatum
quod i. pariter Labefactis et affluant. et cum
siquis illic venis, medicamentis actiois proceris,
sicut et Secum febrium malignarum, residuum
ultimarum variolarum et suppurationum. Cuiusdam in se
velut immutabili judicanda est, et nisi salutem
am. Viget ex tempore quasi auctoritate, de infantibus
et Concitantur. at vero de eorum sententiam
de pro variolarum. Et scilicet putida, que cum teore
eximunt variola et Separat. quod et admirantur.
travet

blaus. lue i, aggregatae fere rectae, ang. 1/2 lin. 3/4
solum suae, mitescit. nov. et. 1/2 lin. v. medulla
pinata. 1/2 lin. Curat pag. 192

Capit. xix.
De Indulgentiâ.

[illegible]

Tunc ratio in eorum, et sensum, et alia, quae subest effectus judicant vasculorum
 Cornealium, in partem, fluidi nervi inordinatam
 derivationem, et Concitatum tumultum, adeoque pro —
 eadē proximā et continenti arguimus, Inaequalem
 Tubulorum Corneae Compressionem, rāte Cuius —
 distendunt impennis vascula arteriosa et venosa,
 atq; tenio, motus et tonus fibrarum modularium
 suffocant, atq; simul spiritus uberior et inordinatus
 exprimentur originem resolutionis subiacentium data
 Compressione vasculorum Cornealium. haec aen Corneae
 remotaria, duplici prima via Cae ad credenda —
 videtur, vitio nempe vasorum Corneae Constituentium
 utrumq; Corneae subita aut Labi fluidor. haec
 ramos Capillares vertebrales, praeterfluentium.
 1.^o vascula affluunt eo modo quo Oculi ad
 determinandum insultum epilepticum, si praeter naturam
 Laxa, debilis Contracta, aut ex adverso exiccata
 nimis, minuant solitam Diametrum: si pariter —
 Inaequaliter acuta vario angulo, praeformatae, et
 diversa obstacula Quovis o Fluxum in praesentia —
 afferant, aut Tamum Cae adventitia, ut depressio

Crani, affectio liquidior? Supra quendam Cerebri
 tractum, premati violentius eorum, Contusio, et
 impediatis actis in Iguinem appellentem. Hinc parva
 hydrocephali Colluvies, siccitas nimia atq. tensio vasculi?
 arrosimata, varices, vulnosa, pitis Capitis, Contusio et
 Commotio magna Cerebri et Cerebelli, turbam epilepticam
 movere solent: his tenetur ois Iguis qui ad Cerebrum
 tuit, inequalitatis in vasa Collateralia Derivati,
 inordinatis oscillatib. vicina premit Iguinea lymphatica,
 et varicea, neq. ea parant ad induratum Suppimentum
 exaratum motu et lenitu, cum Concursu violentia
 quarundem ptium: hoc aem i^o mali Labor et origo,
 Constantem quasi Determinant epilepsiam, neq. —
 e lapsari, sunt nisi naa vinct, atatis prodigies, et —
 inveniendi Commodo, vasa arcuata extendendo, et nimis
 extensa et recta inflectendo, prout exigit naali —
 fluidorum, et meandros Cerebri Curvis, ita ut jam
 elapso anno 20^o aut 30^o, Iguis insanabili
 judicandus, sit affectus, neq. ullatenus Consideretur
 speciem e parvis Commendanti.

2^o Liquida Contaminante Coagulatione glutata et
 rarsentia: Dum enim potissima impis, acta,
 egrum inde provolvunt, et Cerebri subitiam: in i^o
 subsistunt, et tubos medullares comprimunt, et
 parit ex glathora et organo Iguinis Contingit,
 liquidam rive major copia in vasculis hauraverit, seu

impensius nesciat, prorsus majus dilatationis momentum
parietis vasor. infert, quo copiosiorum liquidorum
Copiam Convahentia, sequit quoq, ea impellent et
urubant, siq. haemostasia epileptica Determinabit, —
Nisi Coagulat Lactis, Colluvies pravorum humorum,
Instituta timor, exortitia immodica, spectri artificiosa
et cu naturali effugit, stupendum anili natras, —
Frequentior in instantib. natula huic mto prebent.
Hae acm 2^a spec. mali fugax ea solet Cum ex
mutabili fluidorum Evore dependeat, verum continuata
aut renovata Lale, vitium solidis imprimis, quo —
interfocet et hiasperat, atq, dein vinci requit Cum
vascula azevismatica, aut varicosa huerint, et
nucleos effluxum sanguinis intericiunt, si v —
teritai in qualitatib. innatis peccaverint. —

Symptomata-

1^o abolenti v. imminuente sensus oes in epilepsia,
o. blum ex eo qd Compensa medullari substantia
Cerebri, solitus fibrarum nris impediatis, verum
etiam a p. Compensam a stagnante Evore
inductam, exprimit Copiosius serum. Laxante
stamina serua, neq, ad suscipiendas impressiones
ullatanti Compensa it.

2^o variis Cerebri tractus liquidis stagnantibus —

Inquirant et Comprimi sequunt, quin Inequalitatem
quoque, prestantis nervorum originis, fluidumque, rarus
inordinatis fluctibus urguati, et exprimati in Diversam
nervorum prolem, variis prospicientem musculis, unda
Inequalis quorundam musculorum Contractio, cujus
momentum ex gradu potest Cerebrum Comprimenti, et
Lympham rarsam pellantis estimandum e.

3^o tumultuantibus in sensorio Communi spiritibus,
nullis, undarum ordine in Conceptacula primum
Compulsis, variis quoque, et alternata subsequente
membrorum agitatione, hinc illa motuum diversitas, in
epilepsia, quos demonibus, incantamentis, aut jris
Celestibus, ignarum vulgus, adscribere solet.

4^o Spuma Copiosa hervit, ob varios mandibula
inferioris motus, quibus salivales glandulae squis turgida
in motum plenis et repetitis abscis exfundunt, quorum
aer violentus a Thorace expellitur, multipliciter
Confunditur, unda spuma o bullulis aeris simul
Cum viscido liquore permixtis et conparatis tridenda

5^o Lingua frequentis Demordetur, et interdum
clauditur in fistula, ob motus Convulsivos tum
Linguae, tum maxilla inferioris, si etenim fiat ut
Lingua a proprio motu Convulsivos adigit et extendit
super dentes, eodem tempore similis motum maxilla
inferior inferiori alligatur, tunc haec simultascan

27

dentium actiorem lingua gravior, quâ dilatare et
scindi poterit.

6^o Irregulari fori requit musculorum in. ricatorum
Contractis, quin immutet iquis. Curis, & vasa
Pneumonica. Adq., vesiculae pulmonales comprimant;
Quinemp. Contentum in vicinia utq. & p. n. utq., unde
difficili ingressus auri & tubo Bronchiales, qui anhelum
et respiracionem determinant Spiritum.

7^o tandem Tumor penetrare requit infarctus —
Cerebri, quin ita crescat Congestio Siquis or. ut ad Cerebellum
immo penetravit, & o. spirituum Conceptacula, & Concom
itanti put epilepsiam tum in adultis, tum in junioribus,
Siquis satis Exposita atq., Digita fuerunt in historia —
nostra motum Capitis. —

Diagnosis

abolitio sensus ois et motus voluntarii Cum. n. tum
Concomitatio satis indicant epilepsiam perfectam. —
imperfecta. 1^o notis ex levioribus Convulsionibus aut
motibus Convulsionis, atq., sola immutatio functionum
alium. Disquisitio ab apoplexia, ex eo qd in illa nulla
est Convulsio & motus Convulsionis, a Comate ex Comate,
agnis illis agi punctis membra retrahit et loquitur,
a Catalepsi & ritum quem p. o. Tais Extremis accipiunt
et Conservant agri. 1^o editoria epilepsia notis ex-
posita presentem Cerebri, aut suspicatis tum prole,

Observi post partum ea Corripiti et perseverat, adventitia
 vo' dum post natiuitatem invadere solet, et quendam
 Caam manifestam arguit. Signa vo' Caam immensitate
 mbum producentium satis patent, an mter aseris mate
 variabli, tuberculi v' Ichiro Conitetti. Cae vo' procathe-
 tica, ex agri v' adstantium velatu, victus rae, prorsiq,
 at pathematis. Denuncenda it. in infantib' aem epilepsia
 oriunda a vermib' nuntiat, ex stidore dentium, terminib'
 Intestinos? Fictioe narium, facie pallida et decolora, et
 stupore quodam Cerebri. —

Prognosis

affectus iste periculosus, et Longior statuendus e.
 diti ta epilepsia e plus v' mtrius periculi Coniunctum
 fit, et Difficultatem Curationem Suscipit. Reroditua-
 varissima e, v' ut vera dntam nroqum Curati, —
 camp, et, v' medici solertia nullatenus attingunt.
 Tum acontia adventitia et rae, facie e medice vincit.
 periculosior ea e in genere in qua functiones oer abdent,
 Convulsio vehementior, Diuturnior e, atq; excrementa
 e' p'onte flumant, minus aem periculi fit, non observio,
 Insequente gravissimi, et in qua aeg' Liberis —
 spiat. Inqum adulti os jam Determinatum Cerebri
 nitium, aem Curationi p'p'm deponere dnt, dum nroqum
 Desperandum e De epilepsia e infantis aut
 junioris obidet, hoc etenim solis nae vivit, sola
 mutaoe etatis, fugato pavora, et quodam alio —
vehementi

vehementi patremate felicius discutito, cum hinc 99
Corrigi post visum solidum, et diametrum curvatur.
vixit ex hoc varie restitui sunt, Line epilepsiam usq, ad
ultimos incrementa. Linita, sanabilem statuimus ultra
quos nulla manet medela fiducia. si in infante, mox
post partum epilepsia corrigiunt, incolumes nec qm
curvari pnt. Tandem si fœminam utero graventem fortis
invadat epilepsia magnus periculum minatur, jamq, a paucis
mensib, nobilem matronam latentem vidimus insultu
epileptico tunc graviditatis, qui brevi in apoplexiam
Fœtalem degeneravit. —

Curtis 193

Capit xx^{um} De strabismo

Interdum motus convulsivi v Convulsivis & epilepsiam
Comitanti multo strabismus, seu distortio oculorum, &
vixit visum quodammodo. Sed et, verum etiam et
Luminum venustatem Degradat. qd q, vitiosa oculorum
Conformatio, nativum malum determinant. strabismus
imperitia matris v nutricis contrahit, dum in infante,
pneumonia Capite cœci aut Cardacho acuto advenso, v ad latera
posito decumbunt atq, ita oculos Continuo Laci obvertunt
quo cum infantes Colliminant. Distortioem hanc oculor.
efficiunt in hoc vitioso oculi situ, pupilla longius
obtus v recte, & obliquè opponit, neq, ipso in medio oculi
apparet, & ad eo Declinat, ita ut in uno oculi, pte, pler
albi appareat qm in alio, et amborum unus, aspectu ce
nequeat, ita ut qui mto hoc laborant cum obta vultu —

Vimptomata

1.^o adest Distorsio oculor. v. v. aliam aut alteram partem inclinantium, ob variam Oculi i. e. laxitatem aut paralyinm Mucleatorum, adductoris et abductoris — Superioris et inferioris, oculorum motibus inservientium. —

2.^o obta ē sine tortuoso appetu Carni p. t. cum in naturali situ radii Luminis nequaquam p. foramen pupillae transant, et necessario requirunt Conversionem oculi ad Congregatos radios, obta imaginem debite representant.

3.^o Dato statū stabili mi, supposito oculo in cā p. t. variis qm ex determinato vitio inclinat, obta quiescentia ē mōta in latera oppositum delata, Confusam visionem movent, et varios fulgore excitant, ob impeditum accessum penicillorum luminis, qui statim ab ingressu in obicem patienter refractorem, tumultuosius quoq. p. r. retinam: —

Diagnosis

Stabimus p. se patet influentibus, neq. signis q. b. Cognoscit op. e. Cā vō Diffusio oculi p. t. visionis t. mōta id patefacit. si etenim geminatum objectum appareat, iudicium ē affectuum musculorum, Contra vō Cā in p. t. crystallino suspicamus, dūm tūc in d. planum retina et pupillam v. h. t. Difformitā, unde oculi ita interrogandi veniunt, ut equalis in utroq. fiat representatio obiecti. si vō ex mala Coniunctura, v. defecto oculor. obta Contraster fuerit Stabimus, ad statū ē infansib. simulante, delarebunt.

Prognosis

Strabismus, Cuius in materno viru, constituta fuerit
Cunabula, et Cont'a prava organo? Confirmatio-
dependet, nullâ arte superari p't, neq. pariter qui altæ, et
consuetudine aut Convulsione, et paralyti nervorum pariali
propicientium radice agit, Dùm acontia' ruen, malum
facile tolli p't. ————— Curas pag. 197.

Caput XXI^{um}

De calculo vesicæ urinariæ et urina incontinentiâ.

Incipit huncce articulum Consulto prætermittimus, ut
pote' cum sat fuerit in Diacata notio morum infirmi
ventris, generis Calculi, symptomata, Curas conuocata
fuerint. adeoq. urina incontinentiam quasi præis-
familiarem uricæ prætractabimus. in Infantes ætæ duæ in-
Cumis jacent, præ Dederis et Turpitudinis inciti, urinam
in involucri et fascias Liberior et Continuo emittunt,
et ita Lucice Dipteroni interdum assuescunt, et postea
adultiores, etiam in omni, Solum in Læto profundunt.
It et in multis aliis qui o' Solum vapores somni, et et omni
tyo'e urinam reddunt inciti. sic Dederis incontinentiam
illud urina profluvium guttatim et Capra' videntat, aliam
illam —————

Differentia

Levioris momenti habenda est urina incontinentia
densissima, alia etiam Latè ruen, altæ et inveterata,
una accidentalis, alia habitualis. tumidæ ætæ p'et a
Causâ ext'na et adventitiâ, dunt'q. ab interni. Solus, cit. —

Causae

Centrum ex physiologia sphincterem vesicae a natura
determinatum fuisse ut urina Continuo Exeret id, in
vesicam Delapsa, pari rivulo ex Cavitate o Liffundatur,
et in ea p. tempus incarascata et Contorta solet, donec voluntatis
arbitrio in mole et actione sua humoris Contanti ad
ejectionem sollicitaverit, ita. ut si quocumq. modo afficiatur
Sphincter, quidam innumerosi seu metuo adventuram
mutationem necessum sit. Contractionem sphincteris validior,
nequaquam accuari potest, siquidem tunc temporis, ex impedito
adfluxu, Cumularis humor Excrementitius, itaq. Cont.
inulperanda veniet sphincteris praeter naturam Laxitas, qui
et partia fibrarum nullam accidenti ad Collum vesicae
liquido molem posando, involuntarium urinae profluvium
patitur.

haec aem sphincteris Laxitas a multiplici causa
Comprobari potest, ut ratio juvenis Constituti murevi, debili
cum fibris in ea a tate Contextura, et absentia doloris et
Caloris, aliorumq. evidentium spasmus et rigiditatem
inducentium multiplici causarum Concursu invadere potest,
et ad internas et externas facilius reduci. externas aem
manifestant inter in regione hypogastrica, violenta
intrusio catheteris in vesicam, ad diluendo, et
fortius quoniam pars fibrarum sphincteris posttrahendo,
solitum tonum et actionem imminuunt, suppositiva
Oralnatio, Tambitis in Abris humidioribus, et alimenta
dilutiora, et immediate vasculorum cum textum Laxant,

104 *prospiduum quiescent, inertes et languidos spiritus,*
ferendis et digerendis villis moticibus prorsus impari
suppeditant.

Interne vò longioris promerenti narratione, siquidem
et numeratione, et levitate difficiliore, judicando fit, ut
Calculus vesicae, progressu ejusdem inflammationis, progressi-
mò Labi, Constitutio aquosior, provia organorum
cum relaxatio, et inertia ad motum et iò posito —

Calculo vesicae vò inflammatione, continua aegritudine
et mole Calculi irritante et stimulante fibrae nervae,
uberior advocato liquidi serui influxu, et ultra-
modum adeo tendunt villi motrici, ut demum —

Perdantur tonus, robur et actio, et liquidum erga-
nt, idem dicendum e de tasi inflammatione in
quâ, cumulantur humores, et vascula sphincterem
Componentia ita distendunt, ut Urinam acceptam
impellant, et contra Contractio nisum Urinæ sequant,
vò dissimili prorsus ratione parali organorum laxitas, nix
ex Labilitate vò aliantis aquosioris ortum duxit,
urina pro ut inentiam producat, quippe hoc fluidante
Laxata vasa praestitè contrahunt, et humores appellentes
Coiscere vò prae. —

Symptomata

Guttatim et alia voluntati actus urina exierit,
et Laxata fibrae sphincteris quorum ratione apparet
Collum vesicae, et nullâ obiectâ mole sensim diffundit

Lectum, quā portio ex uracis in vesicam immittit.

2^o req, ut ullus Dolor urget, et si patitur a progressa —
inflammatione intra diu dependeat, cum fibra ab irritata
et mole liquidor. jam defatigata, impressione transiens
urina vix recipiant, nisi ad eum asimonis gradum —
peruenit, quo gravius affluente, tuncq; reverent levior
discuria.

3^o vix sensibili et manifeste ē in pueris q̄ diu urina
incontinentia, diu contra quasi continua ē, q̄ noctem
ob temp' maj. tensionem nervor. cum qui a cerebro et
medulla spinali profuscenti, vigentem et continuatam
igne calente et spiritibus agitati, ut vō' soporis —
dulcedine laxanti magis ea vascula, et in partem
reducunt, suppressi fluidi nervi inflexi, unde —
fibris muscularis, et contra sphincteris vesicae —
revolutio nati tentantur. —

Diagnosis

Incertum ē ex urinae incontinentia utrum mō sit
distinguenda; at vō jam adultiora facti infante, p̄tē
rescundia tituli, si urinam hāc in Lectum amittant,
q̄d iam Latere vitium suspicari p̄t: si vō ea contigant
ex Calculo Aridente in vesicā, v̄ progressā —
sphincteris inflammatione, propriis signis —
Et Relatis morbis peculiaribus qm facile
reprehendit. —

Prognosis.

Si prava Conuetudine contrita fuerit ac Labor et nocte thum manib; tect; plerumq; fronte. et etate progrossa Corrigiti, cum iam quasi adultioris pudore et exprobratione moti, re' jacti dormiendum qd tale Committant magis sint solliciti: verum si vitio culpam venia supervenerit vino incontinentia, v conjugato cum affectib; leporosis, et aliorum musculorum resolutione, vix superari pt: dominum si ab-
 ingentio regastines fieri aquapoti foveat mib; faciliorem a motu illa Conuetudine Quasem suscipit, a si etate virili Continuo Laborem pariter usq; ad finem perseveranter determinat. — Curcio, pag. 194.

Caput XLII^{um} De hydrocephalo

aliquid bonum humos in Infantium Capite, ita Copia Colligit, ut illud in tumorem attollat qui affertur grecis hydrocephalus, Latinis — vero hydrox Capitis appellatur, quem idcirco — definiendum Censemur aquarum Collectio in intra pta incephalum Constituentis.

Differentia

Differentia

Differentia hydrocephali, deducenda est, 1^o a numero
 etiam a diluvio aquae inundantis, hinc ipsius divisio
 in generales et particulares; prout adam Helmcruphii
 Loca molesta sunt gravantur, et Caput de ipsa dicitur.

2^o a sede Collectarum aquarum? et a Causa hydrocephalus -
 dicitur extensus, dum alia extensa solobolus, et Causant
 aqua inter Cutem, musculos, etc. periventricularem, et inter
 cranium et meninges, et inter membranas et cerebri,
 interiora dicitur consumit. 3^o Facie modi; Cum, jure Caput
 independentis ab illa alia Causa occupantem alteram
 lymphaticis, excretionis solita suppressio, putat
 urinae, suadet solit. tandem hereditarius, Congenitus,
 adventitius nuncupatur hydrocephalus, prout a
 parentum Labi transmittitur in utero progeneratur,
 et in Luem dicitur peculiaris Causa actioque ingreditur.

Cause

Causa proxima hydrocephali. Deducenda
 fore contentiones, excretionibus tunicarum variis,
 et eandem nuptie et humores lymphaticos serum
 sensim ac sine sensu guttulis continuis, et pleniori
 rivulo, intra et extra Cavitatem Cranis in tantum
 affundit. plenum tamen et aequum, vasa nimis et

ultra modum dilatari non, nisi prius quies, moles
 et impetus Liquidi Contenti, robur et actio turborum
 cupelaverint, etiam aucto Liquidorum momento, vel
 retardato Currentem motu vires majoris resistitae gaudent,
 soliti in Canaliculis velocitate Liquida proculi nequeunt, et
 diuturniora moram in his Bafis Aquatis, et tunc
 profundum distendi necesse est, et durius vacu-
 obstructis debilitatis vasis Symplicibus, a densatis liquidis
 praesistentibus moleculis, et praesentibus quocumque modo ignis
 illata fuerit, ita ut Circulanti Lymphae via teneatur,
 maj, necesse est vires in Lata vasorum exierit sermo -
 Lymphaticus humor, et a vasis ut - pote debilitatis -
 Justitiam et potestatem, et tunc membra infantum
 solida Componentia et rupta, et via Currentem
 intus ducunt, eo quo per e modo ad fluxum
 humoris sermo Lymphaticus, ut facile quilibet evenit
 pot, notabili vena animali injecta Ligatura, porro -
 tunc, turborum robur diminuitur et Augere fluitat
 Circulantium actio potest, ita ut ipsorum vires -
 ipsa vasorum resistitae Lymphaticis, inter Cuius remota
 Hydrocephali secunda et. si in partem obstetricia
 Aquatis praecautis et teneantur compressis, imo et intra
 uterum indubitan praesentis ita, quae quodam tenore -
 Cum Liquidum ad Lymphaticam sua diffundentiam inhibeat,
 uterque ipse ad Hydrocephalam Lata vergens et ipsa
 tentatis, Lymphaticis matris Lymphaticis, ipsa -
 teneantur pituitorum, vehementiora et pathemata.

dein vñ post partum Caput mole grandior, deorbitur —
 infanti, & suis humidioribus, Lac vis eorum & aquorina,
 personis nutricia, vna in vita humidiori ad hydropothalam
 disponunt, & illud robur vasa Capiti progerientium,
 imminuunt penitatem, Cohesionem et fluidorum variationem
 determinant, & uberiora subministrant pte aquae sua
 copiam, & indigne caperant, vasa encephalon Congestis
 relaxant et eorum raptioni favent.

Simpt homala

1^o Caput in mai' imo ad tñm molem attollit, ut
 o, emei videtur inter exarandas praesentia, infantes —
 quorum Capita ita monstruose preverant, ut vitulor.
 corria aequarent, & ibi videtur e' exharvato —
 humor non v relaxari pte encephali, quo fit ut
 diluvio aqae labefacti ipsorum tonus, unde lenissimae
 sine sensu a congestis liquidis distendi videntur, et ipsorum
 propulsioni haud difficili negotio cedunt.

2^o quovis maxime ree distendant pte encephali, nulli
 ta sensu pte dolor, ob relaxatam tñm sub rursu tonum, —
 & csi, propius origini, difficilius propagant impressiones
 usq, ad Impodium, & paridala contaminata, agrie
 eas suscipit: —

3^o mirum in modum delinunt suturae, lenis &
 quoniamdam rege, ob tenuior adhuc homines omnium
 Compaen a reversione in communem relaxatōis, tota

trahunt, unde nisi aquarum distendentium debilitas -
reluctantur.

4^o Ipsi et propensio ad somnum dolensante tum ob-
rapidam et effatam fluidi nervi qui servit² nam, &
minus futura & villorum motricium tensio, tum etiam ob
Compressam illatam nervorum originis, unde minus -
nervi flexuvis irritabilis evadant.

5^o Interdum super veniunt Convulsio aut motus -
Convulsus dum semper aqua collecta, aequali n^o a -
Convulsu subitaneam Comprimunt quo fit ut p^{te} ad an -
Continuo & interpolatim Lympham nervam, uberiori
Copiam accipiant.

6^o Attingit macis, manuum pedumq; intumescentia,
a debilitate vasor² omnia deo² fluida prozellesant &
tenacitate cohesione liquidum & tardigrado Cursu, ~~inter~~
aorta, varios Congestionis gradus Conspiciunt, varias p^{te}
gravant, et etiam ipsarum intumescentia, & reparatio parum
idonea evadunt. -

7^o tandem stupor em, propensio ad motum, sensuum
lebetudinem, & Laxato Viscerum tone aquosioribus, et agniti
Circulantibus fluidis ractis deducit. -

Diagnosis

Solo visu facilius Significat hoc malum anam
atem Capitis p^{te} graventis humore sermo. ex signis
dicendum est; si etiam Ext² Cranium vis collectis
aquarum, tumor fit evidenti² obvis, molli repulsio,

ingere se hydrocephalus periculo & levis e, imo et malum
 inevitabile Censeri dicitur, praesertim si p[er] interiora Cerebri et
 ipsius substantiam late penetraverint aquae, tunc v[er]o Clotargo
 v[er]o apoplexiâ accedentibus, non in p[ro]p[ri]o loco, cum levia
 medicamina parum juvant ad evacuandum diffusum
 aqueum Satietem, Potia v[er]o atq[ue] tenax agris vix tolerabit.
 at v[er]o si leviora Cerebri t[em]p[or]e obducant, et Diluvio
 immunes sint Cerebri ambractibus, levius imminet discessio,
 & t[em]p[or]e difficili negotio discutiantur aquae Collectae, nisi in
 peculiaris p[ar]te exterioris redundaverint. perit is d[um] malum
 a lat[er]e ext[er]nâ, v[er]o excretionis solite evacuatio suppressâ
 sololesit, Facilius tollit, q[uam] d[um] impingit a lat[er]e internâ
 jam Cerebri Labo factante. Denique qui p[ro]sternit
 ingruit v[er]o adventitius extiterit hydrocephalus, Faciliorem
 suscipit Medelam, at v[er]o d[um] a parentibus transmittit, v[er]o
 in utero generati, cum Curatio s[ed] et admodum
 Curatio pag 199.

Caput xxiii.^{um} De Rachitide

Rachitidem novum nomen pronuntiamus, qui statim
 definiri p[ot]t[est] irregularem p[ar]tem solidarum p[ar]tium et figurâ
 Cum Curvaturâ et prominentiâ Extrematum omnium,
 & qui planius Descriptio innotescet de hoc aet[er]n[al]i mutato
 p[ar]tem figurâ & p[ro]portio, Caput grande et notabiliter
 observati, d[um] alia p[ar]tes musculosas, graciles et extenuatas,

ita quoad maximam partem iuvant, et circa —
 articulos, prominent, spina vasa inflat, unde —
 varia pectoris compressio et angustia, tumet ab omni,
 & macie Consumit reliquum corpus, cutis ubique —
 faciat, et decidit & articulos omnium compages his —
 ita ad, uagiti ad motum impotentia, ut quasi non sedenti,
 ludere, aut pedes iuvare p. certum tempus allatendo —
 possunt, hic affectus tenaxioribus tunc annis solet ludere
 et quasi infantibus aetate propriis Considerari, vulgo a
 sextuplici post partum aut divitiis mense, adam prodit
 suis indicia, et nunquam adultos aggredit. —

Cause

Varia in medicum adducta fuerunt opinioniones ad —
 determinandam causam et explicandum modum quo
 rachitis generatur, ut glisiori, major, et complexum, —
 qui irregularem partem et omnium conformacionem at —
 Curvaturam Succo nutritio & alterum laterem partem
 ossium inaequaliter insinuat, & exiguos musculorum
 inaequali vi trahentibus tribuenda opinanti, & a
 in nutritioe simplici omnium, et contra, in partem naali
 absolvent, divenam in naa, in rachitide adstantes —
 indicant viam. etiam certum e partem auge, cumq. —
 generis extiterint, & exceptis ossibus, & febris, in origine
 mollioribus compaginantis, augeri, juvenes esse & extendi,

oleo et pulvis liquidorum praesentem, et Lymphatica quidem
 ad hoc opus mirum in modum comparata, a suis vasa
 explicando ut plures Censent, seu judicatos vasis —
 gelatinosi et Concreti ut glaci alius, accessione atque
 nutritioem provide Determinat. si igitur Lymphæ nutritia a
 ppter omnia vasulorum minimorum, et Contra fibrarum
 ossearum rursus Continuis motibz succedit, prorsus Contaminati
 qualitatis, ut gravibus Duriculis et exquisitis Concretis,
 patet evidenter immulandam fore memorati humoris —
 distributionem, adeoque fibras osseas inaequaliter extendendas, —
 Laxiores potissimum et minus resistentes a extremitatibus
 omnes accumbunt, unde etiam immediate nutritio,
 repetitur ex Lymphæ nutritia visidiori, inaequaliter
 fibras osseas regentes, et irregularem Contra excretionem
 modum determinante: talis enim Lymphæ viscaria
 multiplicem Causarum Concursum agnovit, ut Lues —
 Syphilitica, scorbutica, aut scorbutica, a lymphaticis
 Cruribus inter affectus, nec ex parentis a matris Contagium
 — aliunde et aliter Concitari Lymphæ tenacitas, atque
 Coagulatio Causis externis Communibus, ut alimentis aut
 Lacte visidioribus, aere frigidiore et nebulo, balnei, potu
 nimis refrigerantibus et Quæ Continuali, Constitutione —
 ruppida et effata, a ea Laxando vasulorum Contextura
 impediendo permeabilitatem et obstruendo vasa inaequali
 fluidorum cum distributione nata, prebere possunt. —

1.^o mutati p^{ri}ncipium occasione. Conformes, ita: ut omnes
 invadentes, in h^{is} metametab^{is} notab^{er}ent, et odora
 appareant, ob memoratam Lymphæ nutriti-
 vum, simulq^{ue} dispositionem h^{is} metametab^{is} in
 medio & lento compressa, minus dehiscunt, et
 facilius indurunt, dum s^uavis in h^{is} metametab^{is} Cohærentes,
 quoniam & alia crassiora Lymphæ uberius admittunt,
 & uberius congesta, magis ac magis fibras extrinsecas
 extendunt, impliant, et in tumorem nodorum attollunt
 unde & solum irregularis accensio, verum etiam præ-
 nati, omnia inflexio et Curvatura.

2.^o Data tamen vitia omnia Conformes, si Lab^{is}
 rachitica ad Cortas reversant, variè angustabunt et
 præmentis claustra pectoris, hinc præmentis minuit, et
 expansioni pulmonum, obæ insuperabili affert,
 actioni vasculor^{um} et vesicularum pneumonicarum q^{ui}b^{us}
 laboriosa vadit Respiratio, & fluctuq^{ue}, sunt visib^{il}ia. —

3.^o pedibus incedere, aut parvis motus h^{is} metametab^{is}
 rachitica, si Liquidum s^uperum præmentis in fibras musculares
 derivatis, et s^uperis ipsis vacuatis s^uperantis præmentis medulla
 s^upermedullar^{is} coarctante, et vitali liquoris fluxum
 inhibente, imò p^{er} h^{is} metametab^{is} præmentis præmentis
 contabescunt, cum & solum Lymphæ nutritia in quæ
 præmentis, verum etiam solitis liquidis omⁿia in vascula

minima fluxus suppressi, aut saltem imminuat.

4.^o proavis contaminata qualitate, supponi potest
Lympha, quia in vasculis propriis haeret, cumuleturque,
quoniam de infarcat, unde obstructions hepatis et
Lientis, chyli mesenterii in istas ventris, intestinaeque
Refluxus, aliique, ex eodem oriunda propter se perficere omnia
figuratae solent. —

5.^o Denique obvenit etiam quaedam dum universa
rachiticosum machina in seipsum vertit, atque, quavis res
debilitante, solida rigore carere experitur, immo acriori —
pro lateris instructo se ingens, atque, idcirco vivacitate
pro carnis rotores et notabiliori capitis mole, et amplius
fibris medullaribus, spatium concedendo, equaliora —
quoque, et regularia illorum subcultura liberius geruntur,
unde rachiticae idcirco, vividius geruntur, acceptae —
promptius comparantur, atque, cerebro dicatas actiones —
acutius exagitant. —

Diagnosis

Ex relatis jam signis, facile indicabitur rachitis, —
potissimum ex nimia capitis mole, angustato pectore,
et nodosis ossium extremitatibus, Lientis tamen etiam in
rachitide intervenire, et per adam praeventis ossa,
ut tibia, femur &c. atque, notabiliori deprehenditur in
artibus mollioribus: a qua re tamen tamen ortum ducat, —
attendendum est ad habens quae parentis inquinari potest,
ut Contagio syphilitico, scrophuloso, sed prope, et

semelioribus Cuius et mto lignis Detegit p^r.

Prognosis

Dissectis epinis sponte rachitis, Lymq, mto anaxia,
 Tum puri adolam, et atq, vegetior oss, et ii gungat
 Cum due vasa, sero, holora aut vordubia, Difficilis
 Superat, presentia si ab hoc d'ituro masee malum
 Dimanaverit: perimio etiam p^r omnis equito rachitis
 In qua notabilioris notis attollunt ossum extremis
 Cum, pectora angustata et acuminata, ventis inflata,
 Inappetentia, q^u si superaverint debilita, rumora,
 Febri, lenta et marasmus, et etiam asites, aut hydrop,
 Cujus piam alpeius Canisali, nullis remediis vincit p^r.

Capitulum xxiv^{um}

Leapthis, vesiculis gingivar^{um} et inflammatione tonsillarum.

Larvis interdum terminis, p^remittit in san, Continuas,
 quosdam emittit, quos Caem mater aut nutrita debere
 p^roint, donec frequentiori Pictioe Labior^{um} et Convulsio,
 os et lingua asites, vesiculas gingivar^{um} et inflammatione
 tonsillarum duplente, et brevi sequentis, agnoscent,
 itenim nihil aliud et om p^rava, superficiaria ulcuscula,
 a in palatum, gingivas, Lata p^ratena gerarum,
 fauces, tonsilas, uvulam aliasq, internas oris p^rta longunt,
 et diffundunt, sicut motu ista familiarum ce

gentis borealis, et palidiora loca habitantibus, —
 Communior ut authorum fides. verum tamen frequentior
 fore calidioribus, acribus, ut Syris, aegyptiis hanc ulcera, nemo
 diffidit, cum ibi epidemia quoque, Labia exstincta, et
 antiquior, tale arctico Canadae, aegyptiaca et syriaca
 ulcera appellata fuerint: hoc cum Capivi auxori et c. —
 Senex infestant, cum vario in variis modis, diversis
 Colicis symptomatibus, et dissimili crusta a se nobis
 differentias constituent. —

Differentia

Quod, solitariae quasi marquant ulcera, indurata aut
 Labiorum, angulis &c. nulla bruta sui Constantia,
 interitum minuso et malignitate fortiora, variis in
 partibus coarctant, itaque tegunt et obdunt. Deinde mox
 tenuis et emulsi anni apparent, unde praeputia
 inestantes, leviores aut maligniores molles insistant,
 et duriora ad ultimum Crusta eductantes nominari possunt
 crustulae. —

2^o adan. Caliditate ignea accensum tenentes, praeputia
 modum vicia, acribus inflammata dependent, —
 et profundius affeetas, ita evadunt, alia vero tantum
 praecedente, praeputia multum adunatum coarctant hinc, neque
 illas inducunt angustias omnia Crusta alba, flava, —
 splendens et tardius remigundens, a Crusta Crustis
 Penaeonibus, foveis itaque, duris tegant, unde inflammatoria,
 chirovosa, Cancrore procedunt. —

3^o Denique cum vehementi dolore, et acutè aut continuè
 ab eis conjungunt, quòquidem in easent symptomatib,
 atam sapient et fluctuatione decidunt, omnia illi
 restulant et renascunt, priores adhuc densiores, et
 superiores, plura ex locis affectis quasi designatis —
 Limitib, subsistunt, non alia latius serpunt, ac
 vicina deperunt, unde varia ulnunculorum
 species, diversa nae et dissimili eventib, —

Cause

Demum proxime, in ultimis emissis, liquorem
 salivarium et mucorum fundentib, causam vè proximam
 in solutione vasculor, oriundam a tenacitate, acimonia
 humoris secreti, texture glandularum dilatantis, et —
 exulcerantis, si etenim ponant ab eis in emissariis organum
 secretorium et excretorium constituentib, Dentriobstacula
 derivari solita, humoris excreandi, et aliunde tenax et
 viscidus Lymphe præloherioe molecularum in vesiculis
 remotib, hinc è his tendenda fore ultra modum vasa,
 fibras necesse, ab invicem disjungendas, uno verbo —
 Dissolvenda eandem nexum, dum ex aliâ pte —
 Liquidum solitis motib, æquagm conquassatum, ab eis
 in coagulum, putrescit, corrumpitur, et ulcus determinat
 hoc æm tum in solidis, tum in fluidis variis datib,
 inducitur vitium: apta ta quadam patiunt differe
 habito respectu ad structuram et invasionis modum: sic
 quavis Lac nutritici moleculi, aciosiles saturatus, et in

orbem Circulationis ad os, &c. delatum, variis prae-
 dispoſitis vasculor., laxitate ſcilicet & obſtructione, ſeſes
 affluat, adeoque jam hinc praeſentibus ſale contaminatis
 & ſtaliſalivalib., magis q. eas viſa exſit, lymphæ
 vitiatæ: ſic paritæ hæc quædam peculiari diſpoſitione
 ut ſcrophulorâ, corbutâ aut veruſâ, memoratæ —
 ulcuſcula facilius producit, cum neminem ſilicet
 designatum utrumq. Contagium, Coagulandiſ fluidis,
 et ſolvida ſtuna ſolidarum unitati, maxime, idonea
 ee tunc obſit q. ex præſentibus præſentibus Lactis Conſtitutione
 a nutritæ ſuppoſitione, necnon ut, paritæ, continget
 alimentis acriorib., piperatis, cum eodem forme mōte
 chylus ex iis generatur, acidiuſ fundat coarctiores et arctiores
 moleculas, ſquiniſ compaſſionem ſolventes, et exſiccantes, —
 quæſum ſuaſa tota acidiuſ evadit viſcoſa, et ſolidiſ
 potius & clauſat q. ſorbet: hæc æm cœt rariore q.
 præſentibus, quippe cum ſuſcipiuntur alimenta, nullatenus
 coarctant, et ſolanda, liquidiorum mōte, coarctandem
 actionem facilius arceat, et tō frequentior obſervatiſ in
 adultiorib., qui aromaticis magis dediti, & alimentis ſumo
 et ſale conditiſ, præ navigationis incommodo ſubſtitit, aut
 ſæpius paluſtiora & maritima loca habitantib., —
 ſalugineam ſaturnigenam hnt, q. in die ſorbet et
 intendunt, et nimis veruſi uſu, & aliis exſiccantiſ,
 ſpirtuorib., ſtroſib., &c. exſiccantiſ. hinc nautæ in
 ſtataria, angliæ, aliq., ſupponſionaliſ dæſis, frequentius
 apertis tentantib., tandem declinant hæc ulcuſcula in

121

febrilib, putridis, malignis, et zotechialib, cum ad en-
trea a talib, conerit affectu, stagnas nempe et putrefacti
Liquor. Cavitate vasculor. absorbentium, videntur uia,
aut vasorum claudat, supprimat motum et osillatoe, -
Lympha multa nam et indolem mittit, oiaq, ad ipsam
massam, vasor. solutionem, et exulescentiam requisita, -
accersat. -

Simptomata

1^o notabilior supponi requit obstructio in vasculis, -
Salivalib, internam oris cavitatem irrigantib, et q, -
vitiosa lingua p calidulantib, quantitat, indola, et
motu, quin vasa successive dilatarent, effundat liquidum,
in membranis Capulis et Cellulis, ad jam spissum et
Coagulation. successivè magis indurato suppressa vasorum
actioe et Contactu cum ambient, unde Crusta e, in ipso
aphtharum declarato.

2^o o jussu atq, sponte manet fluxus humor, licet
Eraniorib, moleculi Compositi, etenim educta -
vicinor. vasulor. osillatoe, interno pro obicib, et -
resistentia ptium adiacentium Calore, Effluvia conquaret
liquidum, vivimodè alterato, et in tñtum adigit motum,
ut vasectioe alitate e vicioe Diffingat repagula,
viamp, ibi pandat p oscula jam dilatale aut lacato,
unde stillucium humoris raris, purulenti visidi, aut
dilutioris. -

3^o variis tñ deprehendit Constant aphtharum Color, -

Cum diversa qualitas, liquidi lymphatici effusi, atque moleculi purpurei commixti, mai, & min. partes, & fibrillae se solvunt et densant, et respective quies humoris stagnantis et putrescentis, mutat cohesum, Cohesionem, superficiem atque solidam et fluidam. — Luminosus radius variis refrigerantibus. —

4^o dum Crusta totam superficiem atque descriptam tegit, tollit sepe, & soluta ob pressuram raris illatam ex humoris visibilitatem inhiabentibus, verum etiam ex induratis vasculis et fluidis, massam Crusta constituentibus, & actionem quorundam humorum impedit.

5^o at ubi Crusta decidit, aut decidit, asios et viridior & sensus, et copiosius glandulis humoris diversi generis per varie teneatati, cum hinc & tunc palant fibrilla nervosa, facilius incurrent, atque vascula lymphatica et sanguifera, jam aperta remota obice, nullaque obicula Crusta mole liberius effundant, unde salivae, et saliva quiescentia effluxus.

6^o illam Crusta brevi renascenti, et repullulant, imo sepe magis atque, deterius, regenerant, ob innatam organo leucostico labem et excretorio, & vitium altius infixum, in humoribus, quibus, ex mora insensitae, magis adhuc acrimoniae gradum, atque putredinis violentiora Comitatus lymphatici Contrahunt. —

7^o tandem si Crusta ulcra, compacta, et latius diffusa invaserint interiori, expit corrosio, aut necrosi, hinc humoris Circulus, unde destructis palati involucri, et atque vicinarum, & etiam gangrena & Phacelus.

Phacelus. — Diagnosis

aphtharum historia et Iocus, eandem nam et cognitionem induunt, cum sit. p. a. ulcusculor. prodr. Color rubicundus nris affecta, maj. vasculor. squig. v. pallidus v. s. p. albescent, lymphaticor. et salivallia tubulorum numerum notat: Ternum dum quasi committit et flavis appareret, memorata ductura progenis et divaricatione simul cupanda e. detestior et maligna, series effluat et promptiori vicinas. p. breviora dignoscentis, at v. a tumorem corruptum o. fundunt, aut Cyta facilius collecti, aut decidit, vivens statuant, p. c. —

Cognata et aphthi, v. fere eandem cum aphthi —
 viciula e. in gingivis infantium interdum pullulant,
 eandemq. originem, sicut et curandi methodum
 agnoscunt. d. d. spectat inflammation tonsillarum,
 et obidit gemina glandula, utrinque ad radicem lingue
 paulo super pharyngem posita, a latinis tonsilla, vulgo
 aliqua amigdale dicunt, et hinc reducenda e ad anginam
 q. ad v. peculiarera, o. solum in infantibus, v. v. etiam
 in adultis. Hoc tenent et reliqua p. —
 inflammation, designanti, rubore, calore, et dolore nris —
 affecta, cum deglutitionis ac respiracionis difficultate, etq. —
 eandem vices patit, desinit em in suppurationem, ulcus, —
 ichyrum o gangrenam.

Prognosis

o multum reformidanda et apta vacantes, praestant in
 mollioribus, praestantem quodvis, et facile remedium, cadunt,
 at ubi radices egerunt altiores, ut quid putredinis, v. aeris
 gradum. Consequuta agrius, rariore, et minus mollitie
 suppurata consumunt, adeo lactantibus nullum quasi
 remedium, atq. ab eis gargarismate, v. externo remedio —
 pertinacius detrahant. o aem idem e pa adultis, periculum
 qui clamant auxilia, et vim medicaminum libentius
 poscunt, quo insuper nequiores et fatidici guttulae, co
 detiores humorem crassius denotant, et tentis major —
 possident guttulum, qd remittit, dum albescente
 superficialis est, atq. vicina o operuente. tandem si
 supervenerit febris, acuta, maligna, aut pestilentialis
 mortem brevi subsequatur nullatenus dubito, —
 praestant si major sit conuulsum nuncius, in ore, lingua,
 et aliunde. hume ingest vivum praecellit. —

Cutae
 pag 203

Caput XXV. um

De Variolis

Communis sent, atq. verosimilis, defendi et variol
 orum contagium, orientales auras, at indiar, arabia,
 i^o invenisse, aut saltem ab arabib, sive designata,
 mox nationum commercio in Europam migrasse, ubi
 solitis quasi depositum stetit, fidelior, adhuc —
 itaq. et inevitabilis. ed co perveniam jam dudum —
 infect, ut vastata provincia, depopulata urbs,
 misere totorum solitudines, morosiorum ductu,

compa tent totas exurias, horrendosq; sanitatis affectus
 quotannis fere nunciaverunt: hinc humanum genus —
 immensum saeculorum vultus nam in dies imbecillior
 fore, et infensa declinare. Contagia, aut saltem oppugnare
 acutius premebent, insurrectione variolarum excitavit, à mollioribus
 infantum quoribus, laxiori compagi soliti, atq; moderate
 tepentibus fluidis communicata, furor, atq; violentiam mali
 quod antea remitteret et coësceret cujus variam originem,
 Nihilominus, eventum statuunt atq; determinant luesci:
 tanto enim tenet minus in gallia et finitimis locis, —
 valido, et inhumano in anglo. Cui et gestu manu
 metuentem contagium in vultu in vultu infundere, eo solus
 consilio quo in tantum malum praecavari potest, dum angli-
 gnarum et in finitima galli, vicinia exprobrant, qd pauli
 credulis et propterea tractare praesens reformidaverunt, prae-
 abili et certo, dultius a toto periculo servandi: nea remedia
 vana momenta, atq; natio et pertinacis praconcepta
 feret opinioni; certum tamen ex historia monumentis, non
 invicendi variola invaluisse apud Circanias feminas de
 quibus, qd etiam aut Circanias post partum non praesens
 Orachii à lues variola inoculaverunt, inmittendo tunc notitia
 levioris peris à mea nuntiata à pustulis variolarum
 viderant à dolando humore. Calore defusa et aucta
 rapidius in Cruoris maphantia infundit, et solutum
 variolarum tumultum excitat, qd quod promptius fiet et
 sine periculo comprimetur: hoc tamen stupenda consuetudine
 inducere materiam avari, simulq; peculiaris ois pedita
 regum, utiliter: Circanias tamen mulieres, in a plagam

Eas inelamentis aut vestigalium mole oppressas, eximia
 et eleganti spee puellas in aulam tulerunt, et per
 principum militum, quasq. in fluxu et refluxu
 amatorum, lenocinorum, seivis inuitamentis et volupt
 uosis auentis Liberalius usq. ad florem pubertatis prius
 educarunt, ut Corda jam obtorta varietate laxata,
 facilius vincā, atq. promptius Deperire possent. —
 pelliciarum nurseris et arboribus, ad satietatem usq. jam
 dudum satigerant, et res contra ipsas et vota interdum
 procedebat, amplissimamq. fortunam mura ad vno variolar.
 fata subito' discedebant, et natos jugulando aut detragendo
 choram et auream inestem eripiebat, hinc natum ignis —
 varicolas attentius observandi Desiderium, quo brevi —
 Compositum habere simul aut breviter in vita —
 Contagium illud exhalari, eiq. sensibilitatē inclinari, quod
 facilius q. privacula Cutis diffundi potest, ita ut aesthetica
 jam memorato, insertivem variolarum tentare et exquiri
 in mentem obvenit. res voti et ultra' ipsa successit, —
 faciliusq. ades pervenerat fortuna, ut vicini et potissimum
 turce, eam methodum brevi periclitati fuerint, et deinde
 regni georgii primi Curis nobilissima matrona vxo thei,
 cuius pater tunc temporis Constantinopoli legatione abiret,
 in angliam dimissus est &c.

Variolarum prodromus antecedentia,
 concomitantia, subsequencia, et gravis
 morbi historia.

Quidquid in Contagium asperserint omnes, quod simplex
 in variolis status observandus est, prius Conspicitur pustulae
 seu Contagii ebullitionem, 2.^a pustulae rubea longitudo elevata
 et incrementum comprehendit, 3.^a eorundem suppuratorem,
 4.^a tandem exsiccationem, cum mibi deservientum et finem
 Complectitur, a cum diversa periodo, variis signis et dissimili
 Symptomatum agmine praedictis, peculiaribus, totiusq. diffusa
 naturam sequentis, in 1.^a periodo levior neq. Continua in
 Infantibus doleretur anxietas, mox cum rigore quidam Et
 exacerbata redit, laqueat Dolores, Roror et calor levementis
 accipiunt, splendent et lacrimosi et oculi, calor et
 pulsus praecedunt, urgent nausea et vomitus, stupor,
 somnolentia, obscurum delirium Convulsiones, aut motus
 Convulsivi in prope quoque sunt, tumis adiungit, Difficultas
 trahitur spiritus, Febrisq. cum immensi et numerosa cohorte
 gravium invadit, tum illud stadium ad 2. 3. 4. diebus vulgi
 extendit, quippe in Compluribus Infantibus, et frequentius in
 adultis, Contagii incubationem 7. 8. aut 10. dies potissimum
 anno proximo elapso observaverim, ita ut variolae unum
 gladum nequaquam suspicantes, dissimili correptos mibi, ut
 febre Continua et maligna est, omel opinati fuimus. —

Hinc se statim, Tum ad notatis punctis nasvis, rubris, postea
 mortis pulvis, faciem, mox manus Orachia dorsum thoracis
 et pte. infernas occupantibus, ubi germinantibus, simpli
 emata mitescunt, pustulae valde rubescentes augentur, et hinc
 quoad magnitudinem et numerum; cutis magis tenditur
 inflammata, et pruriginem determinat, saltem si variola
 de 2.^a specie benigniorum extiterint, verum si confluentiam

spasmi relaxant, intendit tibi fœcia, suffocati in peripheria
 quoniam Circulus liquidus et Contracti ad interiora depellunt, hinc
 anxietas, maj. et intolerabilis et strangulat aures, dolus, diarrœa
 mollior, disenteria, mictus Cruentus, Hemorrhœia, dysenteria et —
 Coëctio galgelvarum, tumor abdominis, Dolor, manuum et pedum,
 et si Complicanti Cum fœcia maligna, exantemata livida —
 sensim a pustuli efflorescunt, variola à nimis protensa in
 unum confluent fœdo arte præstaculo, hinc temp. eventum
 intuenti.

Post toleratum Decursum Quarta Status 3^{us} suppurationis,
 quoniam Semel incepta, acrius, atq. determinat maj. elevatum,
 pustulari: albidum, flavedinem, Conversionem apostomata
 parva, fastigiata, albicantia in apice, Circulo Rubro in Dorsi
 Circulo, 4^{to} aut 5. diebus duratura qd. elapsis, tandem rumpunt,
 et exorant mœam purulentam acriorem, genus nervorum
 et membranaceum stimulantem, novæ Stagesis exsurgente
 et ita ad exteriora depuguli, in venas absorpta, atq. inde
 mœa fluitat: Commixta, vires et fœces producit, ut alvia,
 vomitus, disenteria, hepatidiam, apostomata, atroci
 abscessus, juncturarum tumores, Libera ptyxis, et Consurg
 fœces, et si Locus effluxit, plerumque Continuum,
 Patorem, anxietatem, ardorem Cutis solim ex citat.

Tandem hoc Stadium erigit pustulamm exsiccat, et
 magis adhuc flavescunt, nigrescunt, et p. diversas Colores
 nucleulas transcut, anteqm abeunt in squamulas, qd.
 agrosus Lutus in stercoribus, de id uis sine ulla mollior,
 et pruriginoso leni, exorta Cum summo agi levamine, et
 Cum Cutis reperforariis rubore et ténacitate.

Nulli den

Nulli deim praefixi Constituti sunt intervalli limites ad
 Radia varolarum & praecipitum eorum & Cardini percurrentia mo-
 tyora pro varietate temperamentis, Constitutionis epidemicae,
 regionis, temperatis, Celi differentiae, Complicatae cum febris,
 putridis et malignis, pro genere loci et iuxta communione
 observata, Naturae scilicet, varolarum benignae spatia 6. v. 8. & 10.
 diurnum supponit, B. v. aut 4. spatia exsiccat, et solliciti —
 terminari, at id gravius et malignius supponit tardius
 erumpit et extendit ad 18. et interdum 20. diem, tamq;
 altiores cicatrices relinquere solent, ut pro Respiratorum interstitiis
 agrotantium Cutis, et faciei, oculi solito tempore restituantur.

Definitio et Differentia Variolarum

Variola definitur tumor exigui, phlegmonosi,
 in ambitu rubri, dolentes, pruriginosi, qui praecipitum pro
 faciei, thorace vulgi apparent, atq; paulatim subeunt
 donec ad suppurationem pervenerint, quorum varia notanda
 sunt discrimina, etenim dividuntur in regulares et anormales
 vernales et autumnales, discretas et cohaerentes, et —
 confluentes, depressas et fastigiatas, phlegmonosas, —
 erysipelatosas, albescentes, lymphaticas, aquosas, rubicundas,
 & eas humathrigemas differentias, & variolarum agnitioni,
 praesagiorum eventibus, et iudicanda therapiae, faciem omnem
 praesentant, adeq; discrimine sunt praetulas ab invicem
 discriminatas et separatas, cohaerentes v. a. contiguas, nullas,
 distinctas, praeioli hnt, dum confluentes nunc eriguntur
 ritu, nunc sub molliorum forma erumpunt, —

unum quempia tumorem efformare vident, atq, suppurant,
magis ad invicem implicata, se hnt, instar vesiculae totum
vultus aut res ipsam sporis contingenti. tandem pustula
intendit, flexa, mox pauciores efflorescunt, si numerus viri,
minime, si pauciores, magis satigiata depicendunt.

Cause

Non unico fonti tribuenda e causa mali hujusce
Contagion, & duplex inculcanda, seminum nempe Connatio
nobis quo semel ja vita deguamur & ignis, et actio communis
Eae, & eundem regionis incolae simul afficiunt, prior
Completa ex variolis eruptis ja pima materno, & statim
post exclusionem, posterior de' evinctis ex modo quo
ingruita hactenq, genuerat, et Divagata e regione ja regione
atq, deis repullulat.posito aem seminis nobis Connato,
opitum illud manet et ja matris fluidor. ut loquimur ja
Contagio exphilitis vroguloso observato, Dorei Conuam
Eauna h' amamur, his juri factum h' erubescit et
velatas turbas movent, ead ille redemptis ad aera
alimenta et tpestatu, a novis, ex taceis, misimatis, quaten
inficiendo, aut illum intestivo Calore et exardescencia
alterando, moleculas Contagii variolosi pta, & longius
etiam subdolari nobis minime Conuam fuit. verum
ta ex effecta analogia et similitudine variolamum cum aliis
motis Contagium illud stimuli inflammatorii vias geras
promutamus, i? densantis et coagulantis liquidam
Deis

cilia velliant, velutaten Cruori in ea vascula
 intendenti, et univocali quasi deviam globulorum
 purpureorum, in Lymphatica vasa producentis. si etiam
 attendamus ad ea quae antecedunt et subsequentes varicolas,
 quae comprehendimus impeditam in initis circulationem, mox
 ferventem et precipitam, tandem solutionem vasorum. Cutane
 orum, effluxum ptes rubet lymphaticis quibus, verbo
 suppurationem, eaq, hinc pendencia, ut ex simplicitatem
 explicite patebit. Contagium autem varicolarum in altum
 reduit ex aere et alimentis, quatenus fluidum —
 immixtum agens in nervos, tracheam arteriam, oesophagum,
 bronchia, pulmones, cruori circulanti permiscetur, atq,
 crassioribus impregnatum moleculis copitum dicescit —
 tenuius, dividit comminuit, separat et in orbem
 circulatorium ita impellit, ut massa fluidorum probe —
 extenuetur, et viliorem coagulant, verum etiam in
 finibus arteriarum et Lymphaticis subsistat, quo Regnum
 momenti generalem Phlegmonem seu inflammationem —
 determinat, a tunc in laterioribus, et adhuc in interioribus
 equaliter prodit atq, diffundit: et diuini prorsus modo
 alimenta totiusmodi qualitatis quibus subta, eundem
 effectum producent, in quibus Congestio, pravor? sucos?
 in illis vis et chilo acriori et Congruato, exaltationem
 tandem concipit magis et brevi Consummationem inquit —
 Cum seminis, et otiosas extrinat ipsius moleculas: —

hinc alimenta, aëre autum rale, i vernum tēp, tēp
 Communiores caas Contagium moxentes et agitantos it
 Consideranda. —

Sympthoata

1^o invadit horrigitaci, sensus, & tumultuosior cruor
 motu ostendit, quo tunc dān distensionis vis —
 membranosis filamentis in frēt, tum ipsius aequali —
 distributis p Capillamenta invertit, atq, retardat: hinc
 aem accipiunt tūa tūa, incallescunt et Calor, ex eo
 d'iritata Et in fāstula vasa, quasi in mutui auxilii
 signum. Fortius Evadunt, micare incipiunt, quorum
 recto Liquor? fluxum accelerabit, & prorsus magis
 exagitata, promptius, Cum p orbem Circulacōis acta,
 vortuosum motum, illum quem nominare solent a cæto
 ad peripheriam faucis, Corripient, p tēp, Communuabunt.

2^o tumida Et agitate quævis vāda, p vasa p tēp —
 rapide p tēp requæunt quin insolitam maj dilatacōem
 urquant, quasi solidiora nimis Superaverint, in ipsis —
 Stagnabunt et Congerent, unde varia p tēp gravitas
 Lassitudo, stupor præsertim in lapita, Cum ibi et debilitatem
 mollioris infantum visceris major p tēp cruoris momentum.
 p si ad Cæto fines pervenerint, oivanti illico delirium, —
 Convulsioes, motus Convulsivi, pro diverso gradu Congestiois
 quævis derivandi.

3^o Quæ et ampliat, caluora Stagnante Lanabunt —
 Latente, pari p tēp dissolent et Compimenti p tēp ta —
 nervosa vacula, sine violentus habet Simphe revesa refluxus,

versus Cerebrum, et contra ipsos cerebros item in Capite, & totum
de debilitatem multiplicem, variorum vasculorum meandros, quibus
liquida? momento levius obstitit, varum etiam huiusmodi
humoris tractu palidus pater, qui ex aliis, repaguli p[er]tinacem
accidentem, surculosq[ue], exinde enatos uberiori determinatur, in
diversis crephali tractibus, modo in perispermio, modo in
meningibus haeret et accumulatur, unde exterior & interior dolor
percontantur solent.

1^o tuncis aëre superioribus, senel Cerebro turgidis, p[er]forata
incedit in proximis longitudo, qui distendit venula —
exteriora nervi p[er] internam et externam oculi p[er]tenet. —
disseminati, prementiq[ue], folliculi membranacei glandula
innominata, unde modo rubri, & lammei, p[er]sistenti, oculi,
modo p[er]fecti et alternati Lacrimarum rivus. —

2^o si fluida a p[er]forata in p[er]forata aut Pericardio, nimis
longius trahant motum in tubis p[er]monitiis, solutum
areolabit variolarum spatium, fortiusq[ue], detrahent p[er]forata
nervos, hinc respiratio laboratiorq[ue], p[er]forata variolae
sepius observantur. —

6^o pari et eadem ratione stagnante Cerebro in Cerebello, p[er]forata,
Comprimuntur vasa secretoria excretoria, & p[er]forata —
stimulantur huiusmodi viscida p[er]forata nervos, hinc, modo laborant
nausea, vomitus, Cardialgia, ubi fastidium, atq[ue], ex Laboris
et molestia ventriculi pendente audentia. —

7^o fluida contagio varioloso inquinata supponi nequeunt, —
quibus deputatam, et p[er]foratum huiusmodi humorem —
medicamentis, et molestia nata, & cum facilius p[er]forata
Cutis abluatur, vitiosus est p[er] vasa Cutanea humoris Contax
inibi repulsi; adeo q[uod] quicquid in Cellulosa peripharia Internae
Contracta, ob meandros et meandros vasculorum resistit, facilius

subistat, ubiq; tumore determinat qui ab humore ibi de novo
conveniente, quasi oculi nictu subascendit. -

4^o vasculis aem Cutanei, simil' proferitis, atq; tumultuante
Onore turgidis, impetum ei et artis liquidi ductus sustine-
re possunt, unde solutio tubulorum et effusio liquida a
Coniungito Cum Rubore pustularum, prosertim in amictu
Cum ibi vasa libera, ab humore effuso magis plasmantur.

5^o liquida tunc extra vasa, obem duntius remanere o-
portet, quin nra alteret et Corrupta, atq; Cum fibrillis
elevatis et emacris commista, vixit; vasculis viciis
omniat. et Calore tunc Conguata mutanti, et abeant in
liquidum viscidum, tenax, glutinosum, albumi: hinc primum
Suppuratio apparat, et aciori pruritu, imo et albedine -
pustularum, Cum suppuratio per, mag. p. hinc altitatem -
exigat, et Cutis pustularum eodem ac humore contentis calore
defundenda est.

6^o per se vel efformatur et magis, indies acrimoniam motu
Contractam, vixit et effluxum tentat, et Continua rotunda adun-
versis exteriora parabit, unde universum q. quod habitum
est, pruritu ex infinitis calens, p. quo, nam et lachrimas
defundit quasi Colore amito, tenaciori, inficenti.

7^o Interea pruritu, Pustulis Contracta divitibus, nullis,
Suppurato Commatu habuente, solas, arida suppurat, et
Cutis, Cuius fibrula exsiccata, fluidiq; repugnantibus distulata,
dandus non ignavulor? a in contextu Cutanei nictu et
lucisvata.

8^o Substrata tubulor? Cutaneor? pruritu, interm-
Cutem in diversa constituentium, colorem rubicundum refert,
atq; vividiori gaudebit lenem, ob solutis inon testum fibrillar?

propter minantium, et localium, appellente Quovis latuanti,
atq, etiam impossibilibus et Contactu aeris externi induata fuerunt.

15^o nec ita solent proinde ea juxta variolae, Designis, verum-
diversa et metuenda symptomatica succedunt maligni et pernici-
mosi: atoniam pustulae variolae et prius statim ab eruptione jamactae
et horum fuligatae representantur, ex toto depravatae, et je-
natae variolae? malignae ob impeditam degenerationem, inhibita,
apprehensa et horum humoris, vascula cutanea et nullatenus
infesta Quae turgent.

14^o nec ita humor ad interiora hepatis et coelestis ad
viscera rursus horum molestat et obiect, unde delirium, motus
convulsivi, Tremor et impossibilibus respiratio, singultus, diarrhoea
maxima visum proinde, aliisq, strage. Cogitatio ad affluere et
indomito Contagio massae fluidae in torrente, et Cursum
omnino procedente, prout priorum et parvis ad viscera
etiam derivata et effundat.

13^o inter dum licet ad interiora et repellente propterea
nec ita Contagio variolae, et numero etiam putantur. Abierunt?
atoniam ut juxta Transennam asperamur, equalis et ubiq, depravata
et pustularum Circumfluentium juxta putantur. Actura: legum
accidit et tumidit et inde Graviores Cursums fluidae ubi putantur
et juxta Cutanea ita substant, ut exinde vitalium fluidis
Cursum, impetum, derivationem, decursum, in collostrata etiam
in antoria et exantoria vascula supplicant, uno verbo
Circumfluentium plene suffocant, unde varia exanthemata, Elictae,
papulae nigricantes, Gangrenosi gangrenosi, Eudamina, verbo
totali et una Cutis rois, Effluata, exhaeret, et rapidius ad
interiora sequunt et Communicant.

16^o verum si juxta degenerationem obstant, non videri ex cursum

et generalis Eructatione superet, nullatenus in nervis
 deperirem in dolorem mutare poterit, ut pote ab in se facta
 fluida massa procedentis, quod aeris, communem ubi sit,
 et per se diffusus, et molles, et in debiles contritus relinquet
 hinc suppuratio variis in se visibilibus statibus, ut in oculis, quibus
 naris, et faciem lumine detur robustus, viribus, et sensibilitatem
 auferent, aut auram, aut morditatem determinabunt, et
 in interanea confluent, molem, tunc, et tunc per
 centum, et hysim, et hontasios insuperabile, febrem latens,
 marasmus, et ineluctabilem consumptionem accersent. —

17^o tandem rite succedentibus variolarum. Statim, et absolute
 deperit, nova quasi, et melior accedit constitutio, et ita —
 corroborante et firmante perfante, ut excurso pullulanti in
 ipsi jugo, maculae, dein pulsatatem et virilitatem
 praeberint, tunc contra motu perficimus, ventente, dilutius
 adhuc et ad deuliter vasis magis, et hysim, et hontasios, —
 Epistole, et sic mutatae superficiei molem, et strictiorem
 moleculas equis coherens, in priori casu determinata.
 Irregulari non itum integrantem divisionem, et nequiter
 ingrossa Labii, item, et in 2^o Casu nondum instructa fuit.

Diagnosis.

Stadia variolarum peculiaribus signis, et jam notariis
 et inveniendis, et 1^o ad ingruentia attendendum praesentem
 et tunc in eum impendentem pullulantem, et
 extensibilem, aut ipsius Complicationem, scilicet medicum
 vaticinari non, et ita, et ita expetitionem, copiosius voluente.
 eruptum, ac in variolos suspicantem in vomitu, Capiti, dolore,

honorat calore se mutuo exigentibus, tepiditate, et subulta
membrorum, oculorum, et nasae, aut praetibus et lacrymarum, huminitas,
haec etiam duo posteriora symptomata facit eruptione
relaxantia, potest alia adiungenda est, ut Acta Capitis praesentis
Dulci qui varioli nequaquam defunctus est, et ille tunc quodam grassanti;
et tamen minus praeterea vadunt Cutis rubore, et puncturis: domum
Activa adhuc humoribus, et aquis in ambitu rursus, undique, efflores
antibus qui successiva' arisunt, et in pustulas notabiles abeunt.

Quod si variolae, suppuratae nempe, praedictae, praesentem
Calorem, Febrem et anxietatem, ab ordine pustularum, deinde
remissione symptomatum, et effluxione, revulsa.
ultimum vero praesentem contrarium albidum et nigricantem.
exsiccatione, fragmentis residuis, et nova Cutis, efflorescentia, satis
eximie: an ubi depressa est praedicta, discreta aut confluentes
fuerint variolae, ex sola inspectione pustularum patet, dum vero
recurrunt aut complerant cum Febre maligna, Scitilium
detegit, exanthematum a ignis praesentem totum decursum concomitant.

Tandem inveniunt variolae a millis, sicut in eruptione, utique,
multis aequiva fuerint signa, ex humoribus sensim crescentibus, et
elevatis in variolis, donec ad suppuracionem pervenerint, at vero in
millis. Pustulis nris, pustulae sunt planae, contiguas magis super
civias, et vividius rubore, per se, aut junctae communiter variola
quasi gradatim et successiva' disseminantibus, et quovis habitu, dum
millis promptius disseminantibus, rapidiusque peripheriam Litterarum
consequuntur, variolae, etiam facile dignoscentur a variolis lymphaticis, et
galliae. De varole volante peculiaribus signis, hanc ultimam
praesentem Comitantibus et praesentem respondit.

Prognosis

plurimae' includit variolarum eventus, de iis Eruptione aut
 docum. Dei Cui statuendum; quippe' motu subitanei, ad co'
 obiecta mutatio, ut plures quos bene sanando, fausto —
 variolar' eruptione iudicares, tunc Eruptione — tunc in progressu
 actio, simulq. ad interanea mea: pusulenta, aut humoris —
 variolari reflexu, de repente suffocante et intereant, dum —
 alii forme degenerati, et praecipiti dammati finem, feliciter —
 emergunt et convalescunt, hinc affectu, eo magis refutandum,
 quo' in Eruptione implicati sumus, et in interanea pro se sent
 spem, et rationis, etiam proponit: tunc sine temeritatis —
 ergo si iis pt variolarum — lucens, postea tunc divinita
 tem, et symptomatum — catarrach atq. irritiam. Cuiuslibet em
 variolar'. Ratio atq. accidentium agniti, sua competet prognosi,
 a Licit fortuna quapiam aut involuti Casu mutari possit, interea
 sequentem normam vulgo tenent.

1^o relativa ad eruptionem et eruptionem contagii. Graviores sunt
 symptomata, a deo intereant summoque in Eruptione, qui
 remittunt et intereant. Benigne aut Eruptione eventus mutari
 pot variolar'. Contra vero si variolar' erumpentes, Undelini iniquitati
 symptomatum agnos, ut 1^o motu, Convulsio, gubris —
 intermissio, Lymphemia, vomitus, pariculosis sane statuenda e —
 prognosi: qd si ea, p eruptionem quadamtenus, v maxima pte —
 discutiunt, maxima pte afflat, et plurimum boni tunc intere
 porationem, tunc eruptio nullum avaranea agro proficiat, —
 perimor, et letale, ut plurimum variolar' constituit, accidente
 atq. excretionis tunc, et peribit jam judicatis, eruptio
 perseverantia perimor et omnia, qd in bonum convertitis, dum
 remittunt, et rapier' febri remanet, a Latentem tunc bene,
 atq. bene adhibeturam iudicant, hinc suppositio, interea
 et marasmus

et maxime qd' precurrit agrotans, interdu opus
continet ut vasis exiccatis pustularum tunc, febris gravissima
et deficiat qm' p' toto m'bi decursum ingruat, cum subitanea
abdominis intumescencia, intumore calore, flatidis alui disectioib;
et purulentis, in quo tam, malum sibi tunc insuperabile
iudicandum, atq; p' tota ingentem infantum numerum, quo ex
officio i' fiducia parentum vivimus, paucissimos & variola
improvisae proleus convalescentes, restitutos observari.

2^o rursu ad plura alia attendendum e' q' variolarem
febrim, etiam dum variola subito depressante, infecta cessans
e' a fluctu, atq; prohibita Quoris deglutitoe, Alveorum pulmores, aut
intarsa abdominis Orvari opprimunt, promptiusq; in eis
metastases inflammatoria et gangrenosa declarant. at tunc
illa infecta non modo festigiatis et ruentib' Genentib;
qua etiam n' portio elevanti pustula; eadem remittuntur
singulae, scilicetq; infecti Quoris expletio promovet. —

3^o rursu variolae mutat earundem prognosin et eventum:
Constanti em' deprehendit, observatae disrictae variolae, minui, —
rariore p'vienti, p'volutib' et confluentib'; Acce, p' ultimam
Speci' m'bi, intarsa et externa p'te, ex toto obideante, et d'iffalio;
exteriori deglutitoe; p'voluta simplice, variola brevior iudicanda st, iis
in q'bi exantillata ad, unguita, atq; Altem portendunt exitum
sicut et cum febris, putrida, maligna compliat a.

4^o mutati m'bi pericula rursu t'p'orali, et Constitutioe a'vii,
e' etiam vere & autumnno gravanti, e' itam morient formidio-
em, qm' si Orvire frigidiori ingruant, ob p'volutam rursu, et mori,
hac ultimam anni periodo, fluidor' Coagulationem, atq; vasor' Contractio-
em obstructioem, et et pariter variola adeo Orvigna ex mitiora, et
rursu etiam e' edunt itagem, dum alia maligna et effrat a, —
nullibi parant, et natorem propemum depopularit, qd' vari-
a'vii Constitutioe dependet. —

h^o pande^{re} variat eventus atq; successus variolae exumpontibus,
pro diversa aetate, hinc adulti pler. ja tantib; ja in parvulis
et soluta ob firmiorem Cutis testam, vesiculae etiam intus non
liquida^{re} Perforant, quo rapidius exaradescunt, et ja varia
promptius ruunt et Cumulanti organa: raro aem variola, desinit
leniti aetate, et qui simil. contiguat, et fatis et variolis defungi
sunt. —

Cutis pag. 205.

Caput xvi un

De morbillis

majorem presentis atq; futuri viscerum metum injiciant
morbilli, si eadem foverent utiq; m^o radia et equali decursu:
quippe e^o raro graviora adhuc declarante nimis m^oata, et
volentius machina ja morbilli perturbata, et ota subito t^ontas,
labit^o quoq; residet et Comprimite, adeoq; brevem morbillorum
intervallum, et pari quo invaserant parum orarunt.

morbillor^o prodromus, antecedentia,
subsequentia et generalis m^obi historia.

propinquant^o rem quolibet, etatem indiscriminata
aggradiunt morbilli sicut variola, is demq; fere signi, dementiam
sunt quippe Calor et Roror semutuo exiguus, antecedit
Caput interius dolat, agri et inquieti, ardore per faciem, et
siti premunt. Lacrimas involuntarie profundunt, et nausae
atq; vomitu tentanti. mox laedit calor non habili, nullo quolibet
momento interdicto. laboriosa et difficilis respiratio, junctis delirium,
universumq; op^ous habitum quasi punctura percutiunt, et tota
Cutis calor subit, et veluti inflammata, e qua breviter pululant
et aggradiunt tumores infra notandi: is aem exoptis, symptomata
mitescere incipiunt, nisi complicatio morbum auerit, nunqua
emittunt, et intra h. 5. 6. diurnum spatium terminant. —

Differentia et mobilior definitio.

mobilli definiendi et tumores exigui, erysipelatosi, piansi atq. Contigui, nunquam suppurantes, quorum Eruptionem fere ipsa febris comitatur: ad eam aem conuendunt, statim putrescunt, nec facilius in variolis mori quo diffunduntur et Epithemii habitus, et Complicationem cum aliis affectibus.

1^o intestina prelorentur et sopiti moriantur, et unum aut alterum demum, imo et per alios, idemq. febrilem tunc tam, et signa iam memorata propriis iunguntur.

2^o Epithemii discreti et tumores illi, neq. uniuersam Cutem obducunt, interdum adeo et Contigui, ut unum veluti tumores erysipelatosi offormant, et febris realitudo prae se amulanti.

3^o epidemice grassante et malignis, putridis, septicalibus, aut ta paritis cum febribus malignis, putridis, septicalibus, putrescentis, aut soli aut simpliciter proadunt, unde singulis, Compositis, Brenigis, malignis, dubiis aut periculosis nominantur.

CAUSA

Causa antecedentem et consequentem, pariter et in mobili sicut et in variolis, pronuntiamus, eam deprimere, et moleculam Contagii mobiliori, Lymphaticam Cuius pars nonnunquam rubram aggradiant, imoq. magis, afficiat vasculorum Lymphaticorum, quae quicquid numerus Cuius vase Liquida in Lymphaticis laeue magis labiunt, et superficialis, hanc tumores determinant, ut ex theoria phlegmonis et erysipelatis evincit, eadem etiam remotiores, seu a Contagione in actum reducant, eadem pariter respiciunt alimenta nempe aequali modo sicut in variolis, in maiorem fluidiorum agunt, et sopita laeue laesant.

Symptomata

Duo tunc sibi colligimus, symptota, scilicet exposita in variola ita se vident, a. Denique in morbilli peculiariter ita.

1^o pustulae morbillorum magis superficialia, neque unquam sicut variolarum attolluntur, ob tenuitatem et exilitatem vasculorum lymphaticorum, Lentorem fluidi contenti, minorem expansionem debilemque impulsum atque motum partium lymphaticarum.

2^o verumtamen symptota febrium magis lenient in morbilli, et majores calores, siccatas, ardor et febris reprofunduntur, ex eo quod numerosior lymphaticorum vasculorum prole generalis et immixta magis sit in omnibus variis liquoribus circumstantibus ob compressionem ex congesta lymphaticorum, quibus illatae, quo utrinque humor effusus simul inhibetur et infantum universalem excitat.

3^o denique cum in variola magis notabiliter persistant verum lymphatica, et humores contenti, nulla arte ad suppressandum perducantur, minus vero in morbilli contactu vasculorum quiescent. Contenti morbilli nullam depurationem excitaverint, addi quod ortu et incremento morbillorum promptius transcurrentibus congesta lymphatica atque portio dissipetur, neque ullam disruptionem excuset, ut ad suppressionem absoluta requiratur.

Diagnosis

manet igitur dubium, in morbilli aut variolae eruptione, pariterque symptomata utrumque affectum ut jam innuimus, antea declarant, immo et copiam de declarante vel morbilli vel variolae respiciunt, et tunc longiorum praeiorum morborum, in quibus, aut febris putrida et maligna: tunc vero levior morborum, in quibus instantibus illis signis, et morbilli aliusque generis, et variolae videntur, morbum neminem de pariterque asseruerint. Denique aemulantes morbilli, quatenus adhuc longiori potest tunc

evadunt, quo' mitius gloriose suum Praesit, et deperit
 fluidor? efficacia obicit. — Curat pag. 218

Caput xxvii^{um}

De variolis Lymphaticis,
 Gallicis

La verole volante

229

Sim comel abut atq, dicesit periculum variolar? et mō illor?
 . Speciebus apparatus variolar? Lymphaticas? utiq, maternus —
 amor, aut nutrici sollicitudo, agitur eos in pida Contracti: —
 tum em pntā horum affectuum Lymphomata pntari et
 divertere, ut variolas Lymphaticas insum, recidivem o apparetur,
 quoniam tū pntabamus tumores, subitaneum pntentum i?
 intuitu major periculum dntent propaginaq, videnti.

Variolar? Lymphaticar? prodromus,
 antecedentia concomitantia subsequentia,

Et historia.

Fortiora nunqum pntē meditati et tentati nra ad Eruptioem
 variolar? Lymphaticar? pntitq, extromum hori: nra
 tremulta, stentia ad Eruptioem, ut Calore bonum, et
 amicitate o nullas retinuerunt, quin agri pfecto decunare.
 Coganti, ad iq, abq, pntis illos signa declaranti, pntidum vō
 debili exaridescanti, o pax et origina pntis appetiti,
 et pntis in capiti, dolor illa antedecant, nntula t magna
 dntata, et dnti variis suppuratione effundunt. cenni nnti.
 anno 1794. suppuratione Lymphar? nra civitate pntari,
 pntis pntis dnti dnti die exaridescanti, et effundunt
 ebo, pnti, debili nra dnti, nigricanti, a nullis
 relinquit vestigia. —

Definitio et Differentia

Variola pntis dnti dnti tumores dnti, notatib,

albicantes, et vasa lymphatici, quasi hydat idem formam
referentes, qui ad tubercula pertingunt, istud vix perveniunt,
et qd aut qd die exsiccat, leviori momenti patienti
diffidentia, etiam in simplicia et Composita, benigna, aut
quasdamtenis gravior, nulli v. mitiori, dignatur impositis, -
vividanti, demum lapsus antecedit varicolas legitime, -
enitescere pariterumpunt, et aliqdo oris in decursu
recurrent. —

Causa

Causa similis, et idem Contagium in quibus ac in legitime
varicolas, v. Danguimus, eo te discernire ut in priori cau-
minis, Clavis, et levius unitis, et molibus, quavisq, lae-
quat in meram fluidor, quorum lymphaticam hinc ptem attingit.
hinc imposita divina longevitat. —

Simptomata

1^o facile erumpunt pustula varicolas? lymphaticas? ob
debilitatem vasculor? lymphaticos. a v. leviori appu-
lymphae contagio densata, dilatanti et intumescent. —
2^o nulla fore turba brevitatis in eruptione, et eo qd v. solim
toto motu provocati lymphaticus humor, ad coq, ad exsiccantiam
fibrilam inertiari nequeat, verum etiam lymphatici rari subura
v. haeant manifestum, debilius emegunt ut fluidum contentum
ad motum illum calorem et exsiccationem qualis ad Calorem et ardorem
divisato, determinare possit.

3^o positis, semel lentor fluidi Circulanti, et debilitate vasculor?
illud convellatium, v. solim v. cedent p. d. v. inflammationis,
verum etiam humor jam inflammatus cito evanescent, cura
p. d. v. Continuari possit a suggestis Continuo? et in maj, qm
partis q. tate liquidi moleculis, v. jam semel offensa, in facies -
lymphaticis, calore et omillae optium vicinas? aeris contactu v.
innato ex infuso a Coagulo, v. offitiliis urgente in Collectas ramos,

Saluginosus fit sicut, si duc quo in fano nutriti, —
 Calidum et salum sit, id facile maciem producit, cum
 maxima salina glutu contrahit, quibus suppeditati pariter si
 puer ab lactate, cibi salis, pueris, et exsiccantibus utati, ut si
 vinum nimis aporet, macie continebit. Sit quoque, hic affectus,
 pueri stomachi vitium, dum cibos? Coctis, nulla fane, in eo
 fit, quoniam cum quibus pueror? continuo chylis ad ventu agit, ut
 quibus eorum accrescere possit, ducit digestione cibos, minima fugere
 humoris glutu, quibus suppeditati, quo nulle accretio, imo nec
 reparatio sufficiens fit. Consumit quoque brachium, quibus, et
 lympham aridam acquirit, nec puer nutriti nec reparare potest.

Hic adhuc amariabit post inter, gravis vixit, brachium
 quibus alimentis, cumque, Compagone plurimum solventes, sic
 variola, montis, febres, diuersas post se maciem, capere relinquunt,
 ad his aem, capere macie producit, accipit tamen et ad alios, tamen, sicut
 suppuratio, exulceratio, et viscerum inueterata obstructio. —

Quod si macie constitutio, quibus saluginosus supponit,
 et tunc eam producent humores, saluginosus affectus, quibus igit
 pueror? macie laborantibus id nutritio, id ducit, et vixit, nec
 reparitionem partium reparare potest, hinc macies et emaciatio
 totius corporis: et cum aliusque brachium qualiter amiserit,
 vixit vix infirmare et lumentare potest, unde varos? ariditas, et
 exsiccatio sicut. —

Quoniam quoniam magis fit deperditio quam reparatio, minima
 contra labitis humorum mole, minor adhuc copia pinguedinis
 adit, igit tota pueri corporum consumptio, et totum quibus
 omnis, tamen et ante contrahere videtur, hinc undique, omnia
 eminebunt, et pariter ubique, nulli erit.

Quoniam supposita humor? constitutio saluginosa, —
 quod est quibus ducit, saluginosus expositus. igit vixit
 et equine sacris salu erit, et ad pueritiam aptissima, unde

excoxiabit, aliaq; pta vicina nisi seorsum removeatur. ca-
etiam a ex ano fluent, & it' hujus assermonia immunita,
Cum p'p'itate a manâ humor' derivanti, debiti angustumq;
vicinas excoxiat, si excoxiat aliquid removersit, ad raeo
interna vis lavita deficiatit aphtis, puer quoq; tunc vicular-
vigil, anxius erit, tandem febris hanc, quâs constitutit
squit, ut facile' oculis et attendant' patet; tandemq; squinis
Orabamo Consumpto, mala rep'it' excoxiat, ingravescunt. —

Diagnosis

p'p' et sola pueri imrectioe macis, Cognoscit, ejusq; Caa
difficilis & o, quare hac nutrice explorandum, & ab ipsis —
minutis hantib' scire an m'io jam fuerit Conflutata, an
penuriam Liborum passus fuerit, an duc Laboraverit —
inapp'etentia, & tandem an Coctioe Lasa Corrigiati, & —
alvo Loniore, et f'ore Excoxiat, et ventris intumescantia
delectabit.

Prognosis

macis saem, et a Caa externa oriunda, raro' periculosa
e, facile tollit, inveterata v'o' gravis e et periculosa, et
difficili sanata, p'p' estia si a Caa interna et abditâ —
producat; macis, o m'ium acutum, & squinis, comp'ag am-
solventem squitis, maxime periculosa, indicat; et si siatâ —
Convenienti instituta, et remediis o rectis adhibitis, & si —
vigeat appetitus, et vira, resoullent, tunc macis, periculosa o e.

Cura
pag. 22.

Caput XXIX

De tumoribus thumoris

Struma, seu serophilla sic dicunt, & frequenter serophilla
o p'it' p'collo sunt; haec den p'p' ii, alop'io p'p'at.

Ita autem itumores seu scrophulæ terribiles, Colli glandulas -
 præcipue affluunt, axillares, inguinales aliæq. circa articulos
 osium collocatas, sic in cubito manus digitis, genu, radiisq. -
 frequentius apparent: hæc in ubiq. sunt in sterno, brachiis, -
 cruribus, his tumores pæpe minores, cuti concolorati, leviter indur-
 escunt, et rhinæ nam æmulant, paulatim succrescendo -
 induritiem acquirunt, leviter et profundus fit dolor, præsertim
 dum dantur: et comprimentis, his tumores rubore perfusi, et -
 suppurati succedunt. Quod, dolor et mollities ubiq. ruboresalescant,
 tumores juxta suppurat, carumq. cito subiectis affert, præcipue
 signa suppurati ostia apparent, tum ore suppurato mæa
 purulenta, viscida, albicans, pallida aut flava sive fetore -
 exaruit, et ideo hi tumores ad abscessum, aut statim in
 maliciem et immensam obcontentam mæam a nonnullis -
 referuntur.

Præterea quod, tumores, aliter aliquando in divario et ibi:
 dum ad suppuratum adducunt, æque mare febre lenta vivuntq.
 prostrata corrumpit, facit pallore defæcti, generante
 suppurati, marasmus accedit.

Quod dum glandularum textura molli et laxa admodum, æq.
 vasis lymphaticis, aliisq. receptioni humorum inservientibus, nulla
 moris reflexis et contrahitis constant, ex eo quoque oportet ut
 motus humorum, glandulas subeuntium, facile in eis sistat,
 nisi humores maximam fluiditatem obtineant: igitur cæ-
 terum hinc fit visciditas et accumulation lymphæ et præsertim
 glandularum substantiam volute, æq. paulatim in his hæc et
 accumulata, tumorem præter induritiem, qui in unguis
 læcipiens, præsertim, dolor subit, suppurat quoniam non
 lymphæ ad glandulam obstruuntur continuo accedit, augeat
 continuo ex hæc, nonnulla, dilatati præter tumorem
 acquirit, quod si ut magis, variis quædam complexis fiat, magis
 etiam humorum motus sistat, unde variorum disruptio, quæ -

Sunt humores effundunt, et suppuratio incipit. Deinde -
 gusti humorum visciditatem fit ut suppuratio absq. motu
 tumultuoso et principii fiat, et ideo cum motu suppuratio
 efficiens lenis et pacatus sit, vis sui indicia suppuratio patet,
 quoniam ta humor effusus aciditatis et acrimonie praesens e;
 per jam genitum et supra ora effusum, ea rodit et exulcerat,
 et hinc quod plurimum in vicinia ubi facit, si glandula circa
 Carnes, et ab oculis remota fuerit: si minus sit lingua vitium,
 una aut altera trium glandula afflicta, si major glans simul
 in duobus partibus tumebunt ac oculi, alioquin raris vitiosa
 Lympha, hinc rachitis cum stromi complicata, et ut
 plurimum ora pinguia, ut sterna, mai stromis tumant,
 et exulcerant: hinc facili patet quo Cur tumore, stromis nam,
 pectus, afficiant, stroma cum ha. ita pluribus oculis hinc il-
 articulatis constant, ibiq. ut maxime glandular. numerum,
 humorem viscidum acutiorum motu inaccessitum, eructan-
 tium, ex eo quoq. ratio patet. Cur stroma his potius tam super
 afficiant, nec glandulae inter latentibus tetrahedus parcat,
 quoniam cum eadem e omni glandular. textura, idemq.
 Lympha ad omnes appellente vitium, ideo glandulae interna
 sunt et externa stromosa pars pat, ouq. Hepas et Lien, tumida,
 et obstructa, hypochondria efficiunt tumescit, ut et pulmo,
 et mesenterium. —

Deinde cum in mesenterio glandula praecipua occurrant et
 mai stromis replata et tumida, venas et intestinis videtur
 comprimant et squini motus in ipsis rependant, quo Calor
 auget, aeris in ipsis contenti elasticitas et Dilatao crescit,
 unde guttatione dilatata, totumq. abdomini in tumescit.

At sicut glandula Stroma, mai seropuloris obita
 suppurant, ita et facili in interna, cum illi sit calor
 humor presentia, motu magis contentus: hinc a

glandulis, ruppatis aliqua pars etata, a variis squamis —
et Linzhatii exilis membris. igitur humorum massa pur-
purinata, statim prout dicitur contrahit, quia Julia ipsius
magis exaltata, ultra vires aeris aeris lympham communiatur,
unde Febri lenta cum macore, videtur prostrata et facies
pallida fit, et ducem spiritum, moramur adiungit, cum per
per genitum suppurationem etiam vicinam producat.

Constitutionem quidem sex humorum producit lac quo infante
alitur, ubi colligitur, quia mala vicia actus rationis
vehementioris ac pathemata, et lac magnopere alteratur, quoniam
aer rhomachus lactantia debili est, nec lactis viciu corrigat,
itaque qui a lacte jam viciu conficitur, ejusdem jodolgi et ac
participi, unde universa humor? massa viciu etata et subdina
Contrahit quo fit ut ubi dicitur quidem viciu, tamopi hoc
laudabili humorum magis viciu inficitur. —

Quoniam vero quid lactantia viciu est multum, eorumque,
viciu rati humida, hinc quid lactantia viciu viciu etata
et aeris aeris contrahit, lacque, sex humorum in ipsi ne minima
dicitur in jodolgi macore pl, hinc puri quid in lacte apurto,
tametsi viciu stummarum inquirat, ex ai pte viciu vident, viciu
aeris aeris puri, mutata viciu rati et etate, quid minor aquam
evadit, lacque et fit ante humor? massa impregnata, mas.
adiungit motum, et poro sulphurum replent, fluiditatem
Lympham immittunt, hinc tumorem, glandulas? nascunt. viciu
Evadit viciu mole, magis tollit humorum fluiditatem, unde
viciu et magis viciu Lympham evadit. tumore puri adhuc aeris,
et si ne viciu impregnata, quoniam cum viciu a seminali humorum
Constitutionem mutet, quid motum immittunt fluiditatem immittunt,
et eo fit ut lac in mamma post conceptionem secretum, nimis
viciu et aeris aeris, et, viciu ad stummarum gerendum viciu.
hinc motum, etiam viciu dicitur puri lacte plurimum viciu
mutabit, lac viciu Lactis divinitas, puri (quid aeris inquinat, cum
lac jodolgi viciu id habeat, quid in humorum laudabile, converti dicit.

Humores humi & contagiosa communicant, et a parentibus in filios transfunduntur, factis enim parentibus cum infantibus commixtis generit hoc factum, quod humores parentum in populum factis transfusi sunt, idem, visum inferunt, ad ipsi a massa humorum, aut ex venarum ad huc huc, parentum aut nutrices, male — nutrita, aut adhuc copita, tumores nati. Communicant, siq. ob parentum necata, misere affligunt, a diu venarum, seraphulosa affligit, maxime, ut in canum effectus videntur. —

Diagnosis

tumores, strumosi & colici, a sede dignosci possunt. Cervicelli glandulae, et in vena articularum collocatae purpure et inflanti dant, absq. hinc tumores & procreant in se modo affligunt: struma tumorem effluunt in ipso cutis concorsum et induratum, scilicet vena — amulatum, paulatim et dente succum tumore, tunc, soluta, & gravi, in vni, vomitu, aut duo tactu: rubor et calor ad inquantu, diu in hoc statu permansit, videri dote sint indicia suppurationis, et ut de vena tumore molle et fluctuante in eo propterea datur. hinc tumores frigidi, strume vulgo dunt, et ab humore frigido, et lacte ad suppurationem veniunt, hinc dunt. tumores suppurati, operto macula virida, paulatim et fimo ibi, factis extrahit, videri, inflatum ad diffusi. leniter, ut tumore & plura, annos impigere valeat pithi remedia: a vitio equini Contululo Cauterium fieri & pithi, Consumpto sermo equini Balgamo, dote soluta Colicere & pithi, propter si — tumores suppurati, et ad acci. Consumit, & Caric. per Caricem Continuo suggerit a quo avimonia equini Porati. de hereditaria ut, tumore, ex relatu potentia modius, assequit, hinc etiam si plures pithi opud, — similibus laborant his strumis. —


Prognosis

Struma diu hinc, et sola aetate mutata, sanata, non remanet et plerumque purgant, nisi humorem massa leu seraphulosa — vitiis inquinata unum aut alterum tumorem effluat, tunc antea, purgant, tumore, suppurat, hinc a remedia & aliquotia necesse, vena si — plura, affligant aetate diversa, propter hanc pithi, manu, nil ultra molis oportet, & vitio equini Contululo Cauterium Congere remedia Conveniente;

et enim resolutio et logia de o nulli humoribus, itumoris opponunt,
 suppurationem acalescant, visusq; ibi latens signum huius
 tantis ex allant, aeris efficiunt, tamet si tumor ad suppurationem
 pervenerit, omniaq; fuerint varia defuncta, de curae o deponand;
 modo si febris o arsit, humorumq; appetitus, visusq; satis —
 content; mutare aetatis inter curato, ut lego' lepro' fuit
 observatum, verum si suppuras copiosa sit, et plures
 tumores in diversis partibus simul suppuscent, omniumq; —
 Curis maxima sit, cum impotia ad motum, omnium
 affectionum interuenientia, febris lenta accesserit Cur
 insigni maxime, maximam virum prostrato, maximam
 mortem timendi loco. Tamen de salute agi actum e;
 si humor sero-phulosus, inter genitris suppuscet, ad viam
 nulla potest, si enim per foras produci possit. curae pag. 224

hujusce Tractatus

Finis.





Curaciones

morum puerorum

et i. de

incommodis graviditatis.

cap. i. pag. 8.

— sicut multi in graviditate in pueris recente superant
 sint obici, et tunc ea indiscriminata tentanda et
 remedia et prudenti administranda et, quippe et
 minimus error funestas habet calamitates, et
 ruinam precipitare potest. hinc delicatior est thesiza
 morum gravidarum praestantium, viam, medicaminibus
 levioribus praestantanda est, quod circa curam a
 vivens competere potest casibus, quos ullum sit
 abortus periculum exproremus. —

1. si in gestu typicis, nausea vomitusque, diu
 et program, nequaquam colubenda et evacuationis,
 opiatum adstringentibus, et intendenda praeterea et
 catartica, neque ut arguit pravorum? Scuror?
 Contentos? ja in viis, hoc etenim ut jam morbum
 possident a mutata indole succi gastrici, irritate
 fibras nervae? Compositum ventriculi, adeoque
 committenda est solis nuda viribus, aut ad summum
 puranda libentibus et desolgentibus a vomitu angustis
 et conatus minui possunt, nisi ulterius protrahant
 appetus, ja quo Curam isthmo machia cum levioribus —
 purgantibus et praestanda.

2. R. Contus. S. S. 14. de chicor. compos.

3. Cap. 7. S. S. —

L.

Si memorato remedio non cedat vomitus, tunc prout prius
 per aliquot dies infusio melissa cum succo mentha, et
 chocolata matutinis horis, et aliunde ex cenantis perina
 indolis mace, ad sequentem purgationem accede.

℞. misobol. Cets. ℥i. Summit. abrynth. l. et
 Centaur. min. @. ꝑi. Coq. in l. q. a. f. —
 dein dissolv. mann. Calabr. ℥ii. Colat
 express. add. ℥ss. de chior. Comper. ℥j. —

Si vero aem conjunguntur tormina intestinor. diarrhoea
 tenemus, prescribendus est vespetinis ℥ss. papaver.
 alb. et Duobus amaro. injiciendum est et anum et
 succo est ext. opiat. sub sequenti formula. —

℞. Conserv. Kinnorod. abrynth. min. et
 ror. @. ℥. b. Coral. rubr. ꝑpi et oculor.
 Canesor. fluviat. @. ℥i. b. add. ℥ss. de
 abrynth. q. l. ad Conficiend. opiat. de
 qua Cap. pregnant. mani et lro ℥i.
 addend. Dosl. Isotina laud. opiat. q. ss.

2^o Dum intant gravior Cephalalgia, rubor, suffusio,
 intolerabili gravitas, sine mora suanda est vena je
 jorachis, et pot. etiam Depeti ad Liberandas ptes —
 Superiores, quare redundante opprimas. Illud aem
 auxilium frequentius fugat, aut summo pte imminuit
 graviditatis incommoda, et si praeterea accessit Complicatio
 Cujuspiam mbi, ut scbris putrida, maligna, pleuritidis,
 aut peripneumonice, nulla habenda est graviditatis ratio,
 et peragenda cumq, mber desiderat, cum satius

faturo perire alia matre, quæ utrumq; Acta cumque
morti, in sepius accidit et tunc abest ut Cephalice actio,
et emetica abortum præsent, et immaturam fati, promou
eant huiusmodi, quin etiam afferendo Cæsi mibi, et -
Liberando matrem, Parent efficacius fati incolumitati
ut quotidie exprobrant.

13^a Frequenter tunc in Nulata 1^a graviditate periodo,
Cum illa e' reflexa humoris uterini ad tubos, pneumonico
et tracheali pendat, huiusmodi hæreditaria, et
naturalis fabrica pulmonum, natale dedit, et statim
Soli nati delinqui potest, et Cujus duras sequentia hujus
remedia, vana em' felicius beatis ad Liberandos -
pulmones et præcavendum infarctus, et ei dnt huiusmodi
juncula sequentia.

℞. pulli junior. Cujus ventos depleant hori.
mundat. Cochlear. ii. lxx. ℞. Hor. 14 den
ad. fol. huius. et Borrax. C. m. p. Bulliat
℞. Hor. 1/4. Colat huiusmodi Cap. aqua ℞. 9. den

Imo si quis prius adesset solutioni vaporis pneumonico
metus, atq; suppurationis suspicio, attendenda sunt juncula
prescripta vana et testudines, ut magis adhuc demulcet
liquidos. acinis nia, interim resperstis hor. et et negligenda
narctica et Sonorus Conciliando. Labentem tam retineant,
utizans refrigerante, cum foliis Capillor. vere. -
papaver. rhæad. Borrax. hordeo mundat. aliisq; huius -
generis, sint et Lacticia varia qd. d. biturque int -
mulisculo, et Laborem et acutates symptom. sublevare.

die Conjugales, ita ut verus h. un. aut 3. un. mens em-
 hamorrhagiam uteri nulla data cautela protaxit, & o-
 soluta propter ovarioli auferebat, verum etiam et in
 evidens vite Discrimen Conjecit, diversa petiverat medicor?
 oracula, variisq; una fuerat iudicis medicaminis ad-
 servandum statum, quis ta. melior ovarisset Condicio, dum
 me ad visendum epilepticum defunctum vocatum convulsi-
 statim ab eâ similitudine huius an quinque menses pro-
 vultu v. pathematis incandescentia, v. presentis jam totis
 mortui proli anxietates de quâ Conquebatur determin-
 arent aut forent, qđ disponere fuit nullam h.
 propositis leviores anam mōi usq; dedisse, quō Cūcā
 inter nos Cūcā examinari, et solissimū Caput tang?
 membrum t. h. ex delatu egrotantis mihi visā ē, ut,
 statim unicam abortūs Continui Cūcā judicaverim, in
 hunc finem repudiatis opiatīs et pillulis adstringentib,
 & ipsi multoties, vāc. lucum prescripta fuerant imperari
 quolibet mense v. 1, inbrachis p. totum graviditatis -
 tps, & iunctis parentum Clamorib, Celebrata fuit, -
 tamq; saltem praebeuit litum, ut proli Ovari sa habentis,
 leniorib; etiam querepēi dolor mata evasit. -

pag. 412

Cap. 2^o

Curatio

De periculis partūs

Ad felicitatē Lochiorū immoderate evacuati recurrendus,

perpendenda et casus in istis natalis, ducit, et cum variis -
 Caput ibi coarctata fuerint, diuersas quoque et agerant
 exigere videntes, verum tamen cum facilius reduci possint ad
 repositum in uterum, et ad vitium fluidorum. Duplice hoc
 titulo, pro atque naturales albire ostendit motus, quoniam ibi -
 auxilium componimus, et i.º quoniam proinde quoque et tunc
 quoniam videntes in fundo uteri a portione quadam placenta,
 secundinarum, humo, quoniam in parte, interna remedia
 vix seipsum attingere possunt, etenim sola arte et manu
 chirurgi et obstetricis, promptius educenda, quippe nulla
 speranda salus, nisi prius eulati sint obice, qui si ita molis
 extiterint, et praeterita obstetricis, in utero ad aliquot
 dies conclusi, perperam se vident conueniunt periculum,
 et iuvatis tunc fere remediis, flumina quoniam putant
 simul cum adfundit, interna lumen sola sua quodque, -
 sufficit, ad expellenda illa et hanc quoniam, praeterquam si
 iuvatis. mediam statim et praescribere v. s. in brachio, Brachio
 aut in pedibus, et solam ad hemorrhagiam minuendam, remedia
 etiam ad provocandam phlogosin uteri, quoniam peractis, -
 consulenda viribus perperam, si languentibus et extinctis
 fuerint, reficienda potius lenioribus Cardiacis. -

℞. aq. flor. Cord. Zii. in at. Sissoch. Confus.
 alth. et hyacinth. ʒi. aq. li. naumom.

ʒi. A. pro statim sumend.

efficacius tamen auxilium resumendum est et hysteris -
 diuersa familia, et quadam tunc irritantibus, qui stimulant
 uterinas febres, et ad violentiores contractiones, et Contra

avulsionem et hystericam, delirioſcentis prioris incipienti:
 purgationibus variis diluentibus, refrigerantibus, balsamicis, —
 acrioribus, sicut pariter applicatis Calidioribus et aromaticis?
 Superiorem regionem uteri, et propterea nervos? genus, et —
 fibras motuſas commovendo, majores motus determinent,
 qđ dicta ostacula abripi possint. —

2^o Cum foret interior lochior? effluxus, annotata —
 Labefluidior, ut Ferore dissolutivo et similibus, magis —
 adhuc qđ jam priori. Cum persistendum e. v. s. —
 Conſurgendo deinde ad roſeata, gelatinas, emulſos leviſſos,
 opiatas adstringentes, et hypnoticas.

℞. Sem. frig. mund. ℥ss. Contund. in mortar.
 marm. lenim affundenti. Decoct. liquirit. deis.
 Colet. et Colat. ad. ℥ss. papav. alb. ℥ss. ℥.
 emulſio luvend. vesp. hor. —

Quod si adhuc Compoſcatis humor motus, et augenti
 rivuli quini, squam. pulv. parandis e. —

℞. decoct. Consolid. maj. et aq. ros. C. ℥ss. ℥ss.
 de ros. siccis ℥ss. luv. de ros. viti. ℥ss. —
 Laud. liquid. gutt. xx. ℥. pulv. qui facili
 potest mutari in opiatam eiden. scopo —
 satis facientem.

℞. Consol. simplis maj. ℥i. squam. dracon. et
 terr. sigillat. C. ℥ss. ℥ss. de ros. siccis ℥ss. ℥.
 ℥. opiat. luvend. vesp. et mane ad ℥ss.
 ad. de ros. siccis. Laud. opiat. gr. i. —

his paratis, jms et ℥ aliquot dieb. continuatis,

debellanda e' Cuius & dietam resedationes. Quorū Constat,
quod Cuius si adsint induria praeuro. Sicut ut nausea, lingua
amaritudo, et siccatas, pondus in ventriculo, aliaque huius
modi, proponendum e' ad quod Cathartico-emeticum. —

℞. Decoct. fol. chicor. ℥v. Loh. mann. Calab.

℥ii. add. hyppocistum. ℞i. Cagr. v. —

℞. fol. Sena. ℥ii. infund. in decoct. tamarind
pinguium ℥xii. dein add. flor. malv. et violar.

℞. ℥ii. post sufficientem infus. loh. mann.

Calab. ℥ii. et ℞. ℞. pro mo. 2. Ser. i. ℞. ad.

Interstitia. sub. gr. iv. —

His succedunt juncula de frigida Ampullis et —
plantis attingentibus, ut plantago, Osmunda pastoris, equiset.
Consolid. Oritost. urtica. vino et perseverante affectu varia
Lactioina, Cuius Succi variis repurati, & equiter probe —
diluerit & utantur. —

3.º Si a adverso putat hyppocist. lochia. diversa
procedendum e' methode, nisi a phlogosi utrius, & vicinar.
Itum inflammatae dependet, in quo casu cadem e' hypp.
proposuimus adhibenda forent auxilia, & posita laxitate
et torpore fluidi circulant, & impuritate generali —
mane liquens, ad frequentia Recurrendum. —

℞. aq. artemis. et matricar. ℞. ℥ii. in aq.

disolv. theriac. veter. Confect. alkum. ℞. ℥i.

add. syr. tussilag. ℥i. ℞. pro statim sumens.

Si autem q.º elapsa a potius Cardiacis huius, secundum
venalaphena, ad augendum fluxum Cruoris p. ramos —
epigastricos, et spermaticos, et intendendam derivationem
fluidi

fluidi quasi o felicitate successit, ob praevenit coagulationem
 & complicationem morbi. Cum febre putrida aut maligna, quoniam
 propter potentiam.

℞. fol. orient. ℥iij. hummit. abynth. ex lentan.
 mix. @. p. Coq. levit. ℥a. aq. f. s. q. ℥a. colat.
 et hysus ℥xii. dissolv. manna. Calabr. ℥iij. s.
 ff. pro pro 2. Do. i. & add. tartar. stibiat. solub.
 gr. v. & si agra instrumenti delicatioris nris.
 lxx. globos. gutt. xxi. ff. pro. —

Dein vero attendendum ad humores fatis, & intus in cerebro
 et pulmonibus minitanti, in aliis circumstantiis respondere
 & i, a talo, imo et potius simpliciter purgare, & tractu tempore
 docti tart. stibiat. & lxx. emetic. donec penitus convalescit. —

Et tandem ut spectat ad therapiam febris Lactae,
 idcirco nec vivit, committenda est, haec enim dicitur velle quod
 propositum resorantem Lactis Fontes, et funditis profluvium
 humoris quo proles excludit, letetiva crescit et nutriti, vixit
 cum sapientia illa conubium faciat cum prava constitutione
 Lactantis, et aliunde mater feris quentis, & humanioris,
 nutritionem proli ob mammas reuvasciscunt, diversa
 tentanda sunt ad coarctandas ex humoris Lactis refluxum &
 quibus lacum nascentes herbas, adeoq, patria victus tenuis
 imperandus est, dein gompie olei Camomill. bluat &
 melilot. & Lintis Calidis, et acervatim impoitis coarctanda
 mamma ut praevaleant iudicatas, affusus nixius —
 humoris Lactis, et magis ignis pass & spicula
 vasos. diffilavit. intus parant ptyzane levitai —
 aperientes & Diuretica. —

℞. fol. Capill. vena. & polivri. aut. molopendi.
 m. s. infund. in aq. fervent. s. q. deis add.
 flor. rapas. vhead. p. ii. ff. p. t. p. and qm
 Copioso et repetito ielu Boilat.

Clysters semel in die injiciendi sūt, cum aq. virgulis
 & cum Sacet. plantar. emollient. ad rugendas quasi
 moleculas liquoris lymphaticas venis oculis intestinalia,
 interdum et effluvia & auxilia, et quasi invita-
 mēsa in pectus fuisset opus. viam regiam seu a-
 mām prescriptam tenet Lax, tunc purgās dentem
 exhibenda, ad intendendam vomitū, deos moventes et
 irritatem, & affatim quotanda diuretica, ad amandandum
 venis venas superfluum serum, & negligendo ta-
 anus & latuit ad nimiam q̄tatem
 Lactis ad mammas appellentis, et impediendum ne
 notabiliores, & in lacumenda contēta, & in variis
 organis itages edere pro it. ad hēu! nimis frequentē contingit.

OBSERVATIO

Matrona Nobilior hujus Civitatis, anno proximo
 elapsa mense d. vii, parturit mediā nocte adeo promptius
 atq; felicitis, ut ob, tetrix parturillam cito levare
 gloraretur; & exivi mutata fuit rerum facies, intra
 intra, partura unius hora, tam quod fudit liquoris copiam,
 ut ad ultimas line sensu et motu, cum facie pallida et
 extremorum refrigerata sedata fuerit angustia, et —

ad; ante aam exiens cum squinis rivulis reddere
opinarenti: obstetrix ta intromittit manum in utero, —
lentabat suppositis placentis portioem, & predebilitate
puerperae, et metu fatali syncope, quaeiam moliri
aut tentare o audebat: vocatur cum instantiae huius
periculi circumstantiis, et perperis miserrimo egrotantis
mater, quem plane desperatum. Continua etiam p —
Levis intervallum haemorrhagia judicari, quae iuxta imperari
obstitit ut tunc sine formidine auferret extenuem latus,
quod hemula manu percipit, & evanescit vix addidit, quippe
remisso statim Curis vestimento, et restituta prope —
Cardiacae animo, brevi post brevi a habuit purpura. —

Cap. 4^o pag. 19.

Curtas

De vomitu et singultu

Et efficacius mederi liceat singultui aut vomitui, —
quorum attendendum e praesentia, ad Cyprian Lactis o
ingereit quotidie ab infante ad naas humoris qui
reperitur, deniq. ad statum ventriculi, a oia o leviore
in Haemipia mutationem afferre int, etiam si a voracitate
tunc natus originem ducat, portioem quodam alimenti —
substituta, et nullo adhibito remedio discurrit, varum
si a perima Lactis indole, aut maiis pravis cum
ipso commixtis simulq. debilitate ventriculi dependeat,
sequentia adminis trandast remedia.
pro omittenda e natura v, s, h calor et febrilis motus

Cum vomitus declasent, ad praecavendam nimiam
 tenellos? vasculos? tunc est iara, aut ruptura à jn
 repetitis Convulsio. Contingere possent, aliter aera
 suppressenda à illa evacuatio, et praescribenda à
 liquens julapium. —

℞. aq. ros. ℥i. Coral. sub. ꝑꝑi, et oculor.
 Canosor. fluiat. @. ℥i. Confut. de
 hyacinth. ℥i. aq. naph. cochlear. i. fl.
 julap. cui addid. esset syt. papav. alb.
 ad ℥i. aut ℥i. si vigilia aut calor
 intensior urgens. —

Dein vò eliminanda et mās contenta, seu longesta jn
 ventriculo et emetico leviori, et Cathartico si jnveniri
 possit debilita ventriculi, et laxitas fibrar. praescribitur —
 hypericum. sub sequenti formula —

℞. hypericum. gr. v. Confut. de hyacinth.
 ℥i. solve jn jnvent. aut viā. rubr. cochlear. ii.

Si vò adara appareant ventris termina, et juxta
 Calore et siti premati, reliquo emetico paranda quae juxta
 purgans.

℞. fol. orient. et flor. persicor. @. ꝑ. ii.
 summitat. absynth. mis. ꝑ. i. coq. levit.
 jnt. aq. f. jn celat. ℥ii. Dissolv. man.
 Calabr. ℥i. syt. de Chios. Compos. ℥i.
 fl. roo. vel.

℞. rh. crassiuscul. bit. ℥i. et ℥i. coq. jn
 aq. font. ℥ii. Dein Dissolv. man.
 ℥i. coq. Lantana. —

Una aut altera elapra a purgato sic exhibend. ℞. ℥ss.
 Delictos. Compos. ad. ℥i. Cum r. pulv. gr. x. & xiiij
 Hillo aquar. ros. & nuch. qd remedium Continuandum est
 Ad. & nulla facta intermissione, & alternis dieb. pro virib.
 Infantis. Interim reparationi hor. o. negligend. Julap. quon
 ℥ aq. ros. et plantag. ℥i. f. Coral. rubr. ppi.
 et oulor. Canvor. fluviat. Q. ℥i. &
 Simplex Coral. rubr. Cum ℥ss. Cydonior. —

Sugato hinc remedia vomitu restituendus e. tonus
 ventriculi, aliter em. observi mbris decideret, ad
 quon. Finem plurima Competere possunt.

℞. ℥ss. de ablynth. ℥i. infus. Kin. Kin.

℥i. f. lap. p. Ad. p.

poterunt quoq. exhiberi Oris indicia vini optimi cochlear. ℥i.
 addito Cinnamom. aut Cortia peruviano, & qd felicius pte
 mibi. succedit,umat infans decoct. rh. pro. poter. ordinari.
 intestum accidet ut memorata remedia, mbrum peritib. o —
 p. obligaverint, seu. doctores nuci o. sufficiente evacuat;
 & iei. hac assumptum, ita. vitatum. infanti. nihil. cati, ut
 observi. post. in. ventriculo. putrescat, & acorem. contrahat,
 in. quo. Cam. duplici, repetenda. e. pro. purgans, Cui. succedat
 decoct. Kin. Kin. permixtum. Cum. Decoct. Chicor. Cum. theo
 Composito, aut. mutanda. &. nutriti, qd. si. exquiri. o. liceat,
 emendanda. &. Lactis. vitia. refrigerantib., &. Suavib., prout
 Lac. e. acius. nimis, et. fervent. nutritiis. fluida, &. roboranda
 &. Stomachicis. ventriculus, ut. Chilos. probe. digestos, Lac.

quidem nunc subministrare potest, ad brevi in emolumentum
proli. Adde solet. —

Cap. 60 pag. 26.

Cura

Terminum ventris seu Colici
Doloris

Si iuvandum e opera plurima Colici Doloris, ut
proleat intensior intestinov? tensio, mitigati stercule,
et avertant symptomata ad hunc prudentia: varium auxilia
a seorsum attingunt, tutius administrari requirent, quoniam
evidentius nascat ex signis jam dictis Colica species, adeoque,
reguli tot. saniores therapiam Comprehendere juvat. —

1^o cum aflatibus, viscidisq. humoribus parietibus Stitula
intestinalis ortum habet termina, nullumq. imminat periculum
aut inflammationis periculum, statim injiciendum e
excreta

℞. fol. pariet. m. p. l. m. anis. et faniul.
℞. p. ii. flor. Camemel. p. i. Coq. in a. f. s. q.
in Colat. et expressio. ℞. v. d. vi. Dissolv. —
Catholico. ℞. p. vitel. ovi dimidia. p. l. m.
f. Clyster. —

Eodem tyro foras ab domo Lintheis Calidis, et juncatibus
de aneth. et Camemel. simul cum decoct. pariet. et malv.
et parietis vegetivinis hor. julep. liquens.

℞. ag. naph. ℞. Conf. de hyacinth. si.
lyr. papav. alb. ℞. ii. Coq. Sol. —
℞. Nigros. frascant. si. solv. in vin. rubr. —
Cochlear. i. lq. —

Crestina via si quidam tenet recrudescat Dolor, repetendum e
clyster et foter et etiam in die mutanda et ex initio Conf. de

de hyacinth. ʒi. Cum Coral. rubr. gr. xv et thillo lactis^v
aq. naphi. Cochlear. i. Deinde vō eliminanda ē cāa nā
Cathartico sequenti. —

ʒ. rh. Contus. ʒi. fol. lenn. flor. passior et len.
anis. @. ʒii. Coq. in aq. f. i. q. pululat. ʒiii. —
dissolv. manā. ʒi. v ʒvi

alterā a purgāōe die, impervenda ē gressio hīs hīs. et rhei ʒii,
jā die sumenda. et ʒ. ʒi. Continuat. ē si placeat ithocum
ō roboraret, prescribi p̄t ʒ. de abgath. ʒi. Cum rh. pulv.
gr. v. v ʒvi. ʒ. duplicem diem ante lētis hantura, si lactam
fuerit, v ante panatellam, si solidioris libis vescat. —

Diminuti peris modo se gaudenda ē in alterā Colica Tric:
Liquida statim se dimittit ʒ. i. sacanda ē vena, ubi etas
tenuior, v reliqui phlebotomia obier. cam interpellant. —
misso tōm ʒ. i. paret sequens elyter.

ʒ. Cucurbit. infructul. sect. m. i. len. lin. ʒ. i. —
Coq. in aq. f. i. q. sub ʒi. Coct. ad flor. melv et
violac. @. ʒ. ii. pululat. dissolv. mell. violac.
ʒi. ol. amigd. dule. vire igne ʒ. i. ʒi. v ʒii.
ʒ. elyter. vel. —

ʒ. decoct. omas. ʒvi. solv. vitell. ovi. vel.
ʒ. Lact. vasc. lapid. q. i. et pariter injiciat.

horā somni pariter exhibendus ē pulvis. —

ʒ. aq. plantag. ʒi. ʒ. ol. amigd. dule. vire igne
ʒ. cochlear. ʒ. papav. alb. ʒii. hīs ita
peractis aut continuatis ʒ. 2. aut ʒ. 3. die,
si dolor mitigatus fuerit purgāō sequens
celebranda ē. —

℞. mann. Calabr. ℥j. solv. in infus. flor. malv.
et violar. ℥ij. add. syr. de chior. Cingor. ℥i.

ff. pto.

Continuandum ē idem narcoticum repetitis hor. donec
Lactans Convalescit, imo et quous pulv. exhibendus ꝑ

Prædium. —

℞. Coral. rubr. ꝑꝑ. et oculor. Canvor. flusiat

℥. gr. xv. miscela in syr. de chior.

Composit. ℥ss. in Corn. thillo Lactis.

mirum sane ē qd̄ Coral. prosit in hoc affectu et in
probris imis aliis infantum. —

Observao

junior in eam pharmacopola hujusce civitatis, tū a
nativitate premixta ventris torminibus, ut dies et nocte
in ejulatione Continuo transigeret, et ab oib. o concessa quiete
relinquisset nutritio, neq. nullo argenti pretio, v. etiam
auri repescent ad præbendas mammas, plura fusibundo
quasi Lactanti exhibita fuerant, quin ullum manifest mō
revertentum; parente o perperant narcotici, imo qd̄ multa
præsentia et Comili ē in hacce terasiori etate Laudanum,
aliaq. Odenē multa tentata fuerant sine ullo successu remedia,
dum ꝑ matris rivos incedem, vocatus sum ad indicanda
si eadem forent in hocce mō auxiliā: explorato Lacte,
et examinata nutritia, sicut et auditis o peracta erant, —
huic ut tū in die antea Lactis haustum exhiberent
Coral. rubr. pulverat. gr. vi. v. viii. o elapsis aliquot
diebus, jaectas et fletus in fantis, adeo efficacis —
remulscere, ut nullo dein facto remedio probe se habuit

Curae

Curatio De difficili dentitione

plura ad fuganda symptomata difficili dentium eruptionis, & statim graviora minuitur videntur, catartica et vomitoria praescribere solent, & tunc abest ut natura minuantur, quia etiam intendunt, et fata puriorum accelerant, etenim ois ille tumultus a succumbente violenta febre, nervorum, et commoto liquoris ovis dependet. adeo ut ois in eo vanus sit. Cautiori deus, ut mitiget stimuli. Cauti, et praecaveatis febris & infarctus viscerum ab ea omni in partem finem statim hoc explorandum quo rescit in fano, atque mutanda rectrix, & designatas qualitates obtinent, & saltem illi praescribenda e. Dieta humectans et refrigerans, dein vero ad causam mali, emolliente, et frigidanda. Sapientia gingiva, mucilaginis, pyllii aut Cydoniorum pulpa radices althaeae, melle narbonensi, cerebro leporino, aliisq. similibus, immo si inflammatio gingivarum addit, et calor et duror intensiores urgeant, succo rhamni Lactuca, illinenda et gingiva. sapientia explorando opus nunc, eruptionem molientis, & si eruptio desitorum, et succorū auxilio, pigra sit et tardior, imperanda e. in gingiva ope unguis, & cultui, suctaq. emolli operata ea fere ovis remittunt symptomata, inferius & si necessaria alia medicamina ad succumbendum urgentioribus symptomatibus, adeoque statim mittendus e. ignis, & solus ad minuendam intumescantiam gingivarum, verum

etiam ad procreandum Squinis organum: insuper
insiciendi et clysteres, ne intestina irritentur. —

℞. fol. malv. et viduar. \mathcal{C} . m. f. f. l. malv.
et sem. lin. \mathcal{C} . p. ii. Coq. in aq. f. i. q.
in oleo lat. et express. dissolv. vel. n. a. b. o. a.

℞i. ol. amigd. dulc. ℞i. ff. Clyster.

Deperitum non paratis liquens julapium. —

℞. aq. endiv. et portul. \mathcal{C} . ℞i. f. add. Coral.
rubr. ℞. Si. Succ. limon. nativ. aq. uat.
aq. naph. \mathcal{C} . ℞. f. partenti nulep. in 2.
m. i^a add. syr. p. p. alb. ℞i. f. v. ℞ii.

Si vero si adit suspicio pravor. succor. Latitantium
in ventriculo, quens purgatio super addenda a. —

℞. fol. lenn. ℞. f. flor. p. siccior. et sem.
Contra \mathcal{C} . p. ii. Coq. levit. in aq. f. i. q. —
diss. dissolv. mann. Calab. ℞vi. syr. de
chicor. Compos. it. ℞i. f. p. o. o. —

Itaq. Cathartium nequaquam sufficit ad eliminandum
Saburam et Lepus Translata ad Cerebrum, soporem et
motus convulsivos determinat, aq. interdictum indicat ventris
inflato, vermibus, et anuro et ceteris, aut a quillo in quibus,
de quo Casu addenda erant p. o. o. purgantis, jam supra —
prescripta, ℞iii v. ℞iv. via emet. v. syr. globul. gutt. vi.
v. vii. v. tandem tartar. Misiat. singulis q. ii. v. iii in aq. f.
his paratis, si debilitatis ventriculo, etiam suspicio —
moveat, prescribi et syr. de chicor. Compos. cum Theo

dein, thymathies et levisi purgantibus in ista tentura, donec
penitus desierit motus, atq; adeo deserviet macti p -
aliquot dies, lxx. de chior. Composit. ad ℥j. cum th. pulv.
℥i. v. lxx. de abrynthi p. ℥i. ut major adhuc ventriculo -
robor Coruliet. -

plurumq; accidit, qd his tentati evanescat affectus,
interdum ta solva modo imminuati, in quo Cam; paratā
ut supra posse purgante, Confugiendum ad sequentem
pulverem. -

℥. Coral rubi. p. et oculor. Camer. Pluviet
C. ℥i. misce Cum lxx. de chior Composit. ℥j.
v. Cum thillo Lactis.

his ita potatis, ad moti reditum praevidendum, infantem
utatis pro potu ordinario infuso r. his praestitum si alvi
profluvio obnoxius extiterit, et ipsius facie sit subturnita,
decolor, Languetq; appetitus.

Dissimili prorsus modo agendum ē, si mēcio Congestura
fuerit, Colore flavo, viridi; excretorum, Calore, Sate, -
infantis Odore profluvio fontani, epurim tunc exami -
natā nutrice et Lacte ipsius, infans, recte abstinēdus ē, si
exorituris refatigati, frangati ac pathematis, v. qd pigra,
Lividioris impetib; obtemperet, v. saltem tpeanda ē -
Omnib; hordei, orisa aliisq; et nutrienda latis Oronis
Lactis, vitando imprimis fructus horreo, qui ita parum
recte in ventriculo nutricei subiguati, ut deis ipsius Lac -
gisavis moleculis inquinatum, infanti abominandum
evaserit, cā aem sic institutā indagare, igitur missio ē
Celebranda, imo et p. eanda pro virib; agri, et vinctura

Caritae; deis autem interioribus elapsis tractandis ē. —

℞. fucus mar. et hord. integr. ʒ. iii. ss. sem. lei.

℞. ss. liquidit. ros. et contur. ʒi. ss. Coq. in aq.

q. in Colat. et express. ʒv. Dissolv. mel. violae.

ʒi. ol. lilior. ʒi. ss. ℞. elytra statim inspicund. vel

℞. decoct. omasor. ʒvi. Dissolv. vitell. ovi.

Inter ea abdomen cum decocto plantar. emollientium fovendum ē, ut sic effectus imminenti phlogosi occurrat, et dora romi quon. iulapina exhibeatur.

℞. aq. Lactuc. et portulac. ʒ. ʒi. Coral. rubr.

ʒj. ss. Lys. papav. alb. ʒii. Coq. in aq.

si remittat, alio fluvio, et perorasset adhuc febri, —
stomachum mittenda ē quia, et quon. elytra inspicenda.

℞. Lact. vacin. et Decoct. hord. ʒ. ʒiii.

Dissolv. ov. vitell. ol. amigd. Dulc. rose igne

ʒj. ʒii. ℞. Elytra. —

Horabitis quoq. iulapium cum narcotico, jmo et augenda ignis ʒoii, si antea tenuem a consiliaverit. —

℞. aq. Lactuc. et plantag. ʒ. ʒi. ol. amigd.

Dulo Cochleari Lys. papav. alb. ʒii. —

ʒiii. —

Cum haec peragunt. Simil aut ʒoii jndie exhibendus ē infanti Coral. rubr. ʒj. ʒi. q. p. porcorum textum pravas emolumentas, jn ʒoii vis contentas et redulantes, jti retundit, ut exinde ad stimulantium minus comparat evasiant. —
postea jntituenda ē pro purgans, ut nobis fames —
positis obtuncet. — —

℞. 1/2 Balnion. Comp. et man. Calab. ②.

℞. 3. Dissolv. in aq. chicor. ℥iii. ad. rh. —

pulver. 9i. Cap. —

Celebrata sic purgase si adit suspensio Cochinchina adherenti
ventriculo, et si intestini nullus restitutus est operandus locus,
quis prius expulsa fuerit, adeoq. prescribi pot. hyppocacua.
ad gr. iiii. et iv. ad Remedium gravis vomitum, variat, ita
ta ventriculi dolor auget, ut peritum alvi profluvium —
evanescit, tandem per Lacte et verius ut supra. jam
propositis in Larum intubi ingruit lenta febris, ingruunt
et quoq. marcor et atrophia, unica superest medela, Lac-
nimium mellebre si si mammas respuat, Lac. Caprillum
vaccinum, solum cum Decoct. hor. abutatur, Cujus usui
perstinacissima alvi profluvia frequentius Curiosa observant
practici. —

Observatio

Puella nobilior originis, seu ante tempus suppressa fuerat
nutritio lactea, brevi post iniecit in alvi profluvium quasi
Continuum, ad insequens pallor, atrophia, tamq. molestia
famis, Larina, ut alimenta Lusuusq. generis appetus
flagitaret, et avidius devorata, diarrhoeam promovebant,
nullamq. repautionem suppeditas agrotant, talibus adstria-
gentia et sthenica suntius et laxa Continua, nullum
blatium aut mibi Laras attulere, breviorq. actum
fuerit de tenella puella, nisi finito alvi profluvio maxime
novam nutritionem, et Constantia recusant jactans, ita ut

ejus loco Lac. villum exhibitum fuit, et o. alium
diarream, verum etiam fabrum Lentum et farnem
Caninam afferte curavit. —

Cap. 8. pag. 91.

Cura
alvi adstrictio

ad Collimare et Curare alvi suppressa praecipuum regem,
ut tollantur Lac. et alvi suppressi sit, simulq. laxati alvi,
ad quera farnem, si mater aut nutritrix in usa fuerit, ut
Cydonia fabis et virilibus a alvi adstrictio apta,
ab illis in iustitiam abstineat, Contrarius potius versant,
nempe mactis Lac, aut si Calidum aciumq. sit, refriger
antib, succedantibus nutritrix tperet, Deo attendendum e ad
Cura farnem a quent ibi resellanda e. —

℞. Lact. et ro. et Lact. Cap. 8. ℞iii. ol. amig.

Dile. ℞i. Helysta. val.

℞. Lact. et ro. et Lact. Cap. 8. ℞iii. ol. amig. Dile. ①.

℞. medull. vitul. ℞iii. farnem. —

Deputo elytre, et exhibitio Lact. et Lact. in atate infantis,
foveat ab omni Lact. et decocto plantar. emollientium,
ut malv. parietar. Drac. urina. et succedat julap. versent.
hor. —

℞. aq. Lactue et in fus. violar. ①. ℞i. 19.

popar. alt. ℞ii. Cap. vel si sit infantis, —

minut. paulisper Lact. tperet. —

haec p. aliquot die, repetenda sit, et si alvi t Lact. et Lact.
infantior t sufficiat elinrent, elytrid. jam prescriptis
addi et medull. can. ℞i. et corundem juvenanda efficiant. —

Naris suppositoris Confectis ex Laudano, sapone, melle, radice
malv. Orizyris, & alibi.

℞ Rosor. musis ℥ss. adipis ℥i. ꝑ. suppositor.

Similia ad probē et radicis, restituenda Caam hujus, calvi
Constipation, purgatio mitior celebrabit. —

℞ pulv. Carr. ℥ss. ꝑ. flor. malv. et violar. @. ꝑ. ii.

Cog. levit. ꝑ. i. q. aq. ꝑ. deis. solv. manna Calabi.

℞vi. vel

℞ manna. ℥i. solv. in Decoct. Chicor. deis. add. 19.

de Chicor. Compos. 5 ꝑ. flor. perriocor. ℥i. ꝑ. ꝑ. 100.

his ita paractis, & panibus deservenda et exornata, totum et
nervotica, donec alvus Commodius deponat at vō dux
alvi adstrictio debet man. tenacib. et pertinaciter impati,
abrogata refrigerantia et nervotior. usu, insistenda
& frigiditatis et purgantib. —

℞ Decoct. malv. et parietar. @. ℥iii. sem.

lia. et sanguinat. @. ℥ii. post sufficient.

Cochion. dissolv. cathed. ℥ss. ꝑ. aq. —

℞ no aut albero Elapso die, quoniam prescribitur ꝑ. 100.

℞ rh. Contus. ℥i. demba. in 1. q. aq. ꝑ.

sol. lena. ℥ss. ꝑ. flor. perriocor. et summit.

abynth. @. ꝑ. iii. post sufficientem in solv. —

Colet. et la. Colet. dissolv. manna. Calabi ℥i. ꝑ. 100.

Celebrata purgatio exhibenda et in fiant. Si alvus animum,
propterea cum Corripitur cunctis et alio, sed si sufficienti
alvus & agitat, et alia moveat obstructionis, hujus in
hepate, me anterior. donec, ex exercit. in alio, albi, cantib.
Cui quādam intumescencia ventris, pedum et facies
decolora

decolore, squens pulvis impoendus. —

℞. Goss. mast. apocient. gr. v. rh. pulver. gr. x.
Cinnamom. gr. vi. pulap. & diagrid gr. iii. ff. pulv.
Continuand. p. d. v. q. d. —

℞. peractis puer ita in pargabit, et deis ipsi ex his elibit p. o
ordinario potu, jalsuo thei et Linat. Ferri —

Cap. 9^o pag. 4^o.

Curae

De anni Decidentia

totalis curatio venarum in anni repositioe, et repositio potus —
Cura, repositioe consistit: adeoq. pars prolapso a doctis vino
tepidio, lacte, decocto malvor, et liliis. fovenda e, pro diverso
tumefactionis & inflammationis gradu, pro si hoc e sufficiens,
Salvia ex istis, et sic parata, puer insidet, dum leviter tractat
digitis, et paulatim in anum depellat, quo peracto accedenda
ad medicamenta adstringentia, et inveniunt, parva & genis
beneficio impoenda ano.

℞. ros. rubr. Calaurt. maci. Cypressi, et tost.
granat. @. ʒi. iij. semm. plur. mastic. @.
Sic loq. ja. aq. fabror. & vin. rubr. et exoriet
hoc decocto modica, repit anno fovendi.

absoluta fomentatio, pulvis squens impoendus. —

℞. ros. rubr. et Calaurtior. @. ʒi. ss. thur.
mastic. et myrrh. @. ʒi. ff. pulv. mediant
gossipio impoendus.

insurgit se per senil repositio elabatur, in fentis curis
iunctis jacent, et si tenacioris etatis fuerint, cura facis —
Colligenda it, interdum so accidit ut pro suppuratois exterioris
gangrenae, & pncali motu, pars sequatur pot reponi, ja.

quo Casu amputanda e pars prolapsa, et de his convenientibus
curanda remediis, ut solenne est in amputatoe hemorrhoida.

Demum si motus ab exurgente aqueo humore sollem
repetat, praescriptis leniter resolventibus et assiccantibus externis,
intus etiam tenent aq; calidis, Cum ad lumina rursus aqua
Orellilucana, Confugiendum est ad sthomaehica et assiccantia.

℞. Syr. Saabynth. ℥i. Rhei pulv. gr. f. —

Cinnamon. et milluges pulv. gr. v. misc. Cap.

Utati insuper infans pro potu urinario infusura Cinnamom.
et Limat. ferr. in mod. inclus. ad finem imponenda salutari,
Sumat procerum sequentes —

℞. microbol. Citri. Contu. et regentie. ℞. ℥b.

℞. Contu. et anis. ℞. p. i. Cap. in aq. font.

℞. iij. julebat. Dissolv. man. calabr. ℥i. ℞. p. o.

Cap. 2^a pag. 48.

Curae
pernici

ia sic est cura ut intestinum exponatur, et leniter
repositum retineatur. solam copiam facile attingemus
si praestita, vana, et flaccida fuerint intestina, tunc
cum resupinato agio et Quilibet elevatis, tum leviter
tractandus, et sensim venter superiora comprimendus,
venter si turgens intestinum flatibus v. mas, ad —
Cognoscitur ex tumoris resistantia, rugitu intest. mov. ²na
doloris, et alvi suppressione, usquequaque est discutienda, ut
Semen anisi, Foeniculi, Cucumeris, folia Sauri pulgii,
qbs mitigas adjuvantur, pro doloris intensione, ut oleum
rosaceum, Camomelinum, amigd. Dule. Nihil vō mas,

in portione intestini contenta repositio obtant, tumor —
 oleo rosaceo stillandus, et imponendum Cataplasma
 emolliens, paratum cum Radicib; altiss; libior. fol.
 malv. Cum ol. et butyris. mixtis, ut ipse tumor —
 facilius tractari possit. —

Quod autem intestinum jam depositum fuit, Cavendum est
 ne iterum exeat, quod in re maxime momenti, et facie,
 fistigacula, et speciatim ad hoc opus in sagittis parari
 solent, ita ut tam pte tarde aut nimis compimi nequeant.
 hac aem. Confici pot. Cera Calida, et atatis vir —
 proventiois infam, et cum duplicato Corio, et simpli et
 molliori linteor. apparatus, cum pulvinari chaulli
 annulis respondent. equidem nam in die rigorem,
 ad id efficacia jurant, ut in junioris aetate radicata laetis,
 praesentia in quiete detineri possint, et coarctationem,
 placent, Catariq; juvenis nris, qui pte repositam
 venio impellunt. —

Fandem Competit alvum Clysteris, Subrigere et emolli
 ire, atq; identidem praeos Invenio leviori Cathartico elimin
 are, de mris Intestina surgant, et emel. indutata, nova
 Cunnabula mris mabeu solent, sunt et emplastrum pro
 ruptura Ligatura apponere, qd minus in modum Saper
 pte, exsiccat, et prolapsum contenta. placaret. —

Cap. xi. pag. 55. Curtas

Umbilici proventia et inflammatio

Therapiae huius affectus exigit potissimum a —
 laxitati pte, et Consolidatio, posito qd ruptum

fuerit recurrere pot: adq; amoti. Senel. Las. ad
 fibres extendere, emollescere et pariter ad nrisura et
 actiorem Contentorum intendere pot, ut Oculacea, Libi
 flutulenti, Lac minis aquorum, fletus, ejulatus et
 clamor, ad sequentia deveniendura ē.

℞. sem. Cumin. fœnicul. Oracea. laur. et
 fœnic. lupinor. ꝑꝑ. (a pꝑ. aequali. f. Cum
 vii. rubr. Cataplasma.

Umbilicus fœnicul. detricati, vel amplius distendi —
 pot: deinde vō cum positionem ruptam ē cadere
 Competit ac in fœnicul. luto; fœnicul. positionem
 Commendat in ruenti exumphantis nuper natorum, qd
 rotulas eloris Confectas, earq; occupatio obstitit, & duntius
 ibi retinenda. —

Tandem si urgeat inflammatio, v. exulceratio umbilici.
 fovendus ē roreaco deo, in quo Resuscitatio Contesta ē,
 v. applicand. sequens Cataplasma. —

℞. malv. et Oracea. urvin. fœnic. hord. et
 fœnic. græ. 1. q. Coq. ad puti illigrem,
 deinde add. ol. amygd. Dulc. q. 1. ad Cataplasma
 Conficiend. —

Quod si supputatio aequaque Colubini pot, unguentum
 ē. Cus. lytarg. Therbent. et ol. jasm. hœmin. paratur.
 Felicia obtinet effectus in datis Circumstas. —

cap. xiii. pag. 64. Cura
 Intertriginis

Idem hinc paragendum incumbit, ut Lac optimū —

183

Indole Soligati, et demoveat adio Catarum Cutem
abradentium, qm ob res sapies it mutanda —
Linteamenta infundum, re. i. usinā madoant Et
sordida sint, aq. malv. ros. rubi. et fl. f. v. simul. —
Catarum t. Lenienda pass oleo Communi, et aqua simul
agitatis; semine nostra solent Conspicere Locus
affectum lerusâ, v. tertia preparata, v. unguento de
Lithargyro, aut naronzholigoz, verum si in jris itis
perseverent dolor et irritatio; imo itis affecto insidente
profundius et exulserit, tunc jris aqua Ocellilucan.
pibe' ablutis parabit, quem unguentum. —

℞. Balzam. alicui Ziii, ol. hyperici et ovor.

℞. Zi. ovor. vitell. ii. ff. unguent. —

Et si vera Catarum, nullum prestantius remedium
remedium aqua Ocellilucan. q. sequi in die fovenda
Et ita affecta, o neglectis ta remediis intervis aut
dieta humectante, et lenioris catrastis ad recuperandum
humorem Crasim. —

Cap. xlii. pag. 60. Curo

Delicta lactia achoris et favo.

Collicitos nequaquam teneat homines affectum thargia,
in favo ipso: ita committendi ita, praesentia dimissum
o deflorant, et oculos nequaquam cadunt, d. si malum
latius, in parte aut in parte itis retro pulsio e glaucoma
urgant lymphomata, o indormiendum e Curo, et statim
examinandum si... peculiaris vitio contaminato, v. saltem
dieta Conveniens ipsi in parte, si usaverit v. ut atus
alimentis pravor succos generantib, deis v. audendum e

ad varia alterata et degentia, ut inus. Cum fol. chicor.
matura aequat. Storrag et chesbol. in q̄s. gr. aliquot v. h. -
insistent, q̄s. finitis aq̄s. iquenti modo purgati. —

℞. Decoct. chicor. ℥ss. v. in q̄s. pro ias fol.
senn. ℥i. summitat. abynth. et centaure.
min. @. p. i. Colet. et in Colat. Digere mann.
Calabr ℥i.

Cleptis aliquot dieb. imperandum ē ethyops miserale
ad gr. 7. v. 8. luvend. tā in haptomoda, et absolvenda
Cruoris degentia; verum in affectu protrahati, et metū
adit ac putredo insignis sub Crusta foras, et errat
Cero v. Canina, Popia promptis aduocant ad lib.
iquenti formula.

℞. Lythargis. ol. ros. natis. ℥i. Cera. et
tutia preparat. @. ℥i. s. myrrh. et sulphur.
@. ℥i. misc. in mortar. Vin affundend. ol.
ros. v. olivar. q̄s. s. latr.

Teis iungati p̄m afficit, Caput etiam abluendum ē,
Decoct. malv. hord. abynth. et senn. Gentian. gr̄c. lugin.
et Sabar. v. ut efficacis agant p̄m incoq̄ in vin. rub.

℞. Dōq; sufficit Leo rudicis althea facta cum vinā -
infantis, ut solent peragere nostra mulier. Domum si ab
ulcerib. deperentib. Lesum v. Canina, Crusta i. -
emollienda malv. et violar. indurty. v. doctā, v. simplici
atungit et ubi Canina apparet v. p̄ndum ē mel rosat.
Cum thillo p̄diti vini, et insup̄a commiscendum cum
pulvere radicis aristolochie, et balzamo peruviano v.
absentia. —

Varia sunt medicamina in morbo isto, & pro diversis temporibus
vivere quoque, modo procedenda sunt: sic in primo ad
detrahendam crustam detergentia fortiora simul cum
resolventibus uti oportet, imo et humectantibus opus est, ad vascula
cutanea laxanda, nec non Conglutinantibus et Balsamicis
utendum, qd. indicata satisfaciunt, ut praevigila eadem
victus tamen qualiter in uloribus et Crusta lactea praevenimus,
ad quentia properemus. Statim exulium in Bethsal. Butyro
in pinguedine porcinâ illinita, ulcers imponenda sunt, ad
qtes, emollienda, et paranda sanies citum, & q. succi
sumar. Caulis, axillat. et oleum @. Zib. axungia-
procin. ol. rheum. @. i. q. Case. q. i. ff. unguentum molle
potius infans purgabit Cathartico communiori cum sen-
nâ et man. et praescribenti / quentia detergentia. —

℞. Flor. Sulphur. ℥ii. staphis agrost, et rad. boron.

@. Zi. aut aurini Zi. Hercul. venet 3j.

Quinqu. 1. g. f. liniment.

quod si Crustaceus nimis retrahitur ad huc o post, Tritum
nativum cum aqua gavis. plantae Cataplasmatidis -
Capiti imponendum p 24. hor. qd. diutius Continetur,
varietus d' q; malum sanat.

Crusta oblata, pili cum radicibus evellendi, cum manilla
magis ipsa adherant, ut fit in oculis, in pilosis, his —
medicamentis Capillis tollentibus, vulgo tam utuntur piceo,
pice navali, inducto quem capiti, in loco quem tinea
occupat et obidit imponunt, et aliquot dies ibi detrahunt,

donec clauso sufficienti tempore, violentiâ avellendus, &c. —
 His ita peractis, semina plures affanno asperso, & ol. de
 Hyssopo, & roshan, & succo Leporum fruantur Caput ad
 rubedinem usq; ut vitiosi humores, aliter latentos —
 evocent, et ad exteriora trahant: tandem ad absolvendam
 horum ulcerum Consolidationem Pellicula impenduntur albae
 utrum vitridum et aritholochia rotunda sub forma
 pulvisis pro pte affata impelquente, & Cataglasmati
 additis, pie navali et Odutyro qd pte affatis imponit:
 imò et innulli utuntur an enico, aut pigmento, & implenti
 angula solâ; et tunc Cantolam liquat, cum timendi locus sit
 revereata effluvia, & claudere migraverint neq; —
 Insupus negligenda sūt varia interna remedia, & quidem
 Diluta & emulsa, atq; Contaminata ignis portio em p
 varia in emulsa amandare possit, qualia sūt emulsa cum
 pullis, gallinaceis, fastane calicato & flor. martialis:
 athyos minerali, & mesurius dulci. Interenda dñs sūt
 heptomadâ, opiata sthomaehica et absorbentes, Lactiinia
 varia, pro diversa Constitutione Liquida? statu & aetate,
 etate progressu mbi, et virtutis ulcerum. —

Cap. xv. pag. 67.

Cutis

gthyriasis

Cutis tota se avendo pediculari malo subiecta ad adultior,
 Consistit, ut qm odorâ victis tunc expurgati, vestimenta
 crebrius mutanti, et frequentius sit qporis sio, quâ in nova
 Cutaneum pediculor generati porcentem, ab hinc, atq; —
 abstergere possint: & in infantib; Compotit multum viata
 Conveniem

Conueniens, et in primis Lebra pectinato capitis, qd; —
 admiscenda calidiora et assida ad humidiores facies —
 etatis priora debellanda. Tum do' pectus geniti et, et
 indies propagant, prae misis statim universalibus, ut
 purgatio et iurculi precedentibus, De pectus varia
 Confugiendum, qm' p'io mitiora, nunc do' fortiora.
 Si propagati p'io calculi prole, prescribenda et
 adeoq; lotio, Linimenta, et varii pulueres parari possunt.

℞ aristoloch. rotund. pinn. et lupul. ℞.
 p'ter aqua, Coq; pro lotio capitis quā
 parata s't. liniment. liquens. —

℞ puluer. staphisagr. ℥iiss. Sasin. lupin. ℥ss.
 agar. alb. ℥iiss. sulphur. vivi ℥iiss. sellis...
 ℥ss. —

℞ staphisagr. abynth. ℞. ℥ss. sulphur. viv. ℥iiss. et
 Cum ol. lauri s't. unguent.

qd; usquehanti fortiora medicamina, ut elleborus albus,
 unguentum neapolitanum et arsenicum ad rarietates —
 creanda caloula, et p'ian p'ia in administratione horum
 remediorum urget periculum, atq; tenendi Locum, et ex
 intensior oriatu saluatio, saltem in p'stantibus leu. et, et
 grauiore, alio ab usu ellebori et arsenici existeret turba,
 et exludentiora discrimina praecon. Coniungunt. —

Cap. xvi. pag. 69.

Curtas
 Delumbriis

ad generalia hujus a mibi Therapiae Competunt

Statim antihelmentica dictata vermes enervat, preparata
varia menurialia, & adimplendas res indicantes, munda
sunt purgata sthomachica, ut iam interfecta talia exornant,
novaq; arseati progenis.

Præterea si opus attingunt, abynth. abrotan. Ledræ. marub.
fel terre, rosi. lamen. Cont. Corallia & lumbicis restinendi,
presentaneum tpe Commendati remedium, imo et Cicuta
Fraxi jam in pulverem reductam in orientalis ausis, —
publice venturæ lamen. parisi. antonium & levioris &
efficacia, posteriora vobis obtineant per gna alibet, ut theur.
diagrid. jalap. lami. & præstatem mercurio, a thyp. minasale,
aq. mercurialis: Semum admodum de media, ut sthomachica
& verminum generatio occurrunt, qualia st. Theriac. decoct.
Centaur. min. scord. abynth. alois. Cum Croco et myrrha.
Cortex peruvianus quo nullus præstantior. hæc æm. tæ. st.
rigorenda sequenti ordine. —

℞ aq. Card. Oened. ℥iij. Sem. Cont. in pulv.
tenuissim. redact. p. ii. Confect. de abynth. &
altherm. ℥ss. sal. abynth. et pulv. vipæ. @.
℥ss. Succ. limon. ℥i. aq. naph. ℥ss. ff. pro po.
2. Do. partitis viis exhibenda. —

Cremata deis variis injicienda ꝑ, & parari poss. Cum
duoet. plantar. emollient. additis ol. olivar. & melle, & vin
passulis et piumb. quo parato Alabrandæ D. quædam purgare.

℞. lami. munda ℥i. rh. Contar. ℥ss. Summit.
abynth. et Centaur. min. @. p. i. Sem. Cont.
p. ii. Coq. in aq. ff. i. q. v. decoct. chior. deis
dissolv. man. Colat. ℥j. —

multitudine jungei parant dysenter, pingues et dulciores,
q^{ue} alluciant, et quasi ludificanti vermes, verum in
p^{ro}betis Lumbicis, et Competant lacmata si morbi fuerint,
adcoq^{ue} Confugiendum ad opolun squentes si repletio p^{ro}it
infans, v^{el} ad pulverem sub, quenti forma si junior fuerit.

℞. aquil. g^{ra}ss. q^{ue} x. digris q^{ue} w. Cap. Luss
panatell. Cochlear. aut opol. ff. Cum hys de
abynt^h. sumond. altorini d^{ist}il, in heptomoda
q^{ue} elapsis purgat, ita in celebrabit, et quent
infans. aut Decoct. —

℞. Kiz. Kiz. in altol redact. ℥ii. th. Contur. ℥i.
Sera. Cont. p^{ro} ii. summit. abynt^h. et Centaur.
min. @ p^{ro} i. Infund p^{ro} hor. i. in aq. Saporit^{is}
℥viii. Inveti ad usum.

et imperanda et aqua resuscitalli, et parati Cum resuscit
in xodulo superno, Ouge aliquot haustus in d^{ist}il p^{ro} aliquot
heptomoda lumbet infans, itaq^{ue} Soluta vermium generosa
p^{ro}pararet, et si febris supervenerit, aliaq^{ue} jam relata
d^{ist}il homata Cum vermibus latentibus in venticulo et
Intestinis Conjungendo, premissa v^{el} s, et parati manu
ad eundem fluidor. organo, et impediend^{um} graviores
metasthasin ad cerebrum pulmones, et q^{ue}libet aliud notabilis
viscus, ad Cathartico-emetica p^{ro}paranda foret, Cum c^{on}
Cautio ut meritis p^{ro} decota varia amara, et
respartinis Rois, aut in decura hancuasi, in lopia varia
eundem scopum attingentia p^{ro}parant.

Demum peculiaris quasi p^{ro} Divan^{is} t^{ype} vermium
instruit medicaminum f^{er}ago; sic ad t^{er}etes exciandos
abynt^hum, ad Lato, filix, et nucis juglanda, largius

assumpta, ad anasarca, deest. i. e. et arist. loch. sub titulo -
 Specificior. Commentanti, d. nullum efficacius novum
 mensuris atq; ignis preparatis, sennâ sicut et cortice
 peruviano, ad succurrendum insensibilitati ventriculi, et
 Congestiori praeos. succor. oxidum, lunatula et -
 exclusivam promovere et aulesant. —

Cap. xvii. pag. 76.

Curae

De ventris et hypochondrior.
 inflatone. —

Cap. xviii. pag. 76

Necessario e potissimum in hoc affectu distalconvulsion,
 et aliqd infantia libo substituentium ad obtinendum
 facilem medicamentum o. usuparidat it. succorum, ut
 purgatum Rhomachicor. et aperientium, a succor. e -
 exhibita, ois indicat. implent, purgantib; atq; statim
 insistentium, o. oleum ad expurgandam lachochiliam,
 verum etiam ad parandum reliquis medicamentis aditum.
 adeoq;

℞. Cann. mund. ℥i. rh. Centur. 3℔. pululat.
 flor. garicor. ʒ. ii. Coq. in aq. font. 3℔ii.
 pululat. et agress. dissolv. man. Calabr. 3℔.
 — 3℔. b. f. pro. —

℞. q. expedit ab ea aliquot gr. tart. stibiat. o. gutt. iij.
 globet. ad evacuand. tutius laburum ventriculi, o. hypoco.
 si alius jam laboriosior foret; deis imperanda e. atq; ana.
 cum insiduo. ℞. pro potu ordinario, et accedendum ad
 iuscula squentia — —

dieb, et renovari etiam oporata i pulvis aperies, ad
debellandam eam fortiter mbum, aliq, nullas, alu
peranda, et potissimum insistendum e quenti altizans.

2. f. r. rubiginos. frustul. th. Contas. et in not.

Suspens. 3℔ Cinnamom. incis. et in cod.

notul. supens. 3 i. infund. frigid. 12 aq. f. 14.

§. ptizax. pro potu ordinario.

hunc ultimum remedium adeo efficax expecto, ut
plures solo hujusce subsidio infantes, ventris intumescen-
tiam tantum laborantes, et quasi deperditos sanaverim.

— Tandem Lepidus in praxi observari quod puri de Lale
Contaminati, febris Lenta, marasmus, et Functio
exiccationem (si ab omni exuperis) simul gaudens fames
quasi Caninam exagitant, in quo casu praemis. levioribus
Uthomachicis, ut sy. de chior. an Babynth. ad 3i. Cum
sh. pulv. gr. xii. D. Conserv. enult. Campen. Kinorod. —
Cum h. Bal. sh. ad Lacticiis hys ad Sacrum anchoram
Confugiendum, imo et si infans junior fuerit, novaq.
mammas hys o. rousat, nutritio bene Constituta
Concedenda e. — —

Cap. xlviii. pag. 43.

Curacao

De l'oubli, de la mort, de la vie

Varia Convulsio aut motuum Convulsivorum. Cuius -
diversum Causarum Sensus indicat, et penitus credit
fieri Convulsio a Igure ramos Carotico et vas cerebri -
proximiora regente, diversam Saxe exigit Therapiam
câ quâ oriundam duciamus et pravi, tunc Convulsio -

modum in pueris, imo paucioris e tractandi methodus
ad rebellandam Convulsionem a pueris a vulnere Capitis,
Depressio Crani, effusio liquoris super meningem aut
Substantiam Cerebri, & potius respicit Disturbantia interna
Capitis, adeoque Causam illam Causae Communioris Convulsionum
et motuum Convulsivorum in pueris, prosequemur.

haec aem solet suboriri in pueris contra ad haec aequam
Corruptura, cruditates, Tumor viarum, Iguini suggesta, aut
vermes in intestinis latitantes, in quo lam statim
prescripta in 1. convulsiva, statim parabitur, quoniam inema.

℞ Decoct. fol. malv. violar. et prunet. ℞i. -
Dissolve Cathol. ℞i. to ℞vi. vel natron. cochl. i.

recepto elapsa et exsiccato Rodio quodam tempore, placiditate
non par. sequens

℞ fol. lenn. ℞i. s. sal. veget. ℞i. summit.
abynth. mix. ℞i. Coq. vit. in aq. s. ℞vi. -
in colat. Dissolve marm. Calabr. ℞i. add. tart.
Nihilat. qv. iii. to typ. florent. gutt. x. -

Cervix si plene extinctum foret Cerebri Levitium, atq;
inquietas metus suffocatio, vinum ematicum in parandum
foret ad ℞iii. to ℞s. Cujus efficacia praevidenda foret ad
refocillandas vias, prosequenti.

℞ aq. scabior. et proutul. q. ℞iii. Dissolve Theriac.
viper. et Confect. albam. q. ℞s. pulv. vng.
qv. x. aq. naph. Cochlear. i. q. to ad miscenti
pulv. Contra vermes.

Si in eo renovanda foret et una aut altera elapsa die tota
proq. jam superius relata, q. to per actis Conjugiendum ad
sequentia Stomachica. -

℞. Kiv. Kiv. pulvis. ℞i. 5. ℞. ℞. ℞. pulvis.
 qv. x. ℞. ℞. ℞. Composit. ℞i. Cap. altera
 heb. 3. heptomedan. —

℞. ii. Contra' succedant Convulsio aut motu Convulsio,
 c. ac. Causis, fabricis putridar. et malignar. Eruptioni variolar.
 exasperatione liquidor. missis auxiliis, q. ja. historiam novae
 affectionis exponamus, in istis dicitur a. ℞. 5. a. jugulo et talon
 q. ut vultus aut dicitur promovenda e, Contra' dicitur
 Cerebri, sicut et refrigerantibus et hygnosis, sub. quenti formula.

℞. Sem. frigid. mund. ℞ii. Contund. ja. mottor.
 marmor. Sim. affundend. aq. f. q. s. Calor.
 et add. ℞. papav. alb. ℞iv. — vel.

℞. aq. portulac. et lilior. @. ℞i. ℞. ℞. de
 nymph. ℞. ℞. papav. alb. ℞ii. Cap.
 vesperis, horis. —

Cremata quoq. laxantia viximus. Competunt ad
 minuendum Cerebri organum, et q. an. dicitur refrigerantia,
 et facit q. in bacillis e. hanc libidinem cum puri tunc
 potius et talem assumere requirunt, quali' dicitur ad
 laxanda vascula et diluenda humorum massam
 tunc em. de. simplex aqua q. o. pharmaco, Cap. —
 gravissimi oris, et dicitur exhibeat. —

℞. tamarind. ping. ℞ii. Coq. ja. aq. font. ℞v.
 dicitur p. fund. Calid. fol. fol. orient. ℞i. pul.
 Contra' vasa, ℞ii. de. Colat. de. ro. man.
 Calabr. ℞i. ℞. de. chior. Composit. ℞. ℞. p. o.

poterunt in decum p. prescrib. formula. et an. refrigerantia
 p. recepta. Confecta cum. pul. fol. chior. lactuc. et capill.
 vasa. et hanc mund. et origa. Cochlear. i. —

Curas

Cura
De epilepsia.

Præcavimus utque Cæsar attentius ad Felices Therapiam
demonstravit notis, Cæsar quædam exigit epilepsia, Cæsar curandi
Cognitio viam ad curam parat, adeoque, si ostendunt opera ad
curam indagandam, plures autem, præsertim ad epilepsiam
Constituentem tum in adultis tum in pueris, Præsertim cum
sæpe præstiterit Junioribus curis invadere solet tractandam
Insuper, idem Therapiam memorata et atque accommodata
proponemus, duo autem præcipua effluunt, præcipua mi-
nimis tunc et extra præcipua: in 1^o Cæsar, statim
avertenda est hæmorrhagia Cæcæ, v. s. revulsiva, aut distalis
Convulsio nimis et motus Convulsivus derivatoria, aut
evacuatoria simplicia, deinde tollenda alia et frequentia per
pueris solent et late putrescenti et corrupto, et gravi
Pueris fluidor. mola præstiterit aut ibi sequenti remediis.
apparatu.

℞. vin. emet. ℥ii. 5 ℥iii. Cap. Cum cochlear.
juv. cul. add. stillula Confus. de hyacinth.
vel

℞. aq. naph. Coch. ii. 5 ℥iii. solv. test. stibiat.
gr. iv. Confus. albero. ℥ss. Cap. statim.

Invincibilis actio emetici aqua tepida largius excolata, si
illud vomitum aut catharsis non moveat paranda sit repetitio
fæd.

℞. sol. orient. ℥ss. loq. levit. In aq. fort. ℥v.
vin. solv. man. ℥ss. divid. in 2 dos.
i^a add. test. stibiat gr. ii. et una aut
altera elapsa hora, altera elapsa -

hæc aem sufficientem evacuationem vulgo promovent, quæ-
 adhuc rita si fuerint, onera cum cathartico pro ore, et
 et iura brevi infusio hæc. Inici potest, dein vobis ad an-
 guo concedenda quis, et si vermes exierint, persistant.
 Neutis amaris et antientis, et item supra promissum,
 renovata adhuc in fine mibi purgare simplicium cum senia
 rh. et matre. —

Interdum accidit ut iam finito paroxismo, instet
 novus, qui medium sollicitum tenet, et a viâ aberrare
 quædamtenus indicat; et si permittat ea peregrina, quippe
 vagis repetenda, aut saltem alterum tentandum, et ad
 immixtum discutendum periculum, ut nunc epilepsia
 antea est exitum variat, et multos in quo cum iam
 promissis a statuimus, sudorifica et volatilia prescribenda
 et subsequenti formula. —

℞. aq. rubic. ℥ij. loh. Constat. altham. Si pulv.
 viper. gr. xij. Cap. —

Statim imo postea insula si nulla calor, et soluta
 fluidor. Coagulatione appareant indicia pulv. viper. ad gr. vi.
 exhibenda.

Hic aem auxiliis tendit ad repulsionem humor. massa, et
 quæ portiones erumpunt pustula et elevatis, eadem periti
 dismutis nubis epilepsia et Cerebrum liberat: et hæc aem
 paroxysmus, abagatis et remediis, et anda et opera, ut
 novus procurat, et avellat Cæa et ipsam fovet aut
 avelat. Hæc sola obtinet Dieta Communis, fuga paroxi et
 ad mathematicum, et quippe par. insensu, ingluvi, matris et
 somnibus coarctum in hunc modum incedunt, adeo ut —

plures, nisi' ullo remedio, sanari non regimur, et tunc tunc si
Curatio felicius. imo si morbus ex iam relictis causis solvatur,
medicamina potius morbum laxarent quam solvant, hinc prudens
est si medicum in tractanda epilepsia parum neque, eis prescribenda
operari aut probare, epilepsia, a iam adultis, considerari, alibi —
Quadamur.

Cap. xx. pag. 99.

Curatio
epilepsiae

Cognita semel causa a qua stabis morbus, et providere, id est dirigenda
a Curatio, scopus, ut minuatur, et auferatur, solutaque actio musculorum
oculos moventium restituantur, adeo ut si primo aut mox
Convulsivis morbus solvatur, eadem prescribenda remedia a
jam retulimus cum de epilepsia: ca. tunc cautius ut magis —
juris est ut ita incidentibus et agentibus, et cum. Iamque malum
illud ex proinde consuetudine et ingratitudine nutriendi, invasit,
eam praesertim thesaurum propter.

et statim tunc nullis aliis promissis remediis, nec aliquando
Lappam facis ostendit, ac foramen oculi apponitur ipsa visum,
ut infans in partem oppositam, in qua et pupilla et oculi —
propter naturam vergunt oculos, dirigere cogit, et ut Commodius
exequatur ex Laminam ferream vel argentam Canaliculis inter se infundit
ubi foramenti, et foraminibus illis, in lappam assumant, ut per eam
aspectus dirigat, et Laminam partem oppositam exponenda —
et, ut infans primo intus in lappam Congruentem, in Contrarium
oculos deflectat; quippe a solenne a parvo, versus fulgorem, aut
cetera vitia afflicta, ex oculis ipsi dirigat, hoc autem
memorato auxilio sapienter accipit ut oculus musculi oculi,
moventis, alibi dirigant, nam etiam humores aquei, et

Christallinus et vitreus, varias rite differentias Consequi-
point.

Cap. xxi. pag. 102.

Curas

De calculo vesicae urinariae
Et Urinae Incontinentia.

accommodanda a Therapēia etati passatis, in q̄s nascitur, —
et tūc mētū producentib: rīm et nimis p̄uā a cūlactatē,
et Op̄ian vitium in mētū arguit, tota p̄ mutacōe lactis
et etatis ip̄a ē reponenda, Cura ex p̄uā consuetudine —
Voboluit affectus, exhortatōe et mōis iustitanda, imō et
flagellū contēdēt in p̄uā, atq; aduēdus ut gūderis hōra
reuerēdisat, at vō' p̄uā nequāq̄m inuēp̄is p̄oit, et
adit nativā v̄ adventitiā p̄hinetis laxitas q̄a attētio et
p̄uā mīdēdē et, Sugatē longiorē somnō adq̄uentia cūdēdū.

℞. rh. Contus. ℞i. v̄ ℞i. flor. persicor. summit.
abrynth. et Contēdē. @ p̄i. Coq. in aq. f. ℞iis.

℞. Colat. Dissolv. mann. Calabr. ℞i. f. 200.

Clapsā unā aut altā die p̄scribēdū ē 1/2. de abrynth.
ad ℞i. q̄i potuit etiam Commisui Cura ℞i. recit. miscol.
Citri. et ad si laxitatem p̄hinetis. et Contēdē urinae —
incontinentiam nullatenus minuant, renovanda ē purges
et Confugiēdū ad gūlā ex Symplicem.

℞. Croc. mart. ap̄eriat. et bl. pulv. et @
gr. vi. v̄ viii. Cinnamom. et sal. abrynth.

@ gr. vi. f. pulv. pro unā die Continuat.

℞. 2. v̄ 3. ℞i. p̄uā exigit mōi p̄stinacia
et mōi et aqua in p̄stante Constitutio. —

Officē ē etiam mungara regiorē verica, ol. rhut. laur.

Scorpion. in pulveribus, variis, levissimatis, humectatis, abluentibus.
 & nullum efficacius commendari potest remedium huiusmodi,
 aqua. Theriacalis, quo Scorpionis rugulæ aut triplices viæ, plures
 eo modo tentatis, infantes feliciter sanaverunt. —

Cap. xxii. pag. 106. Cures

De hydrocephalo

Scopus obstat terasiori ætate, ut convenientia Libulari-
 troint medicamina, ad movendas aquas, & restituerendas
 Vasculos. 2. Forum, ab his etiam pueris Therapæia successos,
 & si pueri et docti infantis permiserint, variis utentur
 hydragogis et exsiccantibus, aut solum Theriacis, ut vesicatoriis,
 Cauteris, et Cautis Scapulis lotis; à melius et efficacius aquas
 revellere possunt, statim permittendus a victu quodammodo
 exsiccum, aut respuendum. Nec nimis aquosum, si puer
 es nutriti, accedendo deus ad purgationem sequentem. —

℞. Sol. lenis. ʒi. sem. anis. et Coriand. ʒi.
 ℞i. Coq. in aq. font. ʒi. deus solv. man.

℞i. ad. 1. q. 101. ʒi. ʒi. val. —

℞. succ. jreo. florant. ʒi. aq. g. infusion. ʒi.

Cap. val.

℞. pulv. de trib. ʒi. Cap. in panatella. —

Celebrata purgatio si Libula juncta aperienda exhibere
 infanti, & interim assumunt, quodq. vō reuertunt, sequentia
 convenient. —

℞. fistul. Carn. vervec. Coq. ʒi. hor. i. ʒi. in 1. q. 24.
 ℞. deus bulliat ʒi. hor. ʒi. sol. chican. et poliptrio.
 @. m. ʒi. Colet. et ʒi. Cochlear. juncul. dissolv. —
 flor. mart. gr. vi. pulv. millep. gr. viii. Cap. —

prout etiam reperiuntur Cunctis fluxionibus quod efficacia intendenda
Lunor. massari, et promovenda persensibilem transpirationem
quod si infans est modo conueniunt medicamenta Liquida ad solida
Conuergentia.

℞. aethyopi nires. gr. vi. jalap. pulv. gr. v. Cap.
Cum thillo Conserv. ros. et in pernatell. vel.
℞. jalap. et diugi. @ gr. iv. pulv. milleped. et
Cinnamom. @ gr. iv. Cap. alternis diebus per
rhodomodum et ad sapientiam luescit. —

℞. pulv. de gutt. gr. xii. th. pulv. gr. x. Cap.

Hae sunt etiam medicamenta interna et in proposito con-
sultari solent, si exasperari phlegmam pro potu ordinato, et
Constituunt cum thea et Linaturis fieri, quae libenter intra
infantis utuntur, et aequam negligenda et externa et
immediata sunt. Quodam discurrunt, atque resolvunt. —

℞. pulv. abryath. et lamaris. @. ℥iij. ff.
ad lyrem unguentum cum Rosariis portione
Cera. —

Cataplasmata alba imponi prout, ut Aeternum delecton.
emplastr. cum Harore Columb. et Cap. et Sacchar. salu.
et rhut. quo exteriores Capitis partesungi prout. Hae
tamen nunquam promptiores atque, tutiores successum obtinere
soler. Cautatis, vesicatoriis et ceteris circa veris partibus. Quod
Celebrari prout, et a mai. effectum promouent, quo per os
Latium magis immediate derivare prout, Hae autem diutius
Continuanda atque, ferenda sunt, donec iam assumpti, aquae
et Lymphatici moleculis, mutatio aetatis et visum
roboranti et vascula, et liquida magis exsiccant. —

Curas

De rachitide

rachitis soli vulgo nunc viris committenda est, pueri, solida
 accensio adeo firmata, visq. major ita propriis fluidis,
 ut obiles in vasculis, et prava in humoribus qualitates
 deleantur, et sapienter quoq. opitulandum Dieta ministerio et
 quorundam medicamentorum largiâ, quorum deflatus, nova
 continuus vires consequatur nobis, et irremediabilis foret, quo
 circa statim praescribenda est Dieta Communis cum libis
 Provi tui, et facilius in ventriculo dissolvendis, Dein de
 ventriculi tonis ventriculi et lingua vitium praesentia
 Corrigendum sequenti remediis. —

℞. Lenis. mund. ℥i. rh. Contus. ℥ss. loq. in
 duob. chior. ℥iv. dein dissolv. man. calabr.
 ℥i. ly. rachicor. Compot. ℥. b. q. pro. —

Celebratè purgare praescribenda est Odis aut tæja
 heptomada pillula sequenti. —

℞. ethyop. miseral gr. xii. v. aquil. alb. tæj.
 sublimat. gr. f. cum tilla consen. ros. v.
 chior. q. pillul. 2. aut 3. vel. —

puer Capiat Cura eschleari pueratella, interea Tibenda
 et incedenda a humoribus manâ, iusculis leviter aperientib.
 iam sapienter in tractu repetitis, qd. hinc inde vel
 opiato ejusdem generis, seu cum omni horum attingente,
 et peculiariter stomacho accommodato, prout visum
 abdominis aut ventriculi magis patuerit.

℞. Croc. mart. ap. r. h. pulv. @. gr. viii. ethyop.
miz. Sino igne parat. et Cinnamon. @. gr.
vi. jalap. gr. iv. ff. pulv. pro 1^o doz. sup. a lib.
junul. fol. chior. altwat. & unum aut alterum
Cyathum profusa. the. —

Pulvis iste in opiata mutabitur cum l. q. 1^o de albynth.
aut de chior. Compos. prout infans magis aridebit. —

Quod si ventriculus plurimum Labefactatus videatur,
et alimenta probe concoquere non potest, quoniam exhibebitur
opiata.

℞. Consen. emul. Campon. albynth. et —
Rizorod. @. ℥iii Coral. rub. ppi et oulor.
Caneror. fluviat. @. ℥i. ff. ethyop. min. q.
antihetic. pot. @. ℥i. ff. Cum l. q. 1^o de
de albynth. ff. opiat. ad usum supra laudat.

his eo ordine paratis, praescribendum est. Lac ravinum
Cum decocto sal. persill. ebulliatum, et continuandus
7^o 1^o die: imò si ventriculus rixè incommodo tolerare possit,
exhibendum est rachiticis pro alimentis, & gradaria et
Nucis, in a^o assumptione, ita ut matutinis horis, Lactis —
vaccin. & ossis, & Oremorem oriza Cum eo paratum,
vesperinis horis deia elapso iterum quodam breviori —
intervallo, hanc prandis novis Lactis haustus exhibet,
& retrahendo alimentor. usum, quod p^oportet augere —
Lactis Copia, donec agrotans solè illi nutritivo deficiat &
reparet.

Cap. xxiv. pag. 117.

Curatio

De aphitis, vesiculis gingivar.
et inflammatione tonsillarum.

Indicationes Curatorie statim exigunt adstringentia in ipso
ad cavendum progressum pustular. mox abstergentia ulcusculor.
Pustulentis, lenioribus, scaroticis, exsiccantibus, etiam adjuvanda
interius remedia fluidiora et praesertim Lymphaticum —
Corrigentia, verum Longe diversa statuenda est Therapia
tum in infantibus, tum in adultis, cumque his potissimum
agatur in prioribus, in istis convenienter proponemus: statim
in Lactantibus Corrigendum est vitium Lactis, ad obviandum
fluidior. Diathesi ansam praebuit variis refrigerantibus —
aut Silicibus, aut mutanda matris, si vultula et perisoma
Interitus nutritivum infanti suppeditat; deinde vero attendend.
Est neam pustulor. dum paterna rubent, materale
adstringentia usurpanda ff. ut ppr. de ros. sinis, de
portulaca, de Succo granat. auctor. Citr. Collectionis
varia Cum Succo fumar. nostrae. aquat. v. Sacod. hord.
Cum mal. rosae. et aq. chesefol. v. rosar. plantag. Galanost.
Santal. v. etiam vivo aceto Cum melle. Contra ros. si
livida nigrescentes aut flava extiterint, fortioribus —
disiunctis, insistendum, ut docetis variis aristoteli.
vinapervine. angelic. flor. Camosae. melilot. arist. et
Parnassae. Succo menth. inros. nostrat. et incoq. post
Cum docet. fol. myrtis vino rubr. adjuvatis quibus
lenioribus adstringentibus et mundantibus, ut ppr. myrtino
aut melle rosae. tandem urgente malo Confugiendum est

ad spiritum sulphuris, sal amoniacale, aliq. variam
 Scroptia, & nulli fieri infante, saltim diu aliventi -
 Solidi & resuranti, Rosumce medicamentorum apparatus
 perficere nequeant, et interis pro necessitate inis tendum
 & desumendi ex refrigerantibus, edulcorantibus, et lympho-
 vitium corrigentibus, Commendabat antiquitas, imo et in
 annulis vetularum commemorati, adhuc nullum de
 efficacia sanedum, praestitum in aphis quae ovum
 malignis et epidemicis, quae ramulam vivam ad nova
 ori quae, & suggendo malignitatem attrahat, quae sanet
 et mortua alie apponunt, atque ita in alie donec vivum
 de plantae extirpata fuerit, & utrum fadum illud -
 sanedum unquam successerit, merito dubitamus, atque
 sanior praxi exulare iubemus. — —

Remedia aera interna eo et processu ordine, ut
 statim appellati saburra ventriculi et intestina
 leviori, et vulgato Cathartico; dein de praeservanti juveni-
 luentia.

℞. Spiritus Car. vitul. v. pull. junior. centasat
 Coq. p. hor. 12. in l. q. aq. fl. dea add. Sol.
 chior. nastur. aquat. chesol. et fumar. q.
 p. fl. bull. p. hor. 1. Colet. et expr. matr. et
 sol. flor. mart. q. v. Coq. p. g. die. —

Finis juvenis praeservandum est Lac asinum abutiat.
 Cum ℞ii. succ. fumar. aut nastur. aquat. et Continuat. —
 p. plures die, p. augendo ipsius Copiam, donec pro vi alimento
 ipsi exhiberi possit, interrum imponendo ddi aut tti in
 sapromata, pillulas Confectas cum ethyop. mine. v. et
 satius est sumat aq. p. g. die. gutt. albos. cent. v. eligiunt —

dicti general laniette, interius o negligunt topica —
remedia, illinienti fauces aut interna oris, Curitas, melle
nuxbombei, rosaceo, anisotito, et pulvere flor. lamenel
et melilot.

Cap. xxv. pag. 121. *Curae*
variolar.

Universalem medicinam a oib. affectuum. lymphaticis
succurrere, simulq. exactissimum praetium, quae raram
ubiq. aberrantem queat reducere, exigit sane variolar.
Curae, licet etiam ita felici sorte processerit interdum
variolar. eruptis ut infantis per vias et platis —
obambulant, moem spernant, et ab eo fortunacius
emergant, interea ta gravioris complacent variola
proelli, tam infolici iactante luentis, et indito or
subitio et cura, medic in salutis fiducia sapient
ocumbant et extinguant infantis: neq. juvat, neq.
aut a Divinis pro variis Regionis commemorare Curandi
methodo, o sapient insigni egrotantur de Dimento —
usurpant, plures em ttam tem reponunt in
Cardiacis, volatilib, alexipharmacis qua vim Contagii
variolori repunt, et ipium Desustatem promoveri
queant, dum alii volatilib et spiritibus allegantes, Sole
clamant et impendunt refrigerata, qua inflammatio
remitur et avariam placare et Loxum point: T
utiq. adacto therapia Limite decidunt, neq. ulli o
altero Confidendum pharmaco, qd em Edop, vitant
piz in uno Cam profugavit, in altero fures accelerat.
nec varianda cura, o solum pro Divinis satis faciendi —

Indicationibus, verum etiam pro dissimili varicellarum periodo,
 quoniam sursum in sequentibus persequemur, subsidia debet, sedulo
 tractum affectum emendando ad occurrendum symptomatibus
 toto morbi decursu subrogatis. id varicellae praesentibus symptomatibus
 dicta tenuior agrotanti praescribitur, Simulq; Cubiculo -
 moderatius clauso detinenda, atq; plures sequentibus coarctatis,
 paucioribus rempore ostata, hyemali vero praeterea Cassioribus,
 et in hoc antiquo methodum damus, & Cubiculum
 sequentibus et Calentibus prunis ita accendebant, ut plures
 mortifica Cautio agrotantes omnibus rebus eximerent, et nim
 aucto impensius praecalore, Quous motu, organo, et itaq;
 volatilibus et feris de coarctatis, ex toto impetibus depetere,
 fluidaq; ad interna viscera ruunt, quae funestam metastasin
 excitare solent, & ex alia parte in rariorem nimiam frigoris damus,
 quod intempestiva Luti Constrictione et majori fluidorum densitate,
 egredientis Contagii varicellae molecule retineat, et in
 hospitio funestius coarctat, atq; ita frigidiore et Calidiori
 inueniendum, et ad eum pro industria reducenda et tenorem,
 ut temperatur evanescat ad est insuper et minori momenti
 placidum, quod albis in vulgus dimittant, Conservatio reaze
 columendum in taminum, adhi adstricti et edocinet lavis -
 ad fortiori et rariorem pondere ad infantem et puerulentis totis,
 et ferens Luto eximendis, nuntiatum in vitis poit.
 licet restant illam Consuetudinem, vario notatam in more
 ut divinis ubi duntaxat, in pte, Cicatris et pte, febrem
 putridam et malignam indicare et praemovere
 Culas similis, quorum in Luta taminum mutatio Luto afficit
 et agrotanti insensientium nuntiat. Luti Commendari potest -
 in ita ad tum varicellae apparatus Digressio, statim et
 attendendum ad modum quo ingruat et Delectat affectu, et
 et nimis febri sit intemper, et Calore maximo, Cuius nuntiate,

Stipiti, oculi. Secunda e vena. Quod obrepuerint muliercula
 Contra memoratam auriculam seu tubiculum pleno ore vacante,
 jmo repetenda in malleolo, si statim in affectu operum, aut
 Convulsiones imminerant atq; jam prodierint, quo parato iuvante
 e Communis elytræ, et Orari post paratida liquem pro purgati.

℞. fol. orient. ℥i. summit. abynth. et pulv. —

Cont. verm. @. ℥i. Cap. levit. ℞. aq. font. ℥iv. —

dein dissolv. man. Calab. ℥i. Cap. —

efficacia atq; potius purgati, dum adest suppuris cachectici,
 rari vna. Puranda e gr. m. tart. stibiat. ʒ. gutt. vi. ℞. globet.
 Imo statim accidit, ut e Lavin. elixirum in infantib; pro
 odio atq; successe exhibere o. liceat, in quo Cam. repentina
 et q. aut ℥. gr. tart. stibiat. solub. ℞. aqua simplis, in qua
 nequaquam respuat, et affatim epotat, inde, parvi tui auxilii
 obstantes sollicita eliminant: intus e depuratum meditat,
 maa, Cui forte nunc succurrit, levissib; Cardiacis et redolentib;.

℞. aq. Card. Bened. et portulac. @. ℥ii. Cergat.

de nyctanth. ℥i. pulv. sigar. ℥ss. antimon —

diaphoret. ℥i. aq. naph. coctile. ii. ℞. p. o.

Cochlearia humida. —

Communis tamen est e prescribere e una aut gemina
 nre p. in die exhibere. Consect. alkam. ℥ss. cum aq. naph —
 e labor. splat. e pulv. sigar. ℞. coctile. juncul. ad gr.
 vi. ℞. ℥ii. pro varia etate atq; remissione Caloris, e Continuanda
 et donec variolæ genitis erupant, qd. tunc p. in infusum
 ductis Calor vehementis, tussis, agriphonia, aliq; hujusce
 generis, qd. refrigerantib; ut stizana, Lemnib; hoid. et
 Luvionib; hypnoticis seu narcoticis: e portula Plisalephas
 maca clamat, et digon. supentis Dioscalis. Conedit ad —
 Pusillades Contagis viros, e Sapiu. intola abidem Calorem et
 Catalem Brandimentiam scitit. —

at vō si imminente variola. angustia, pulsus tō incelsuit, iudicium
potius remittendi, vix admodum tractari, ac reliquias frangit
veniat, aliq. urgeant angustia, cum facies pallor, et extremi
refrigeratio a diutius, igitur missio cauti abstinendum, et
ad cautiorem tunc dum vō cum emetis et gurgulis, commissa
proparatur.

℞. aq. rabios. et Card. Bened. @. ℥ij. ꝑ. qd. dissolv.
albern. et hyacinth. @. ℥i. pulv. viger. ℥. ss. lora
turis ℥. ss. v. ℥i. Cap. partita 3ori diu otium -
addenda sunt gutta aliquot Liliæ pancosbi si
ex eo extrema tidentur sit -

Chiliditā pōe restituit in paulipā virib. et victo quadrantenis -
Cruoris Coagulo, expurganda et māt. Liquida Demantes pōore
tquenti. -

℞. Sol. Penn. ℥. ss. Sal. veget. ℥i. Coq. levit. ꝑ. aq.
Font. ℥vi. ꝑ. Colat. Dissolv. manna. Calabr. ℥ii.
℞. pōo pōo 2. 3ori. add. it. tart. Stibiat. solub. gr.
iv. v. -

quod si pueri agrotans in ultimo veniente discrimine, ex ac
deliquit, extremam refrigeratio, Simulq. ventricul. anxietas,
spōns, paranda foret pōo.

℞. aq. Drugloss. et rabios. @. ℥. ss. ꝑ. qd. Dissolv.
Confect. albern. et hyacinth. @. ℥i. v. ℥. ss. ad
vix. enst. ℥. ss. v. ℥vi. pro variā etate et
tū violentia. -

In vitis pōiq. remediis, si inflammata tō oleum sint, -
Conuulsio, paruerunt, et nondum variola inguerint, tō
potius pustula. lōda, purpurata, exantemata varia, sicut
summuu imminuat periculum, tō tū omnia de restanda,
tō Longius elat. vixas intra vallum adultima tentanda,
quapropter tō pōoem gurgentem suat rescribere, v. pōna
ad ultiora pōa. Succorū Cumulum eliminandum, prout

209
Morris emetici et Cathartici actio, tonace, et injectas, maa
afficiunt aut levius, & superiores & inferiores remittunt. Deinde
Vols. Confundendum Coriaca, & si nullus maximus moliant, et
exoptiven & promoveant, Condamatione & De apotester —

2o Si in Tura prævalent varicelæ: Stadium, et inquit suppura-
tionis, si varicelæ Lygta in die, invenerant, et ea remittantur —
Lymphaticæ, soli nunc commendandum opus, cû te cautela ut
agat o pluvio celsa, neq, ulla interveniat interpositiva aeri —
frigidi expulsi o superata, tunc tuto Comitassent: verum
si febri perverset aut infandati, anxietatis, vigiliæ et molatiori
viti premati aga, ad sequentia progredieris. —

4. *orig. Lanta Cochlear. i. v. 11. Sull. Fr. hor. $\frac{1}{4}$ in eq. f.*
Eq. Cap. pro p. m. ordinato. -

Secunda incipit quæst. elytra. -

P. Decort. communis. clustes. valviger. et laxior. t^o. p. ol.
olivaceo. ciliat. i. nati nascent. Zipp. f. cluste et
Laxanda intestinalis Lott. g. *Gibula intestinalis* —
Levis aggregata.

verpetimus aem huius caratis pulchri. v. emulio ringer. —

2^a. aq. lactus. et videtur. @. ℥i. ℞. Gr. Capill. ver.
et papav. alb. @. ℥iii. aq. naph. cochl. i. Dosis
cum nardostich. angelicis, imo et laudan. —
prescribitur, Dysurioni Dosis. —

Qc. 40^a 1^{er} mar. mard. 3ii. Contend. 12 morkar.
marmor. 2im affundent aq. font. v. jtzand.
Supra' p^rscript. 2im Colet. ad. 1^{re} danyazh.
3^o h. cap.

has aem. mediamina totius inter. esse sequuntur —
metastasis in cerebro imminente, aut fluoris citra.

Sufficienti Compressura, & a ligatis natâ et indole, & aliâ Cautâ
 ex candentibus florente procuravit, in quo cum vena
 inaudita p[er] tale, invito suppuratione p[er] aludis, imo et parva
 p[er] purgationem qualem supra p[ro]ximè, t[em]p[or]e diluentibus et
 refrigerantibus, insistendo, & et aliâ t[em]p[or]is in hunc variolâ.
 Hæc diuina supervenient symptomata quippe eruptis varioli
 cum fallaci simpthomatibus remissionis, tumores subito Depressant,
 et quasi evanescent, franguntur viva, rubu debili et languen
 Deprehendit, facies pallor, arget Delictum obscurum, & affectu
 Copiosius, Convulsio aut motus Convulsivi, aliq[ue] instantanea
 defatigatio pericula. Cum æm ex pravis succis p[er] gustum
 Coagulationib[us] nec t[em]p[or]e Depressant, p[er]scriptâ p[ri]mâ p[er]turbatâ
 indulgenti evacuatione superata, visum sicut evanuit, hæc morâ
 utentur Cathartico Emetico. —

℞. Sem. mund. ℥ii. sem. Corde ℥i. hummit abynth.
 et Centaur. min. (a. ℥i. Coq. in aq. font. ℥viii. —
 f. colat. Et ex press. di. r[ati]o. mann. Colubr. ℥ii.
 f. p[ro] p[ro] 2. Doz. i. & add. vin. emet. ℥vi. Coq.
 Hæc Tam et facto sufficienti intervallo alteram
 Emet nisi t[em]p[or]e voto cedant in p[ri]ori Catartico,
 emetici actio. —

attendendum q[uo]d ad atalem & vires agrotantem, in in
 Adulto, Doz. purgationem et emetici augenda foret, Celebratâ
 sem purgatione, si pustulae t[em]p[or]e increscant, et Simp[th]omata
 ingravescant, Cum indicium sit pravas man[us], fluidor[um]
 massam altius p[er]turbare, quas attigere aqueaq[ue] p[er]t[ur]b[ati]o
 purgati[on]e et emetico, ut necesse t[em]p[or]e creda fiduciam in p[er]turbatâ
 Cardiacâ et Pediculis.

℞. aq. rabior. et naph. (a. ℥ii. Coq. alt[er]m. —
 ℥i. f.

℞. ℞. sal. vipers. ℞. antimon. diaphor. ℞. lili. paracels.
 gutt. lxx. Cap. alternis vicib. —

℞. si nullam hinc fortis Cardiacam, hoc, mox et secundentiam,
 atq. vitalem Calorem, & redintegraret, impendentes Atali minā
 sic lili. paracelsi. Cum Cochleis. vis. utendum foret, quo ingratos
 ag. stantes, et mortis imagine proclutos, & semel exuritate nobis
 Configit —

Et andemut nihil intactum obelinquamus, Sica' inq. hostia
 et eventus, Cum Baphen variola. Concomitantia, Dienteriam,
 aut Diarrheam bilivam, lymphaticam persequens, & Capitis
 caemorate predeunt typho, eaq. magis reformidanda, quo
 nulla foras crudeliora hinc sint, lymphatica, atq. Sica' p. t.
 vis. utendum foret, quo ingratos, et mortis imagine proclutos,
 Interca plura anno proximo elapso, hinc remedium, in
 urget Dienteria, Cum Calore maximo et abdominis tuncise,
 & Sica' Capitis Coniungunt, Cum Dienteria & Colicā peric.
 modo Competuat Carora Diluentia, ut aq. pull. Lemon. orig.
 aneth. Coctoz, Cum Syr. pepar. alb. juncta, int. ad rem. Et
 usurpanda resiliura Cardiacā Cum narcotici, & panionidoi
 Libiditi. —

℞. Coctoz. albam. aut hyacinth. ℞. Laud. liquid.
 gutt. v. Cap. statim, dein donec et Sica' astat p.
 in Die Laud. liquid. ad eandem Sica' int. —
 Grandis. interval. Cum aq. naph. Cochleis i. addad.
 Hill. et amigd. Dole. v. Syr. de ag. naph. aut Capill.
 vna. —

℞. ℞. 2. 5. Sica' Continuada et, et ad juvandum Corundem
 effectum, infusum simplex Hic. Hic. Et intervalle ad rem
 scholastic, aut Diarrheā facient. id. ℞. ℞. ℞. v. v. v. v. v.
 hinc remedium, in urget Dienteria, Cum Calore maximo et abdominis tuncise,
 & Sica' Capitis Coniungunt, Cum Dienteria & Colicā peric.
 modo Competuat Carora Diluentia, ut aq. pull. Lemon. orig.
 aneth. Coctoz, Cum Syr. pepar. alb. juncta, int. ad rem. Et
 usurpanda resiliura Cardiacā Cum narcotici, & panionidoi
 Libiditi. —

212
Flatib. et Orob. rigm. p. intestina divagantib., sequenti
modo stentis in purgandis, ager.

℞. mann. Calabr. ℥i. ̄ ℥i. ss. syr. ros. pallid. ℥ii
̄ ℥iij. vel

℞. rh. Contur. ℥ss. Coq. in Decoct. chior. ℥iij. add.
aq. novem infusion. ℥ii. v. d.

℞. aq. g. infusion. ℥ii. syr. Cydon. ℥i. Cap.

mi un. lare et otum in hoc variolae. Status profuerit —
foliisq; o. f. p. u. l. o. n. a. t. i. s. s. y. r. o. s. p. a. l. l. i. d. Cuius, solo mēdis
plures, apertante, anno proximo elapso Cum d. h. p. e. s. i. m. o
Versi, Curavire odon. f. a. c. t. p. o. r. e. a. u. t. p. a. u. l. i. a. n. t. e. q. n. o. s.
mutular. numero, palpabra superior nimis tumida et infusa
mata oculum degit, et effluxus mūdo parulenta ita inhibet,
ut intus coarctata, membranae et interiorum oculi textum
rodant, q. b. fistula sanguisabilis, Continui oculor. Solus,
reformat, et molatior lypitudo, macula varia, Catharata
in darcha nervor. extior. aliaq; huius a generis frequent
ludovici, quo lina iuvit in infantibus. damorib; tōi
quarta agnenda it p. Arter. q. n. l. u. m. i. n. a, q. d. facile cognovi
si sequenti infusione Cobrin. Miniat. —

℞. Coc. orient. p. i. infusion. 12 aq. ros. extract. et
pluma aut levis panner. hanc infusionem induant
ad fovendum et lubrificandum oculum, T. p. t. i. m. i. n. a
attende ad divisionem palprobr. hoc solo em
artificio proximi ut Corruptio globi oculi. Si pariter Capitis
C. u. p. p. u. s. a. o. f. a. u. c. i. s. o. b. i. d. e. a. t. et Continuum proceat tūm,
leniendi it. h. a. c. c. e. s. s. i. m. u. l. i. et p. r. o. m. o. v. e. n. d. a. i. n. t. o. r. u. m.
expectatio — — —

℞. flor. malv. et violar. ʒ. p. i. gliv. it. ras. ℥i. -
 jolund. ʒ. i. ʒ. aq. ʒ. vent. hor. ℥i. i. Colet et
 ʒ. p. i. m. add. ʒ. violar. ℥i. ʒ. loz. vel.

℞. mucilag. pyll. et Cydon. Cum aq. ros. extract. ℥i. i. ad.
 ʒ. flor. pod. cat. ℥i. ʒ. -

3^o ut plurimum effundunt suppurant, vivi, ita, pueri, tumida
 Atque detumescunt, pustulae breves induranti, et crustis
 nigricantibus odori incipiunt, atque remissis lymphaticis, -
 modo benigna fiunt variola, redit somnus, appetitus, et ad
 omnes functiones alacritas, si exapin molestiam puritatem quo
 continuo fatigante agat, videri si numerosiora et repleta
 nimis extiterint Suppuratio Coarctacula succedere solet
 fletor insignis, vigiliae, anxietate febris atque portioe max
 purulenta, si serum venis et arteriis inveniente adhuc,
 interis repube, corporis ad Cerebrum, Tracheam, pulmones, -
 Intestina, Hepat, vult et illabiles, unde phlegma, variae
 et pueri, ictus multiplex, dysenteria, varii tumores, et ulcera.
 Rubra in diversis partibus et deinde brevis Conjunctio
 Cum febre hectica et marasmo, aq. solis Lacticiis felida
 debellari solet, adeoque prescripto leniori purgante sub sequentis
 formula.

℞. pulz. Carr. ℥i. i. ʒ. p. i. mann. Calabr. ℥i. i. solv.
 ʒ. aq. Lilior. ℥i. ʒ. p. i. - vel.

℞. rh. Contus. ʒ. ʒ. Coq. ʒ. Decoct. Chicor. ℥i. i. solv.
 mann. ℥i. ʒ. p. i. - vel.

℞. mann. Calabr. ʒ. ʒ. solv. ʒ. aq. font. ℥i. i. ad.
 ʒ. de Chicor. Compos. ℥i.

Celebrata purgatio, praeparandum est ad Lactiania, a

gradatim h. libenda it, in p. de spumata et ebulligata,
 Cum aq. p. libi decocti hordei, plantarum germentium,
 aut succi sumar. dein co. solum das jmo et pro o. alimento
 Concedendum: si nulla ventriculi molestia accessit: q. si —
 exulceratis intestinis, dejectiones sint purulenta, et graviores,
 Atipata terminib, enemata varia paranda et Cum decocto
 omazor. lacte, et vitelli, ovi, aliisq. subsequentib. formulis

q. Decoct. hor. et lact. varus. @. p. s. aequalis,
 ovi. vitell. 2. ii. — vel —

q. Decoct. omazor. v. Capill. veru. q. s. vel

q. mucilag. pyll. et Cydonior. in aq. ros. extract.

℥i. add. ol. amig. dulc. ℥iii. v. ℥iv. vel.

℥q. Decoct. hor. et Senicul. @. p. s. aequalis, tal
 habebunt. veru. ℥ii. et iniiciat. Clyster. —

Suppurate co. Rectus a Reente, nihil ultra molendum
 ut jam dictum fuit, d. simplicitate alterni Diet. alvus —
 laxanda Clystare Communi, Cum aq. font. et ol. simplici
 parato.

4^o adventante pustularum exicasse, atq. Crustis —
 quolibet die Decidentib, sicut o. absoluta moris, et pro
 voto succursu videant, Lapis a Ballaci substituta lenitate
 In se inlucorem impellunt, et plura adhuc. ligant
 praecavenda, sive em. liberiorum et frigidiorem auras —
 prematuris spirent agrotantes, sive ventriculum iam
 India fractum et debilitatum, Copioso et intempestivo —
 opprimant Cibo, nova ingruunt, neq. minus reformidanda,
 a graviora adhuc minitanti, quippe insensibili Cohibita
 Transpirat, et pravi succi in 1^o vis et Igura Cumulati,
 exarsanda suppressit, et plura in Sarcina in oculis, aurib,

aliiq., exteriorib; p'tib; determinat, cum ea aliq. p'te prava
mao, febrilen et humilium febrium Continuarum putredinem
et maligna? accedunt, adeoq. his Caut' vitatis, purgandis oga-
squenti Cathartico. —

℞. Lin. mund. ℥i. Flor. pericor. et Corianor. @ p. i.

Coq. levit. in aq. font. et melolat. Viride manu. —

℞i. v. ℞ii. pro diversa etate, add. m. de chior.

Compos. ℞i. ℥. xoo. vel.

℞. rh. Contus. ℥i. ℥. Coq. in aq. font. ℞iv. v. —

dein solv. manu. Calabr. ℞i. ℥. v. it. Coq. —

Quo parato, tuto' parata e ventriculo ad Albo, Oroni-
succi, utraq; superant in variis li. Conditiis, Aetivum sempe'
difformitas, qm' tadulo' vitare, tum antiqui, et nostri temporib;
pro singulari de vultu amore, atq; in Conservanda venustate,
e p'p'q. proestitit in quattu' Curarum. Sicut ta. diversa ad auct,
finem atq; metam tentata methodus: etenim Solenne erat
in vetusta et nobiliori progenie, pustulas acu aures perforare,
Natum atq; Suppurat' inieperat, eo Consilio, ut per nequaquam
moram habere, profundos Cicatrices relinquere o' p'cet, —
verum novam Cautivam evidenter Comp'ovit experientia,
Solamq. operam et attentionem ad perimam, quia naam —
procurandam, et Purgandum nimium Cardiacor. et redolent.
usum, o' frequent' maam juvenlentem accendunt, et —
acriorum nimis efficiunt, Sicut finit' et fere Consumpta —
Suppurat' obesa et Odalgica varia interdum exstendunt,
ad Lubrificandam Stannam litem, et minuendas Cicatrices
arcan, insuper et Cato Cars in q'ib; Sanandas, v. apariandas,
pustulas foliites ingravamus, cum sempe ea Latius adeo,

Alig. ad Coesentes, tenaciori crusta obducimus, & effluxum
māe puerulentae doregant, ejusdemq; varis inferiora altius
dirigit.

Observatio prima

Jaunera fuit prodigiosa lues variolae. exempla, & p. 18
annor. Ipatium popularis mibi devotus mihi vitulit,
Commemorare poen, & duo tūc Seligener & Fortunatus
magis vices prius descript, adultum 30. anno natum,
athletici temperamentis, et roboris quasi inextinguibili, qui anno
1730 venis sine autumnis, et jam incipientem odruinam,
variolis tunc temporis grassantibus conceptis fuit, acutus etiam
in praesidio mibi haserat, atq; fervorem summum et febrem
ardentem hieperat variolae eruptis. Dein inuita vis, in
torachio et tale, commutata fuerant in delirium pae-
phrenitiam, ad ita agrotantem sagittabat ut ab adstantibus
vinci non pot, atq; hāc a mibi invariō die, ruptis p. octa
adstantium viribus ductus in urbem Regensburgam, et nudato
spore viarum fluminis vicini tenens, in aquas jam frigore
conversas, tunc a conjecit aq. feliciori p. tūc
multitudine subquente, tūc rursus in portu versantibus
liberatus, & statim laqueis vincis, ad hospitium ductus, &
attenta erat. Spectaculo tota hāc Civitas, cumq; jam --
viventem periculo fluctuum h. variolae demerato: statim
thalamis qualibet hāc ullo lenum lum notabili deperit
putulari, et quasi nigricante sporis habita compositus fuit,
mox ipsi exhibita pro Cardaca quā solum vix exsuscitata
fuerunt, verum etiam ad sanioram mentem redit p. octum
sp. vergetinis in horis dūm cum invari, ad am obsuri-
delit in muni rebant reliqua, quā circa Julagium parandum

imperavi, Cum aquis Stillaticis, Oronginis et Cardui²¹³ —
Benedicti Flys. japon. alb. 3. vi. et Confect. de hyacinth. —
31. hoc p̄ unum aut alterum dies Continuato, p̄ excrete
Continuata fuisse, donec pland Convictus, exaerbatio et —
anxietatib; agitantis, pravo, succo adesa, i³ vin, et in
Liquorem Confluentes, prescripsi potem Cathartico emetico
attus Levamen attulit, ut variolis ad solitum p̄minum
Pellitū p̄ducat, proba' ego Convaluit: 7 Triplici adhuc
nense alimentis, et libet saturatus, invidit in gravissimam
febrem malignam a fata terminavit. —

Observas 24

anno proximo elapso in decem, variis variolis grassantib; nob.
22. N. subitanea febre Corruptus fuit, cum ardore maximo
maiorior: et intolerabili Capitis dolore. Statim vocatus, prescripsi
v. 5. in doxachio, et cum variolas nondum libere p̄fuerat,
parvi post v. 5. parata fuit p̄o Cathartico-emetico, a
magnum copiam māt. 7 Superiora et Inferiora Elimnavit.
respiratio atq; visus cum splendore summo in luminib;
observarem, et ea quasi inglucescent lymphomata, v. 5.
in tale, et Emulsiōem hanc somni imperavi, simulq; variolas
impudenta nunciari, 7 mediet nocte simul erupere,
mitigata fuisse tunc typhus et lymphomata, atq; ager usq;
ad hypnōticū typh, melius se habere visū ē, verum accio —
ex nob; violentia, 7 quodam Commisso in vultu Errore, —
propinquantē Corruptus fuit phrenitico, a mentem ita ē
collo Tetra bavit, ut violentas vili infere manus Continuo
tentaret, aded. ut Laqueis hūc nova fuerit vincienda: v. 5,

ad succurrendum infarctum Cerebri, illud prescripi, & tunc
 quorū habitum obiter erat nuncius pustularū ut unus aut alter
 chinusque plures sectiones exaret, tandem quasi propolisem
 perregerit. in hīs angustis zhyranam cum emulsiōe paratam
 et continuo hīc et illuc rotandam jussit, & Delisium et ardorem
 compescuit, atq; deis p̄ocem purgatam dānam, cum vini -
 emet. ʒi. in i.º cyathis egrotanti exhibuit, & stupendum prostratus
 effectum, atq; egrotantem & solū imminenti phrenitidis, periculo,
 varum et infarctis variolarū viab. p̄ totum decusum liberavit

Cap. 471. pag. 190.

Cura
millorum

pariter ad Curandos millos. Sicut et variolas viam practici
 communis notant, similemque, nōd iam nūc apparetur
 proponunt, in tertia quidam mutacōe suscipit. Hæc apia, et
 diluentib; atq; refrigerantib; magis in hoc qm̄ in priori affectu
 insinuat jussit, aciq; iam statuto m̄bi prolatio ex hypsirelatis
 viginis, rema una aut altera nūc in drachis aut in tale. secunda
 e, pro imponenti et aucto cerebri infarctū dissimulat, paranda
 deis zhyran cum fol. papav. rhed. et flor. malv. et tringlii
 Decocto origā, deis injiciendum lacina sub sequenti formula. -

ʒi. Decoct. flor. malv. et pariet. t̄b. ʒi. et Commu.

ʒii. ʒi. mel narboxen. ʒi. -

Deperitum aem̄ horis, prescribendum iulapium pro tunc calorū,
 et siccitatis, aut febrili aetis præda

ʒi. aq. lactue. et papav. rhed. ʒi. ʒi. h̄p. papav. alb.

ʒi. aq. naph. ceph. ʒi. vel.

ʒi. ʒi. sem. frigis. murd. ʒiii. ʒi. ʒi. Centuid. in mortar.
 mar. mov. Nūc affundend aq. font. q. ʒi. Couc. adia. ʒi.

De nymphæa

nymphaea Zi. 5 Laud. liquid. gutt. xv. — N. shamensis aut ²¹⁹
— N. phoenicea, aut aegiphonia, ut ensus vigant.
Interdum etiam de effluuiis Compositarum viscerum et fluxu
motum, uterque parat. Cum sem. frigid. de qua etate aq. pro
pota ordinata, deis finitis mellis aut exsiccatis, liquens pro proximanda

2. Sol. Sana. Zi. rh. Solut. et lat. veget. @ Zi. 5. Coq. in
aq. p. 1. q. deis Colet. et sololat. Dissolv. manna.
Calabr. Zi. Cap. Cum regimine. vel si aq. t. 11 —
aut si citate praecorior. praemate.

2. Flor. peric. et melilot. @ Zi. ii. proja in aq. f. ferant.
post. sufficienter infusum Colet. et in Colet.
Dissolv. manna. Calabr. Zi. iii. Cap. Cum regimine
Contra' v. d. Sana mellis diffinilis empuant, Cum debili
pulsu, opore p. motis Convulsivis, facili deoleo, et po. de va
ventriculi, alio agant modo: quippe' omnis provisi reflyant.
de Caridiace deordinata —

2. aq. Scabios. et Card. Oenan. @ Zi. 5. Confect. albam.
et Hyacinth. @ Zi. 5. pulv. viger. Zi. aq. naph. —
Cochl. ii. Cap. paritida dori.

deffluat in eo subsidio viribz, ovis eliminandi et mari —
Nisi, qui deperari obistunt, et qui febres gutturalis —
malignas possent, adeoq. prescripto plus praemate, nisi
periculum sit in mora Cum deceto plantan. Emoll. Cat. 3
aut catholico ad Zi. aut Zi. 5. liquens exhibenda pot. —

2. Sana. manna Zi. i. summit. ab. yanth. et pulv.
Contra. vom. @ Zi. ii. Coq. in aq. p. 1. q. deis
Colet. et in Colet. Dissolv. manna. Calabr. Zi. ii. 5
Zi. iii. pro vana agitantis atate, et pro pro.
2. dori. 1. et add. fast. stibiat. solub. gr. iii. aut iv.
v. v. —

si invicta vacuata, et promptius adhibe. erumpunt mellis,

mobili, pro vario eanthochilia latitantis signis, aut visum videri,
renovantur cathartica, & potes Cardiacae, imò si ultima vigent
angustiae, virus lacteum cum spiritibus, ut supra innotuit
in Theriaca variolarum, tunc unum remedium parandum foret, &
vulgo illam methodum sequuntur mobili, nisi complures fuerit Causae
febris putridae et malignae, cumque, tam processerint, Cauti se frigidiori
aëri aut vento exponant agrotantes: Hinc etiam Cathartici, cathartici
graviorer, tussis importuna, aliq, huius generis tota est et
Poveri. —

Observatio

Virgo huiusmodi Comitatus aetate 20. ann. attingat, atq, iam
aetate quere tunc molestia et quasi continua praesentia, di-
mnis, unius 40. febre acutiori cum calore maximo, et —
viuitate intentionis praesentia pectoris, congesta, bari, iuncta
fuerit intolerabilis capitis dolor, luminum. plendor, et exacerbo
febrili motus, ac a Congestione vniuersae clinurgis, qui venam
Nativam Brachii secuit, atq, motus, virgilem gutturali
febre continuam ratur, pro omni cathartica altaria sic —
Remedia praescripuit, purgata cum alba quadamtenus —
morit, & soliam o habuit ex itum, quippe instantia huiusmodi
nomadiana ea, innotuit lymphatica, tamq, notabilior pectoris
angustia suborta fuerat, ut praeccludendum Brachii spiritus
virgo clamaret, agras in huiusmodi instantia innotuit, et
dignemur oculos. Fulgor, sicut et univerno cutis rubore, peridus,
mobili tunc quere grauantibus in memoriam ad vocis, subitari
tunc illud innotuit, et statim virgilem an virgo, iam mobilis
paria fuerat, & qd instantis et ipso statim plane erat, novam
phlebotomiam Nativam ingruere, et vasa, hor. amulio in cum
Syr. papav. alb. & officinae Levamen attulit, et cum —

Crustina de violentis. Parit orthinea cum dolore gravatissimo, 221
et quibus cruentum deprehensum fuit, et cum maj. dolore cutis,
et quasi in semibili putulari. Et sic, et simul juratis signis, —
mollis, tumori post alteram v. s. illis celebranda, adstrictio —
promuntur, et per seculis et ante ligaturam factam, mollis in
pilis variis prodia, interior vigeant adhuc aequaliter symptota,
et rejecto elytra, repetenda ea verperitis horis v. s. jussu, cui
lucet, novis tumori emulso Quasly. papav. alb. in 1^a dos. et 1^{ya}.
de myng. in 2^a die quente saltem matutinis horis, aqua melius la-
beata visa e, et per pustula et inveniunt, aut numerosiores, saepe
notata, et vasis mediam deserta, inveniunt, aut numerosiores, saepe
supervenunt a oca salubris per seculis atq. agrum viti
et adstantibus, ad Calaria auxilia determinant, et cum
presentia ingebat humana mentis proclio, cum tumi hiea, —
prescripi v. s. in tale, a tumi lucet, ut mollis
matia ad exteriora confluentibus, et vasa et presentia pulvere
illis liberata fuerint, nihil referendum gestura et inde sum-
mi, et diuina semel mollis, penitus huius evanuit, adeo ut
virgo duplici semel nato, quorum unus ois, simul vasis —
obstitit, super nota condidit —

Cap. xxvii^o pag. 194 } Curatio

variolarum lymphaticarum gallicarum,
— a verolle volante

qd Curatio innotat, viti nata committenda e, et si qd molendum
videat, ex his et dictis de variolis cautis deprecatu —

Cap. xxviii^o pag. 196 } Curatio

De macie

qd dicitur quod macie ut plurimum a salugine et prava
viti raa, et hominis vitio, reparanda impedienda, promitti,

Uirio duplicem eam curandi methodum proponemus: igitur si
 Tyris et in humorum acrimoniam contraxerint, propter caliginosam
 constitutionem, tyriam, iuxtaque humectare, oportet humores, si
 aeger fuerit Lactum, Lac eligere dulce et humidum, nutriti dictum
 Potum Luxetantem et refrigerantem facit, iusculi pullo r.
 refrigerant. iusculi Carn. Crum. vis et hor. utat, si vero puer
 sit ablatatur, vescati offis, panatell. Crum. iusculi Carn. si
 Commu. desit syr. papav. alb. Conciliabit, desit Conuenienti, —
 postea iuscula pullo r. aliquot diebus praescribenti. —

¶ pull. iunior. acentur reglate hor. mane in i. Coq. post
 depumatione p. hor. i. in aq. f. i. q. d. via ad. sol. domag.
 apimor. et purp. in. a. Coq. p. hor. i. Colat et exprimit.
 Cap.

¶ q. i. An. frig. mund. iii. amigd. dulc. excoquant per. iii.
 Contund. in mortar. marmor. r. trita affundend. iuscul.
 praescript. adhuc feruat. Colat. et exprimit. Cap. —
 assumptis iusculis p. q. d. diebus, puer sic purgabitur. —

¶ rh. Contus. et tart. solut. @. iii. sem. lin. p. i. Coq. in aq.
 f. i. q. sub fix. Coctione add. sol. malv. sol. orient. @. p. i.
 in Colat. et exprimit. Ziii. Dissolv. man. calabr. 3. —
 ff. pro humectatione regimine. —

Post purgationem aeger sumat p. x. die mane d'albucum domesticum,
 et ab extra Bulbari in lecto collocabit, ubi iuscul. pullo ut supra
 refriget. sumat si humorum desit syr. papav. alb. schil ebite: —

Finis un Bulbari, puer iterum purgabitur et diebus Lacte Caprin.
 aut vacca. abutyrat. si integro utat p. mensura et ultra. si maior
 maxima fuerit, paulatim augesit Lactis desit, donec lacte thien.
 vescati, verum al Lac acorem in 14 diebus contrahat, local ante
 raustum Lactis @. gr. xii. schilure oportet. si maior a debili
 si homacho, cito, Coque et valente procedat, si a instituit, ubi
 i^o casus et puer statim sic purgabitur. —

p[ro]hibe, a retriis fons inibi, v[er]o i[n]q[ue] sensibilib[us] remotis, cum
 auferri oportet, ne humor ibi depositus, a frigore, morbi-
 ultationi & altates, morbum humorem magis inquirat,
 verum si fluxus simul tumores nascenti, aut tumorem manum
 in circa ossum intus sit, topica ip[s]i admove[re], minime
 profuturum e[st] si tr[an]s aliqua admovea[nt]ur, & p[er] initio p[ro]vocat
 ad tumorem depellendum, ea, resoluenda mitia sint, ut
 emplastrum de maculagis, cum emplastro de vigo cum
 melle quadruplicato, Diabotana, emplastr. de lincat[is], de
 sulphore, alia resoluenda fortiora caute & admove[re],
 si lac, v[er]o h[um]ulosa, in tumore latens, et veluti topica p[er]
 actum deducta, gravior evadat et tumor suppuratus d[omi]ni
 accidet, ut i[n] signa suppurationis apparent, illud e[st] optatum,
 et via m[en]s extrahenda facienda, ne ipsa d[omi]ni intus morbum,
 ossa vicina l[es]dat, aut si in lacrimis efficiat, tunc dato
 puri sat amplo l[es]da, ulter[us] detegere oportet, donec n[on]
 visib[ile]s, quibus constitutis emendat[is] l[es]da, p[er]i soluta
 contingat si cario fuerit, p[er]tinet ad expectandum, donec par-
 t[is] ossa cariosa acciderit, quo facto, vulnus paulatim sanabit[ur],
 unguento suppurativo, Odaxum assei mundificativo de-
 ap[er]to, si Labia dura & Callosa fiat, Odaxum calceatum,
 in viride imponat[ur], et si sinus fuerit ob p[ro]p[ri]um situm o[mn]i
 facile ap[er]iendi, injectio vulneraria ab alynthi m[en]s. Centu-
 min. aristoloch. aliisq[ue] similis, detegant[ur]. verum ne gravius
 ulcus fiat, & ut tumor citius curent, vitium igitur
 remediis intus corrigendum, et i[n] p[ri]mis Diata[m] convenientem
 prescribere, in qua praecipua l[es]da, p[er]m comitit[ur] quoniam
 aem[ul]us melioris indolis efficiat[ur], Diata[m] v[er]o plenior erit,

quoniam febris Thymis furit, si tamen ob suppressionem copiam
 aliam latius magis accendat, nec in ea institunda, donec
 febris remiserit, modice cibis age utatur, a plenior victu,
 vasa perficiat, et impuritate, vasa producat, cibi vero
 saligendi et boni succi et facili lationis, ut offa, panatelli
 Curas junior. aaliura assata et Eliza aromatis assalenda,
 ut et saba, pignata, cruda aida assalenda, et ab eo.
 unu. Agnus ultraiorem vis aditatem acquirat, et astringentia
 ab eo vini se abstinere, exaristia fortia fugiat, sicuti aerea
 frigidum humidum et nebulosum, diata sic instituta pueris
 purgabitur. —

℞. Senna mund. ℥i. rh. cont. ℥i. opibim.
 junis. ℥i. sal. tartaric. ℥i. ℥a. deat. polipod.
 querc. ℥. v. ℥a. dat. et ℥. querc. dis. sol. man.
 Calabr. ℥i. f. pro.

℞. aquil. alb. nigris. @. gr. iv. cum thilo —
 Conson. ros. ff. doli. Daglasia. nigr.
 Alend. potum superiorem.

℞. salubria in Rhomacho abundat. tart. stibiat. gr. iii.
 ℞. iv. ad. potum emuncta. tart. vian. salubria, 14. nens
 jussulura. f. x. dies sumend. prescribet. —


℞. rad. chiron. et druse. @. ℥i. enull. campan.
 ℥ii. rh. Contus. in rad. suppon. ℥i. Coq. f. —
 hor. i. ℥a. jussulo pullov. junior. ad. deinceps
 Pol. agrimon. et scolopendr. @. m. i. Bulli
 f. hor. 4. Colet. et exprim.


℞. jussulo. ignota et puro repurgato, quoniam opista f.
 vis x. munda purgabitur.

℞. Croc. must. aperientia ℥ii. Senna mundat. et.

huminum, tyroasa, aquil alb. & hy. op. mixt. gr. x. purgatio instituta
 in medio et fine, diastasis, iucans instituta, ut maj. & novo Culi
 fiat quibus depuratio his oib. supra prescriptis eo ordine facta, —
 patienti spectare oportet, si irrita fuerint, ut etatis et generis
 mutae, quibus vitium corrigat, et tumores sanent, quapropter
 purgationem tunc interdum praescribere: Longiori em. remedior.
 usu, noster hic etiam, ingravescit, qui et se mutaret et genitum
 evarescit, mutata humor. Constituta. verum si suppuratio
 fit, ut ut per magnopere quidem inquirat, et sedem lentam
 ad marasmodum tendentem pariat, tunc duc asininum
 praesertim confect, cui sthomasen pueri, paulatim annexa,
 maj. doxia superpotest, cuius paulatim ejus quoque, doxia —
 angelico, doxia huius fuit vestum, ut lacte pro omni
 cibo versat. nec alius e modis balnorum quibus reparandi
 marasmodum et mortem praecaveri. —

Curaeum
 finis






*Index Capitum
mior.² quoror.²*

Cap. i ^{um} de incommodo graviditatis	pag. 41.
Cap. 2 ^{um} de periculis partu	48.
Cap. 3 ^{um} de iis q ^{ue} supervenire solent infantib ^{us} immediatē post exitum ē sinu materno	53.
Cap. 4 ^{um} de vomitu et singultu	19.
Cap. 5 ^{um} de torminib ^{us} ventris seu colico dolore	23.
Cap. 6 ^{um} de difficili dentitione	31.
Cap. 7 ^{um} de alvi profusio	33.
Cap. 8 ^{um} de alvi adstrictione	41.
Cap. 9 ^{um} de ani deidentia	45.
Cap. x ^{um} de hernia	48.
Cap. xi ^{um} de umbilici proidentia et inflammacōe	53.
Cap. xii ^{um} de intestigine	54.
Cap. xiii ^{um} de Crusta lactea, aschoris, et favo	60.
Cap. xiv. de tinea	64.
Cap. xv. de ptyriasi	67.
Cap. xvi. de Lumbricis	69.
Cap. xvii. de ventris et hypochondrior ^{um} inflacōe	74.
Cap. xviii. de Convulsione et motib ^{us} convulsivis	83.
Cap. xix. de epilepsia	91.
Cap. xx. de Stabismo	99.
Cap. xxi. de Calculo vesicae urinariae, et urinae incontinentia	102.

Index Capitum
mbov. puerorum.

Cap. xxii. de hydrocephalo.	pag. 106.
Cap. xxiii. de rachitide	113.
Cap. xxiv. de aphthi, vesiculis gingivar. et inflammatione tonsillarum.	117.
Cap. xxv. de Variolis	124.
Cap. xxvi. de morbillis	140.
Cap. xxvii. de variolis Lymphatici, gallie <u>La verolle volante</u>	144.
Caput. xxviii de macie	146.
Cap. xxix. de tumoribus thumoris.	148.

finis




Index Curaarum
morbos² pueror²

Curae de incommotis graviditatis - - - - -	pag. 177.
Cur. de periculis partu - - - - -	179.
Cur. de vomitu et singultu - - - - -	183.
Cur. de torminib ² ventris, seu Colica dolore. - - - - -	184.
Cur. de difficili dentitione - - - - -	171.
Cur. de alvi profluvio - - - - -	173.
Cur. de alvi adstrictione - - - - -	177.
Cur. de ani decidentia - - - - -	179.
Cur. de hernia - - - - -	180.
Cur. de umbilici proidentia et inflammatione... - - - - -	181.
Cur. de interstige - - - - -	182.
Cur. de crusta lactea achoris et Pavo - - - - -	183.
Cur. de tineâ - - - - -	183.
Cur. de ptyriazi - - - - -	186.
Cur. de Lumbricis - - - - -	187.
Cur. de ventris et Hypochondrior. inflatione - - - - -	190.
Cur. de Convulsione et motib ² Convulsivis - - - - -	192.
Cur. de epilepsia. - - - - -	193.
Cur. de Stibismo - - - - -	197.
Curae de calculo vesicae urinariae et urinae incontinentia - - - - -	198.

*index curationum
morborum puerorum*

Cur. de hydrocephalo	pag. 199.
Cur. de rachitide	201.
Cur. de aphthis, vesiculis gingivar. et inflammatione tonsillarum	203.
Cur. de variolis	205.
Cur. de morbillis	218.
Cur. de variolis lymphaticis (<u>la verolle volante</u>)	221.
Cur. de macie	idem.
Cur. de tumores thymoris	228.

Finis



*index observacum
morbor.² pueror.²*

Observacō unica de Incommodis graviditatis pag.	134.
observ. de periculis partū - - - - -	164.
observ. de torminib. ² ventris seu colico dolore - - -	168.
observ. de alvi profluvio - - - - -	176.
observ. 1 ^a de variolis - - - - -	216.
..... 2 ^a de idem - - - - -	217.
observ. de morbillis - - - - -	220.

*observacum
finis*



[Faint, illegible text, possibly a list or index, with several lines of writing.]

[Faint, illegible text, possibly a signature or date, with a horizontal line.]



DISSERTATIO

DE

FERRI USU ET ABUSU

IN MEDICINA.

CUIUS VERITATEM, DEO DUCE
& Auspice Dei-*parâ*, in Augustissimo Monspelienſi
Apollinis Fano propugnabit ab horâ octavâ ad meri-
diem, die menſis Junii anni 1736. PETRUS
P O N S Ægidienſis Dioceſis Nemaufenſis, Artium
Liberalium Magiſter, jam dudum Medicinæ Alumnus,
& Univerſitatis Conſiliarius.

P R Æ S I D E

ILLUSTRISSIMO VIRO D.D. ANTONIO MAGNOL
Regis Conſiliario & Medico, nec non in almâ Monſ-
pelienſium Medicorum Academiâ Profefſore Regio
digniſſimo, ac in Senefcalli, & Præſidiali Curia Comite
Honorario.

Pro primâ Apollinari Laureâ conſequendâ.



MONSPELII

Apud FRANCISCUM ROCHARD, Regis ac Uni-
verſitatis Typographum unicum.

M. DCC. XXXVI.



R. R. D. D.
PROFESSORES REGII.

Illustrissimus D. D. Franciscus Chicoyneau , *Cancellarius & Judex , Regi à Secretioribus Consiliis Archiatrorum Comes.*

DISPUTATURI.

- R. D. Franciscus Chicoyneau , *Cancellarius & Judex. Patris Coadjutor.*
R. D. Joannes Bezac , *Decanus.*
R. D. Petrus Rideux.
R. D. Henricus Haguenot.
R. D. Jacobus Lazermes , R. D. Bezac , *Coadjutor.*
R. D. Gerardus Fitzgerald.
R. D. Eustachius Marcot , *Regis Medicus perpetuo Ordinarius.*
R. D. Antonius Fizes.
R. D. Franciscus Sauvages de la Croix , R. D. Marcot *Coadjutor.*

DOCTORES ORDINARII.

- M. Nicolaus Fournier.
M. Petrus Guifard.
M. Claudius Chaptal.
M. Carolus Serane.
M. Petrus Magnol.
M. Antonius Laufel.
M. Jacobus Cros.

ILLUSTRISSIMO

VIRO

D. D. EUSTACHIO

MARCOT.

REGIS CONSILIARIO

ET MEDICO PERPETUO ORDINARIO.

UNIVERSITATIS MONSPELIENSIS

PROFESSORI REGIO

MERITISSIMO

PRACTICO EXPERTISSIMO

FELICISSIMO.

REGIÆ SCIENTIARUM

ACADEMIÆ SOCIO.

PATRONO SUO

ET

COGNATO.

Laborum primitias

D. D. D.

PETRUS PONS

Ægidienſis,



DISSERTATIO

DE FERRI USU ET ABUSU

IN MEDICINÂ.



ACTURUS de Ferri, ac eorum, quæ ex illo parari solent, remediorum usu & abusu; quænam sit hujusce metalli, atque ex eo præparatorum natura, & indoles, prius inquirere, operæ præstium duxi; hinc enim verus eorum agendi modus clarius innotescet, quibus-ve proficere, aut nocere poterint, facilius judicabitur, quippe quæ præter bonos, quos in corpore usus præstant, illa plura quoque mala perpetrare, ii perlepe experiantur, qui hisce medicaminibus inconsultò uti solent: verum ut quæ de illis dicturi sumus, clarius pateant, quædam de metallis in genere præmittere juvat; itaque hanc Dissertationem quinque Paragraphis comprehendemus, quorum primus erit de metallis in genere. Secundus de Ferri naturâ & medicamentorum, quæ ex illo parantur. Tertius de eorum virtutibus & agendi modo. Quartus de illorum usu legitimo. Quintus de eorumdem abusu.

PARAGRAPHUS I.

De Metallis in genere.

I.

Metalla numero sex, corpora ponderosissima sunt, compacta, igne fluentia, ductilia, atque maleabilia: quorum duo, aurum nempe & argentum perfecta; ferrum verò cuprum stannum, & plumbum imperfecta dicuntur.

II.

Metalla ex terrâ *vitrescibili*, atque substantiâ inflammabili omnia componuntur; quippe destructis metallis, nihil præter terram remanet in vitrum facile convertendam, cui substantiâ inflammabili de novo additâ, metallum reviviscit, seu quæ metalli proprietates deperdiderat, terra, easdem exinde iterum recipit. (a) Quæque de metallis imperfectis, ut pote tractabilioribus imprimis intelligenda sunt.

III.

Substantia inflammabilis, quam illust. *Stalh Plogiston* vocat, eadem in omnibus metallis est, ex eodem enim plantarum oleo, aut eadem animalium pinguedine, nam sulphur minerale minus aptum est, cum terrâ convenienti metalla omnia generantur, destructaque reviviscunt. Substantia hæc metallis pro-

(a) Memoires de l'Academie Royale des Sciences an. 1702. 1709. & *alibi*.

ducendis , destructisque regenerandis ex eo præcisè non intervrit , quia inflammabilis est ; tantum enim abest , ut radii luminis , qui omnium corporum caloris , ac inflammabilitatis principium & causa sunt , metallorum partes essentielles fuerint ; quin contra iis speculi ustorii ope collectis destruuntur , atque terra , quæ remanet , in vitrum abit.

I V.

Cùm substantia inflammabilis ex terrâ peculiari pingui & particulis igneis , à quibus ejus inflammabilitas dependet , essentialiter composita sit , parte igneâ ad metalla efformanda atque regeneranda nullatenus aptâ , metalla ex terrâ pingui , quam *Becherus* in Physicâ subterraneâ secundam terram vocat , pondus , malleabilitatem , ductilitatem , tandem formam habere consequens est.

V.

Terra , alterum metallorum principium , *vitri/cibilis* est , pro variis metallis diversa : ex quâ aurum componitur in vitrum abit auro levius. Argentum mediante antimonio , uti aurum in vitrum mutatur. Ferrum parte oleosâ exutum massa *regulina* est frangibilis , ac friabilis antimonio , colore haud absimilis. Terra cupri rubra est , friabilis , quæ pulverata à cinnabari antimonii parùm differre videtur. In stamno terra cristallina est , difficilè fusibilis , quæ in crystallos acicularum instar acutas & aculeis asperas mutatur. Plumbo destructo , substantia *foliata* aut *talcosa* , talci ad instar remanet mollis tactui lævis , pellucida , variisque coloribus distincta , quæque in vitrum abit per laminas , sicuti venetarum talcum dispositum

4

laeve colore flavo-viridi , & variis in punctis subru-
bro. (a)

V I.

Quoniam substantia inflammabilis in omnibus metallis ejusdem indolis fuerit ; metalla nisi per terram inter se essentialiter differre , consequens est ; quibus ab invicem distinguendis , substantiæ inflammabilis cum diversâ terrâ , mixtio non parum interservit ; quippe cum pro variâ metallorum terrâ , substantia inflammabilis variè permiscenda atque connec-tenda sit , diversa composita ex eorum mixtione efformanda fore , nemo non videt.

V I I.

Verùm cum Clariss. Stahl omnium Chymicorum facile princepe „ dissimulare nullo modo debemus „ quod specificatio aliqua planè peculiaris adhuc „ subsit , quæ ita accuratè , & luculenter exprimi non „ potest , quæ nempe generalem illam *vitrisibilem* „ substantiam ita determinat , ut accedente *Phlogisto* „ hæc maximè species metalli , non verò altera enas- „ catur , cui rei , ut satisfaciamus , agnoscimus sanè , „ & consistemur liberè , quod altior quædam diver- „ sitas , & intimior aliqua *mixteria* differentia inter „ terras hæc intercedat , quæ in terrâ quidem *mar-* „ *tiali* (mediante *Phlogisto* in ferrum perficiendâ) co- „ lorem rufum , effectum stypticum , fusionem vi- „ tream bruno - nigram producat in terrâ *veneræ* „ (quæ cum *Phlogisto* in cuprum concrefcit) colorem „ è flavo-brunum effectum plus minus septicum , fu- „ sionem hyacinthino-viridescentem. In terra *Satur-* „ *næ* colorem pallido-flavescentem , saporem cum

(a) Memoire de l'Acad. *ibid.*

salibus dulcescentem, fusionem flavo-gramineam,
 aut à diaphano-rubellam inferat. Unde concludit
 ille in rebus medicis, quàm chymicis, non minùs
 versatus, omnes quicumque de ipso loqui insti-
 tuunt, vix aliter, quam per somnium & tamquam
 phantasma quoddam sensus eludens agnoscere. Ita
*Clar. Stalh in obs. Chymico-physico-medico. cur. mens. Sep-
 tembr. cap. 6.*

VIII.

Plura cum metallis saltem imperfectis, corpora extra-
 nea permixta sunt; ex illis quædam cum eorundem
 terrâ ita naturaliter connectuntur ut ad peculiarem
 horum naturam multum conferre videantur,
 illa enim pro variis terris diversa sunt. Vide Clariss.
Stalh ibid. cap. 5. Utrum corpora illa ad metallorum
 saltem imperfectorum genesis inserviant, hîc inqui-
 rere locus non est: quidquid sit, ab iis metalla illa
 præcipuas suas vires habere eò verisimiliùs videtur
 quòd iis libera, aurum nempe & argentum, ad me-
 dicinam fortasse minimè apta sunt, ea verò quæ illis
 magis abundant, quale est imprimis ferrum ad va-
 rios è corpore morbos depellendos plurimum va-
 leant.

IX.

Dixi metalla perfecta ad medicinam fortasse inepta
 fore, aurum enim non fulminat, nisi quia aquâ re-
 gali in partes tenuissimas erosum est, argenti crysalli,
 & ipse lapis infernalis à nitro hujusce metalli partibus
 integrantibus adhærescenti suas vires deducunt; unde
 patet, quæ de auri & argenti tincturis jactitant *Alky-
 mistæ*, non ab ipsis metallis sed ab adjunctis corpori-
 bus pendere, ac proinde non valde mirum futurum
 esse, sopitas partium solidarum oscillationes illis ex-
 fuscitari, atque humorum lentè progredientium mo-

tum intendi ; tincturæ illæ menstruis salinis vel corrosivis, aut aliis substantiis acribus , vel volatilibus plus vel minus turgent.

X.

Hæc est vera metallorum compositio , de illâ tamen illustr. Boerhaave aliter sentire videtur. Recentiores , inquit ille, (a) suis innixi experimentis, ubique & in analysi & compositione metallorum loquuntur de terrâ, eâque quidem vitrificabili, quæ stabilem daret metallis basim : Verumtamen puto non respondere terram , quam ita de metallis educi statuunt, verâ, nec nomen terræ sensu acurato mereri , enim verò elaboravi ipse (Boerhaave) quam plurimum hac in re, neque talem ibi terram detexi hactenus ... ubinam quæso, perguit ille, terram in iis deprehendi ? an in calcibus horum ? sane omnes hæc vera metalla manent, licet verò insipida calx, tenuis, inodora, aliquando & tritui parens sit ; tamen igne, appositu pulverum, quos reducentes vocant, aliisve artificiis pristinam formam recipiunt : Qui ergo calces pro elementalibus accepisset, terrâ, ille eodem jure levibus hisce artibus terram posset in metalla, quoties vellet, convertere ; quin etiam metalla, ita calcinata per ignis efficaciam, aut per corporum quorundam admixtorum virtutem in genuinum vitrum mutantur, quod de simplici, sincerâque terrâ dici vix posse, quisque peritus facile scit.

XI.

Ideò ergo clari Boerhaave metalla ex terra non componi existimat, quia, ait ille, metallorum calces vera metalla manent ; Itaque si Metallorum calces, naturam nullatenus retinere probatum fuerit, eas non metalla, sed veram terram fore, ex quâ metalla componuntur, evidens erit : atqui in quas (a) Element. Chim. T. 1. de terra.

metalla ope speculi ustorii reducuntur, calces, nullas, quæ componebant, metallorum virtutes retinent. Metallorum, quibus ab omnibus aliis corporibus distinguuntur, pondus malleabilitas, ac ductilitas sunt at verò calces illæ, neque quæ componebant, metallorum pondus habent, neque malleabiles, neque ductiles sunt, ac proinde metalla non manent.

XII.

Præterea num ex qua cum lini oleo fit ferrum, argila terra est? non quidem in igne fixa, sed fluxilis; nam pace tanti viri, quam de terra definitionem tradit, minus legitima videtur; præter illam, quæ in igne fixa est, quæ ideo *calcaria* vocatur; datur & altera, quæ in igne fluit, atque *vitrescibilis* dicitur, quia in vitrum abit, & ex quâ metalla componuntur.

XIII.

Nec dicat clarif. *Boerhaave* metallorum calces terram non fore, quia igne, appositu pulverum reducentium, aliisque artificiis pristinam formam recipiunt, nam mecum clar. *Boerhaave* supponat velim ex terrâ & aliâ substantiâ metalla omnia componi atque ex illis unâ dissipatâ, nihil præter terram remanere, an diceret quod ex destructo metallo remanet, terram non esse, quia ei de novo additâ alterâ quam deperdiderat, substantiâ, metallum primum reducitur? non certè. Ergò etiam si metallorum calces plantarum oleo aut animalium pinguedine, pulveribus reducentibus aliisque artificiis primam recipiant formam, inde terram non fore malè concluderetur.

XIV.

Sed quid in illis stabiliendis diutius immoramur?

num *Helmontius* ferrum construxit ? num illud *Becherus* ex limo & oleo lini effinxit ? num clarif. *Stalh* in præparando spiritu vitrioli idem contigit ? num *Joan. Auguft. Hermann* fimilia expertus eft, cum spiritum falis ex alumine & fale *Ludovici* methodo pararet ? num hac tandem pluries facta leguntur in actis Regiæ scientiarum Academiæ Parifiensis ; fed hæc de metallis in genere fufficiant.

PARAGRAPHUS II.

De Natura Ferri & Medicaminum quæ ex illo parantur.

I

Ferrum rariusque multò chalybs è terræ visceribus extrahuntur. Quæ è ferri fodinis eruuntur, nisi repetitis calcinationibus ac fusionibus, corporibus extraneis sejunctis atque substantiâ inflammabili additâ in ferrum non abeunt, hinc terra propria unâ cum substantiâ illâ oleosâ vel pingui simul unitâ, ferrum plus vel minus purum efformat.

Ex iis patet quæ cum è ferri fodinâ extractis magnete ad fodinarum bonitatem, imò & earum naturam detegendam, tentantur experimenta, parum tuta ac perliapè inutilia esse.

II.

Terra ex qua ferrum componitur styptica est, cum ea distillata sal acidum fundat, ipsa quoque ferri Sco-
bs si per aliquot tempus in aqua ebullierit ; deinceps
filtretur,

filtratur, lentoque igne factâ evaporatione, cryſtalli habentur vitriolicæ. Tandem per quoddam tempus aquæ immerſum ei ſaporem vitriolicum conciliat. Ferrum ergo præter terram & ſubſtantiam inflammabilem, ſalia acida vitriolica continet ex ſubſtantia inflammabili fortasſe, ſed ex terra quo ad maiorem partem prodeuntia. Terra hæc non modo in omni lutoſo & argilaceo fundo diſſuſa eſt, ſed etiam plerarumque frugiferarum glebarum maximam partem conſtituit. Unde rationem habes, quare in omnibus ſerè regionibus ferrum facile paratur; quare in animalium ac plantarum cineribus quam pluries reperitur; exuſtis enim hiſce corporibus, eorum ſubſtantia pinguis vel oleoſa, ſi quæ in illis cineribus fuerit, terræ propriæ unitur quæque in moleculas ferreas abit, ſi non viſu, magnete certè detegendas.

I I I.

Ferri pars inflammabilis ab aliorum metallorum ſubſtantia oleoſa vel pingui ad ſummum quantitate differt; quare verò in ferro quàm in aliis metallis copioſior fuerit; fortasſe, quia in ferri fodinis hæc ſubſtantia magis abundat, ac in huiusce metalli compoſitionem majori quantitate inſumitur, atque terræ illi facilius adhæreſcit: quidquid ſit; ex iis facile intelliges, quare ferri ſcobs ad candelæ flammam accenditur; cur ferrum, quò ſubſtantia illa magis abundat, eò facilius & fortiùs incaleſcit. Hinc etiam calybs cum æquali ſulphuris quantitate, aquâ additâ, ut inde mixtura leviter humeſcat, ferro facilius & multò magis incaleſcit, & paulò poſt æſtuat, unde terræ motûs cauſæ & theoria deducuntur.

I V.

Ex quibus ferrum componitur ſubſtantia ita inter

se cohærent; ut in partes integrantes hoc metallum non solum dividi possit, sed etiam ejus substantiis componentibus ab invicem facillè sejunctis, totum destruat.

V.

Ferrum ergo metallum est omnium imperfectissimum, quod ex terrâ propriâ, acidis vitriolicis plus vel minus refertâ cum magnâ substantiæ inflammabilis quantitate componitur.

VI.

Chalybs ferrum perfectius est, à quo non essentialiter, sed accidentaliter differt. 1^o. "Color, qui in ferro
 „ pallidior, in chalybe verò saturatior & ad nigrum
 „ vergens est. 2^o. Ferrum laxius, flaccidum, facillè flexile & veluti molle est, chalybs autem densior, durior, renitens, & resiliens ab inflexione. Insuper
 „ ferrum valdè citò fragile, & paucis flexuris reciprocis ruptile est, chalybs tenacior & tractabilior.
 „ 3^o. Denique ferrum diffractum crassiusculis veluti
 „ granis aut *foliaceâ* texturâ in crassitie sui cohærescere videatur; chalybs verò tenuiter admodum, & teneris ejusmodi *foliolis* coagmentatus appareat. Ita clarif. *Stalb* in obser. ch. phys. med. cur. mens. Jan. cap. 2. Sed hæc sufficiant de ferri ipsiusque chalybis naturâ, jam de iis quæ ex ferro parantur medicamentis.

VII.

Nec ferri crocos, nec ejus squamas, quas ferri *batituras* vocant, nec *stomama* seu scorias vitreas neque ulla ex ferro residua aqua fortis, etiam concentratissima attingit quidem amplius, ut docente clarif. *Stalb* (a) experti sumus. Ita etiam nec eosdem cro-

(a) Ibid. cap. 1.

cos, nec martis flores, nec ejus sal, nec alia ex illo præparata magnes ullatenus attrahit, quæque experimenta magnete, egimus, quem Princeps Senatûs Montpelienſis Illuſtriſſimus Bon pro ſua Humanitate commodabat, quibus rerum Phyſicarum vir ille ſemper amantiſſimus interfuiſſe non dedignatus eſt. Cùm autem aqua fortis *martialia*, parùm aut nullatenus attingat, atque magnes ea non attrahat, inde ferri, *batituras*, *ſtomama*, crocos, & alia ex illo parata ferrum non eſſe, conſequens eſt, ac proinde fuſionibus, diſſolutionibus & humefactione ſimplici, hocce metallum deſtructum fuiſſe.

VIII.

Quid ergo eſt, quæret aliquis, quod ex ferro remanet? an terra, an ſubſtantia inflammabilis? quænam eſt ejus natura & indoles? terram ſuperſeſſe extra dubium eſt, quippe ſi ſubſtantia inflammabilis ipſi detur iterùm, quod tibi facilè ſuccedet, ſi crocum, aut ſcorias, aut ſquamas cùm carbonibus contuſis per aliquod tempus igni torrueris, quod enim ex illis exurgit novum compoſitum, magnes attrahit ſeu deſtructum illud metallum regeneratur.

Verùm terra hæc acidis vitriolicis ſpoliata non eſt: Perinde, inquit clarif. Bohnius (a) ac ex croco cum corroſivo extrinſeco factò per aquæ aſſuſionem, digeſtionem, ac cryſtalliſationem aliquid vitrioli evocatur: ita ex illo qui cum aqua inſipida paratur, idem expectandum, modo hujus quantitas notabilis, aquæ inſundatur. Sic enim inſuſum hoc filtratum non tantum vitriolicum planè ſaporem linguæ imprimet; ſed ad pelliculam evaporatum cryſtallos vitriolicas exhibebit, exilioris quidem quantitatis, evaneſcentibus

(a) Diſſert. Med. de medicament. Chym. & Galen. præpollent. dubiâ,

forſan & expulſis ſub evaporatione ſibi intertextis volatilibus vitrioli hujus moleculas , quæque nos ipſe pluries experti ſumus , quod poſterius vel hoc innuit , dum limatura martis v. g. in crypta ſubterranea humectata , ſi poſt aliquot ſeptimanas ex retortâ diſtilletur tantum liquoris aquei vitriolum redolentis & cum decocto gallarum nigricantis fundat.

Ex dictis colliges ferri *crocus* terram fore acidis vitriolicis plus vel minus reſertam. Jam ſi quæras, quo mechanismo illa vitrioli ſpecies efformetur? Sal acidum, quod juxta eundem *Bohnum* ſal conſtitutivum ſeu integrale martis eſt , per aquam ſolutum , vel ab igne in fluorem redactum , in ferrum agens ejus terream & inflammabilem ſubſtantias ſejungit, quodque, deſtructo metallo , ſui juris magis factum unâ cum terrâ *crocum* & vitriolum conſtituit.

Quid ergo de ſubſtantiâ inflammabili actum eſt? partim avolavit, unde *crocus* martis aperiens , quàm ferri ſcobs minorem flammam concipit, *crocus* verò astringens & ipſo ferro & *croco* aperiendi multò minus accenditur. Tandem quod ex ſubſtantiâ illa inflammabili reſtitat, à parte terrea ita ſejunctum fuit, ut unum , idemque corpus , ſeu ferrum non efformet amplius.

PARAGRAPHUS III.

*De ferri & ex eo præparatorum virtutibus ,
ac agendi modo,*

I.

Ferrum æque ac ex illo parata medicamina , vaſa obſtructa reſerant , aperta claudunt , ſuppreſſas

evacuaciones restitunt , nimias sistunt , laxatas partes firmant , roborantque ; tandem , ubique partium , eorum operâ , restituto humorum circuitu , corpus morbis pertinacibus liberatur , atque sanitate potitur. Unde tot tantæque proprietates ? quo mechanismo effectus æque diversos hæc medicamenta præstant ? an quia partibus astringentibus , ac resolventibus simul componuntur , quibus , prout indicatum fuerit , solida astringuntur , atque humores resolvuntur ? Verum quo genio ubi humoribus effluxuris vasorum exitus impediendus , aut partes laxatæ firmandæ sunt , partibus resolventibus penitus otiosis , astringentes dumtaxat suas vires exerunt : quave ratione resolvendo tantummodo agunt , quoties humores incidendi , aut vasa referanda futura sunt ? num hæc ut pote planè opposita facillè destruerentur ; seu ab incidentibus divisâ , astringentibus plus vel minus concrescerent , vel jam concreta ab incidentibus dissolverentur.

I I.

Alii dicent ferrum , atque *martialia* , si pauca excipias , ex naturâ suâ incidentia sunt ; ideo autem astringunt , quia humores , aut salia quibus partium solidarum , aut fluidarum cohæsiō plus vel minus soluta est , suis partibus terreis absorbent ; unde non nisi pro datâ occasione astringentia sunt.

I I I.

Ferrum & ex illo parata medicamenta partes terreas continere , humoribus serosioribus , ipsisque salibus acidis absorbendis aptissimas , jam probatum fuit : at illas insufficientes fore , vel leviter attendenti patebit ; ideo humores solvuntur , seu ex quibus componuntur globuli levius inter se cohærent ,

vel quia debilitatâ vasorum vi *systolicâ* minus premuntur, vel quia ab interpositis aliis partibus fluidioribus ab invicem sejunguntur, sejunctique manent: ergo ut primam consistentiam recuperent; si à vasis debilitatis resolutio dependeat; vasa hæc prius firmanda, roborandaque sunt, quod profectò *martialibus* absorbendo non obtinebitur. Ita etiam si ab exuberantibus partibus ferofioribus humores resoluti fuerint, non minus imparia erunt: Et quidem quænam, amabo, ferri, aut medicamentorum martialium dragmas aliquot, uncias si velis, inter & tantam humorum ferofiorum quantitatem proportio? parva certè, ne dicam, ulla est.

I V.

Quo ergò mechanismo ferrum totâ substantiâ exhibitum, aut ex illo varia parata medicamenta interius assumpta vasa obstructa aperiunt, aperta claudunt, laxatas partes firmant, aliosque oppositos inter se producunt effectus? varia ex ferro parata medicamenta ferrum non sunt, substantia inflammabilis à terrâ sejuncta aut in auras avolavit, aut adhuc cum terrâ, prout metallum illud variè tractatum fuit, majori vel minori quantitate admixta manet, quin tamen unum idemque corpus efforment, uti probavimus *ff.* præcedenti, ferrum quoque ipsum ubi interius assumptum est, totum destruitur, uti infra dicturi sumus: ergo non ferri partes metallicæ hos varios effectus præstant, sed quæ ex illo pars terrea vitriolica superstes est, quibus etiam inflammabilis, si quæ superfuerit, aliquatenus concurrit.

V

Et quidem ferri pars terrea ore assumpta & ingel-

ta ut pote vitriolica ventriculi atque intestinorum fibras pungit, irritat, stimulat, atque eis sic aliquoties adhærescit, ut in cadaveribus *martis croci* assumpti, infixi reperti fuerint (a) quæque ut sese ab iis quibus molestantur, corporibus, liberent, illæmet fibræ coarctatæ tenduntur, tensæque magis varios, validioresque motus agunt: Insuper martialium partes vitriolicæ hisce fibris infixæ veluti alia fulmenta eorundem motus sustentant, firmant, adaugentque, unde debilitata solida primam tensionem recuperant, atque validioribus, quas edunt, contractionibus, quibus eorum textus laxabatur, humores exprimuntur, & ab aliis, quibus iterum debilitari possent, tutæ sunt. Quæ de ventriculi & intestinorum fibris diximus, de vasis ad quæ *martialia* pertingunt, intelligenda sunt.

VI.

Ipsos etiam humores *martialia* afficiunt, ipsis permixta primæ consistentiæ eis conciliandæ inserviunt. Jam si quæras, quo mechanismo, illæ *martialium* partes humores fluidiores densant? fortasse, quia horumce humorum globulos suo pondere gravant, unde ad invicem approxinati plus vel minus uniuntur, unitique manent: fortasse, quia eis humoribus interpositæ partes illæ vitriolicæ, per suas peculiare superficies & figuras, eos ligant, efficiuntque, ut eorum globuli strictius inter se cohærentes corpus firmitus efforment. Quidquid sit, id enim scire, parum ad medicinæ praxim confert. Verum inde firmatis nimium laxis corporis partibus solidis, imminutâ vasorum diametro, atque humoribus multò minus fluidis, earundem partium robur adaugetur, humoribus naturalis densitas iursum datur, sistuntur ex-

(a) Panarolus Pentecost. 5. Obs. 324

cretiones nimiae , atque juxta naturalis corporis oeconomiae leges absolvuntur.

VII.

Martialia ut pote quæ partibus vitriolicis plus vel minus referta partes laxatas firmare , humores solutos densare , nimias excretiones imminuere facile certè intelligitur ; verùm contrarios persæpè effectus præstant , humoribus quoque crassioribus primam fluiditatem conciliant , ac præpeditas excretiones revocant , an ne hæc ab eadem causâ , scilicet terrâ *martiali* produci potuerint ?

VIII.

Ita equidem , sed ut hæc faciliùs intelligantur imprimis notetis , velim , humores fluiditatem deperdere. 1o. Si eorum partes fluidiores & aquosiores dissipatæ fuerint. 2o. Si ob validiorem vasorum contractionem compactæ densentur. 3o. Si vasorum textu laxato , debilitatisque eorum viribus , humores in iis torpescant ; inde veluti sibi relictis eorum globuli subsidendo in corpus plus vel minus durum concreverunt. Ferrum & ex illo præparata , nisi in tertio casu convenire probabimus ff. sequenti , seu ubi à vasorum laxitate humorum crassities dependet : & quidem hifce medicamentis , debiles firmatæ partes ad motum expeditiores fiunt , earumque contractionibus , qui in eis torpescabant , humores valide premuntur , propelluntur que , atque eorum globulis minùs inter se coherentibus , ad fluendum aptiores sunt , recuperatæque primâ fluiditate ad vasa usque secretoria appellantur , in illis eò faciliùs secernendi , quòd iidem humores à subsequentiis validè propulsi , atque vasa secretoria , firmiora facta , his humoribus recipiendis , excernendisque aptiora sint ; & ut paucis dicam , ideò medicamenta *martialia* fluidiores humores densant

denfant, eos in vasis retinent atque secretiones nimias sistunt, quia vasa laxata firmant, & aperta constringunt; crassiores verò, si fuerint, dissolvunt, vasa referant, ac præpeditas secretiones restituunt, quia eorundem vasorum motum intendunt, aut ea ita disponunt, ut magis tena validiores motus agere queant.

IX.

Quid ad salia vitriolica confugimus? num ferri scobs etiam tenuissima metalli naturam retinet, quâ variis illis effectibus producendis aptissima est? & quidem ferri partes tenuissimæ in ventriculi & intestinorum fibras impingentes eas irritando tendunt, laxatasque firmant, ac astringunt; tandem humoribus permixtæ eos suâ mole & pondere solvunt, ac vasa in quibus torpescebant, succutiendo, si quæ sint, obstructions tollunt, atque eorundem vasorum motus excitant & adaugent.

X.

Varia ex ferro parata medicamina hujus metalli naturam non retinere, seu ferrum non esse, jam probatum fuit *ff* præced. quæ ergo objiciuntur, de ferro puro & totâ, uti loquuntur, substantiâ, interiùs assumpto dumtaxat accipienda sunt: Verùm præterquam quod ferri scobs salia vitriolica continet, astringendo aptissima; ex quibus hoc metallum componitur, partes ita faciliè ab invicem sejungi possunt, ut vel levi datâ causâ destruat: itaque eodem planè modo, quo ferrum aere humido, aut assulâ aquâ in crocos mutatur ab illo totum diversos; sic etiam in ore, ventriculi imprimis & intestinorum cavo tum ab assumptis liquidis, tum qui ex illarumce partium facie internâ indefinenter stillant, serosis humoribus maximè

alteratur ac penitus destruitur, & eò facilius, quòd aquei illi humores utpotè qui rarefacti textui ferri subeundo aptiores sint; res ita se habere, seu ferrum in ipsis primisviis destrui, eò verisimilius videtur, quòd eisdem, ac *croci*, ferri scobs effectus præstet; præterea ad quantamcumque tenuitatem ferrum limâ reducatur insensibilibus vasorum lacteorum ostiolis subeundis impar fore, nemo haud scit, esto, ex ferro partes integrantes non nullæ in primis viis non destruantur; nonnè illæ utpote summum graves ad anum usque decident, unà cum fœcibus excernendæ? aut si ad vasa sanguinea ac lymphatica perveniant, num ibi in sero calido veluti innatantes penitus dissolutæ totam naturam facillè deperdiderint? denique ex ferri usu maximè si per aliquod tempus exhibeatur, alvus quam sæpe supprimitur, an ex solis & repetitis à ferri particulis, intestinis illatis commotionibus, hanc astrictionem repetes? eas illi inducendæ insufficientes futuras esse, vel leviter attendenti patebit.

X I.

Varios, quos in corpore *martialia* medicamenta præstant usus, ex eorum terra vitriolica pendere jam probatum fuit: verumtamen ferri pars inflammabilis, ipsaque terra absorbendo suum symbolum conferunt. 1o. Substantia inflammabilis, ut pote quæ particulis igneis plus vel minus referta, humorum quibus cum permiscetur calorem & motum adauget, unde vasa magis distenta validiores contractiones edunt, quibus humores fluidiores densantur, & concreti solvuntur; verum quia minimam, saltem quædam, ex *marie* parata, medicamenta hujusce substantiæ inflammabilis quantitatem continent; ideò ad varios, quos *martialia* producunt effectus, parum conferre existimamus: Ita quoque & terra ferrosiores humores absorbet, sed

tam minimâ quantitate, ut exinde qui ab exuberantibus partibus ferolis fluidiores sunt, primam consistentiam ex toto recuperare, impossibile videatur. Insuper, num hæc *martialium* absorbendi vis inutilis est, forte noxia ubi humores crassi & jam indurati sunt? nec dicant salia acida, quibus humores coagulatos supponunt, terrâ *martiali* absorberi; eam quidem salibus in sinu suo recipiendis, prout plus vel minus porosa est, aptissimam censemus; sed quæ de acidis humores nostros coagulantibus passim dicebantur, ut pote quæ incerta, aut falsa obsequere.

Ferrum, uti ex eo parata non internas partes tantum ore assumpta astringunt, roborantque; externas quoque extrinsecus admota firmant, atque tum feri, tum sanguinis excretiones sistunt, tandem deficcativa, styptica & vulneraria tutissima sunt, tot tantisque experimentis comprobata, ut ulteriori probatione non indigeant.

X I I.

Omnibus ex ferro paratis medicamentis eadem astringendi vis non inest, plura etiam ex illis pro variis permixtis corporibus, multò plures alias qualitates habent, necessario inter se distinguendas, ut eorum debite selectus fiat. 10. *Crocus martis*, quem aperientem vocant, illo minùs astringit, qui igne paratus fuit, cujus astrictio eò major erit, quò ferrum igne magis tostum fuerit, unde vitrioli martis calx alba, cinerea magis astringit, rubra verò ferè caustica est, quò vero violentiore, magisque diuturno agitur igne, eò hæc posteriora in eo plus augentur, ut tandem causticus ferè evadat pulvis, (a) 20. Sal, vel vi-

(a) Clar. Boerhaave Operat. Chemic. part. 3. Process. CLXIV.

trium martis, *crocis* magis astringens est. Acidis enim vitriolicis magis turget. 30. Ferrum spiritibus acidis vel in aceto, aut alio liquore acido solutum, nam omnibus acidis facillè solvitur, ob admixta illa acida valdè astringet. 40. Quod in vino solutum fuit, præter vim ejus stypticam ejusdem vini partibus sulphureis & volatilibus humorum rarefcentiam inducit. 50. Cryſtalli tartari *chalybeati* vel *martiales*, vel tartarum *martiale*, præter astringendi vim, alvum quoque solvunt, aliasque promovent excretiones pro evacuantium naturâ, quæ cum illis, aut aliis ex ferro paratis mixta exhibentur. 60. *Mars Diaphoreticus* vel flores salis ammoniaci *martiales* non humorum motum tantummodò adaugent, unde sudor persæpè subsequitur; verum etiam mediantibus salis ammoniaci partibus volatilibus quas continent, partes *martiales*, ad ultimos vasorum mæandros faciliùs adeuntes illa laxata vasa tendunt, eorumque oscillationes exsuscitant, augentque. Plura alia ex ferro parantur, quæ cum in usu minùs sint, aut ab aliis parùm diversâ; ideò iis superfedemus.

PARAGRAPHUS IV.

De Ferri & Medicamentorum martialium usu legitimo.

I.

MOrbo non medeberis, nisi ejus causas priùs removeas; aut sic immutes, ut corpus naturâ vel arte se se ab illis liberet: causæ illæ, etsi eisdem similesve effectus persæpè inferant, ejusdem, quan-

doque naturæ non sunt ; variis proinde medicamentis alterandæ , imò & eliminandæ. Itaque ad cujuidam affectûs curam se accingens , à quâ causâ antecedenti morbus oriatur , imprimis attendat , velim. Quoad verò externas causas , eas citò longèque removendas fore , nemo non scit : causarum autem proximarum cognitio Medicorum ratiociniis , quàm ægrorum solamini multò magis inservit ; hæ enim sub sensus non cadunt , & ut plurimum incognitæ sunt.

I I.

Medicamenta *martialia* humoribus fluidioribus consistentiam , crassioribus fluiditatem dare , vasa obstructa referare , aperta claudere , partes debiles firmare experientia quotidiana docet : verùm quia naturalis humorum fluiditas , à variis causis prætermodum adaugeri , vel imminui potest , atque variis persæpè qualitatibus infecti iidem humores vasa obturant , aut per ea copiosius effunduntur ; sicuti vasorum elater à variis causis planè oppositis quandoque debilitatur ; itaque ut ex *martialibus* medicamentis ægotantes omnia optata emolumenta percipiant , de iis sigillatim , sed breviter differendum duxi , ut cuinam ex illis oppugnandæ medicamina hæc magis idonea sint , rectius intelligatur , ea enim nec obstructis vasis referandis , nec evacuationibus sistendis , nec partibus firmandis , æquè conveniunt.

I I I.

Primò. Humorum naturalis fluiditas à debitâ vasorum , in quibus continentur , pressione , primum dependet , hinc ex quibus componuntur globuli debite , sed non strictius inter se uniti , datâ causâ , vel sibi ipsis relictî ab invicem plus vel minus facile

fecedunt ; in eo enim fluiditatis natura sita est. Præterea cum ex humorum partibus aliæ aliis facilius coherentes, in corpus plūs, vel minus densum abirent, nisi interpositis aliis fluidioribus earum contactus præpediretur ; ita quoque pars serosa necessaria est, undè suam habeant serventque fluiditatem. Ergo humores naturalem fluiditatem deperdunt, seu densiores fiunt, si adaucta vasorum vi *systaltica* uti in morbis inflammatoriis videre est, nimium premantur ; vel prætermodum fluidiores, si eorundem vasorum elater debilitatus fuerit ; sicut in chlorosi, & in febre malignâ quandoque observatur. Denique eorum fluiditas præter naturam adaugetur, si partes serosæ exuberent, vel iis deficientibus, densantur, inspissanturque.

I V.

Quæres nùm humores à causâ externâ interiùs assumptâ vel intrâ corpus genitâ fluidiores fieri possint ; sic sentiunt omnes ferè *Pathologi* & imprimis Chimici : salia falsa, aiunt illi, ut pote quæ ad fermentescendum inepta suis partibus solidis, scabrisque superficiebus quibuscum permiscuntur, humores scindunt, carpunt, divellunt atque fluidiores efficiunt ; idem dicunt de venenis. Salia falsa humoribus solvendis apta futura esse non ambigimus, verùm quia hisce salibus humores rarò turgent, præterea ni in ipsis vasis efformentur, quod maximè incertum est, sub eadem quâ assumpta fuere, formâ usque ad vasa sanguinea difficilè perveniunt. Insuper nùm illa salia humoribus permixta, in quibus includuntur, vasa pungunt, ac irritando tendunt, eorumque oscillationes adaugent, quibus proindè humores magis atque magis densantur.

Quoad verò venena cum omnia acria atque corrosiva fuerint, ut ex rigore, convulsionibus, motibus

convulsivis & id genus aliis symptomatibus inferre
 lieet, humoribus solvendis minus idonea sunt.

V.

Humores à quâcumque causâ fluidiores facti è
 suis vasis saltem quæ iis insunt tenuiora, fluidioraque
 facile effluunt; unde alvi fluxus colliquativus, urinæ
 vel sudoris copiosior excretio; hinc etiam sanguinis
 per nares, alvum, urethram, vulvam &c. effusio:
 verum cave, ne in iis decipiaris; nam humoribus
 præter naturam non fluidis, imò & densioribus; illæ-
 met evacuationes persæpè accidunt. Præpedito in
 aliquâ corporis parte, vel in viciniis humorum cir-
 cuitu, qui appellant, ad vasa liberiora eò majori
 quantitate, & impetu feruntur, quòd in aliis iter
 magis præclusum est; unde si quæ sint adhuc patula
 excretoria, facile effunduntur, aut sanguinea, vel
 lymphatica vasa dirumpunt. Quare autem effusi hu-
 mores, ut plurimum fluidiores fuerint, vel ex vaso-
 rum excretoriorum imminutâ diametro, vel ex di-
 ruptorum exiguitate repetendum est. Tandem,
 quod in humoribus stagnantibus tenuius est, ex-
 primitur.

V I.

Martialia ergo medicamenta præscripturus à quâ-
 nam ex illis causis nimia humorum fluiditas, vel
 adaucta eorum excretio dependeat diligenter atten-
 dat. 10. Si ab imminutâ vasorum pressione: verum
 cum partium solidarum vires deficient, vel quia
 partibus volatilibus humores depauperantur, unde
 lympa nervea minori quantitate à cerebro influente
 partium solidarum tensio subsidit, earumque con-
 tractiones languescunt: vires etiam deficient, si
 exuberantibus in corpore humoribus serosioribus

partium solidarum textus laxetur. Itaque si primum, cum ferrum, nec ex illo parata medicamenta iis non consent partibus, quibus vires refici possint, tunc *martialia* inutilia fore vel leviter attendenti patebit.

Si secundum, seu si serosiores humores solidorum debilitatis causæ fuerint, modò non maximè exuberent, iis enim penitus exhauriendis *martialia* insufficientia sunt, ad medicamenta hæc tanquam ad sacram anchoram confugas, illis enim partium textus firmiori factò earumque adauctà vi *symplicitate* vasa referantur, & humores ex intimo partium textu expressi ad vasa excretoria faciliùs multò pertingunt. Tandem humorum globuli undiquè validiùs pressi magis inter se cohærent, atque prima humoribus densitas certè conciliabitur.

V I I.

Secundò Si ab exuberantibus serosis humoribus adaucta fluiditas dependeat, cum iisdem humoribus absumendis laxatisque vasis firmandis *martialia* sint imparia; ideo priùsq̃am hæc medicamina exhibeantur, evacuantibus, prout indicatum fuerit, si non ex toto, saltem quòdā partem hi humores è corpore eliminentur, aut ut utrique indicationi satisfactorius sis, cum evacuantibus *martialia* simul mixta primum exhibe, curam deinceps *martialibus* simplicibus totam absoluturus. Ita quoque cum humoribus serosis maxima fluiditas inducta fuerit, atque solidorum textus multum debilitatus, *martialium* vires admixtis astringentibus validioribus intendas; nam præterquam quod humores magis adunant, solidis etiam, atque laxatis vasis excretoriis firmatis, humores ad secretoria faciliùs multò appellant, & ex illis copiosiùs effunduntur.

VIII.

Ipsis evacuationibus nimis sistendis *martialia* quæque inserviunt, verum cave ne aberres, plures enim sunt, ut jam innuimus, harum excretionum causæ; ideo autem illius vel alterius humoris excretio adaugetur, atque ipse sanguis è suis vasis exilit, aut in aliena fertur, quia humorum motus vel in vicinis vel in ipsius partis affectæ vasis sistitur, aut summè imminuitur, vitiatur autem ille motus, tum ob eorumdem vasorum infarctum, tum constrictionem, tum ariditatem. 10. Vasa sanguine vel lymphâ obturantur: Si primum, sanguinis adauctam quantitatem repetitis venæ sectionibus in brachio, vel in talo, prout indicatum fuerit imminuatur, & ejus rarefcentia appositis remediis diætæque tenui & refrigerante compefcatur. Tandem si ipse sanguis jam concretus, & in iisdem vasis sic impactus, ut eorum repetitæ pressioni cedere non valeat, sanguinis resolutentia in usum adhibe: Dixi sanguinis resolutentia, hæc enim à lympham incidentibus plurimum differunt: tunc ergò *martialia* inutilia sunt, atque noxia. Si secundum, seu si à lymphâ infarctus dependeat, illa incidenda est, uti infra dicemus.

20. si excretio nimis vasorum constrictione inducæta fuerit, *martialia* tunc noxia futura esse, vel leviter attendenti patebit; indè enim quæ fiebat humorum excretio adaugenda est, vel omnes sistendæ sunt, si ipsa vasa quæ patula erant validè constringantur. Tandem ipsa vasa dilacerantur, atque sanguis vel serum effunditur, aliaque non minus infensa mala subsequutura sunt. Ergo si adaucta humorum excretio ab *spasmo* veniat; martialium locus non est ea tunc proderunt, quæ partes convulsas laxare poterint, sed hæc hujus loci non sunt.

30. Nec etiam minus *martialia* nocerent, si par-

tium textus aridus & siccus fuerit ; quippe vel affectarum partium vasa cum humoribus , quos continent , simul arescunt , vel humoribus plus vel minus vacua exsiccata sunt. Quomodo induratis humoribus prima fluiditas *martialibus* restituenda sit , infra dicemus ; quoad vasa arida & sicca , ni diluentibus & emollientibus prius remollita fuerint , ea humoribus recipiendis transmittendisque imparia fore , neminem in rebus *physiologicis* vel leviter versatum fugit , ac proinde ex ferro parata medicamenta tum nullatenus conveniunt.

I X.

Ergo excretionibus nimis sistendis *martialia* parum vel nullatenus inserviunt ? falleris certè ; nam 1º. si ab exuberantibus humoribus serosis excretio dependeat , aut foveatur , uti supra diximus , multum conferunt. 2º. Si propter vasorum excretoriorum laxitatem fiat , *martialia* ut potè salibus vitriolicis plus vel minus referta ad eadem vasa astringenda , atque firmanda apposita sunt. 3º. Ità quoque conducunt , si à præpedito vel in viciniis vel in ipsius partis vasis laxatis humorum circuitu vel secretionem læsa , excretio adaucta sit ; undè rationem habes cur immodicus catameniorum vel hæmorroidum fluxus , aut aliæ excretiones nimis martialibus atque aperientibus medicamentis quandoque sistantur. 4º. Tandem à quâcumque causâ excretio adaucta dependeat , pro dato tempore profunt , sed de iis fusius in sequentibus.

X.

Ex dictis sequitur , *martialia* in prætermodum adauctâ humorum fluiditate , aut excretionibus ni-

miis tutò præscribenda futura esse dumtaxat. *Primo* quotiescumque præternaturalis fluiditas à debilitatâ partium solidarum vi *systalticâ* dependet. *Secundo* vel ab humoribus serosis exuberantibus. *Tertio* cum excretiones ob laxatum partium tonum copiosiores sunt. *Quarto* ad solidas partes firmandas, modò vires earum nec oppressæ, nec ab exhaustis humoribus debiles fuerint. Undè patet, martialia in omnibus corporis affectibus ab iis causis pendentibus fore summè proficua.

X I.

Secundo Quemadmodum humorum fluiditas præter naturam adaugeri; sic quoque iidem humores variis causis densari queunt. *Primo* Si eorum pars serosior & aquosior deficiat. *Secundo* Si in quibus continentur, valis validius premantur. *Tertio* Si laxato partium *extu*, veluti sibi ipsis relictis humorum globuli ad invicem subcidentes plus vel minùs strictè cohæreant. In primâ densitatis specie *martialia* medicamenta maximè noxia fore, quis non videt? certè quidem diluentibus solùm hæc deperdita fluiditas recuperari potest. Nec minora parerent incommoda, si à vasorum pressione densitas suboriretur, quæ laxantia sunt, dumtaxat proficua futura esse, experientia docet.

X II.

Ergò nisi humorum densitas à tertiâ causâ inducta fuerit, *martialia* tutò exhibere poteris; modò etiam partis, in quâ illi humores stagnant, natura & variæ ejus affectiones non contraindicent; quippè humorum hærentiam, quam etiam induratio subsequuta est, vel inflammatio aliquoties præcessit, vel

ei supervenit, & ulcus quandoque partem affectam depalcitur; quantum autem *martialia* tunc nocerent, nemo non videt. Tandem ne in re aliunde summè difficilè, atque ne maximo ægotantium damno decipiaris, ad humorum etiam stagnantium, vel extravasatorum duritiei gradum diligenter quoque attende: *martialibus* vasa firmata magisque tena validius contrahuntur, quorum motibus, si indurati humores non cedant, ipsa vasa, geminatis ictibus solvuntur, aut in iis maximè constrictis, humorum circuitus plus vel minus præpeditur; undè partis affectæ dolor, inflammatio, ulcus, gangræna. Preterea in partibus vicinis humorum motus quoque vitatur, lymphæ vel sanguis è suis vasibus erumpunt, aut feruntur in aliena.

XIII.

Ergò si cujus curam susceperis, affectus ab induratis humoribus dependeat, aut foveatur, *martialia* prius non exhibeas, quàm eosdem remollieris; quippe emolliti ac minùs compacti vasorum oscillationibus faciliùs cedunt, atque propulsi vel in vasa continua fluunt, aut per patula excretoria effunduntur. Quæ de humoribus in aliquâ corporis parte induratis, seu de scirrho lienis, hepatis &c. diximus: ea etiam de humorum in cæteris corporis vasibus ipsitudine accipienda sunt.

XIV.

Verùm si nihil contraindicet; seu si humores nec nimis indurati, nec vasa arida, nec maximè tensa fuerint, à *martialibus* curam tutò susceperis; sic experientia docet, ut & ratione confirmari posset. Nam hisce medicamentis vasa firmata ac validius se se con-

trahentia eisdem humores premunt, atque ad vasa capillaria utque propellunt, ubi eò magis, uti docet Physiologia, solvuntur, quò illamet vasa minora fuerint.

X V.

Denique cum æquè sanguine, atque lymphâ viscera maximè lien, imò & omnes corporis partes infarciri possint, seu humores omnes in vasis vel extrà vasaplus vel minus densati indiscriminatim hære ac stagnare, quibus *martialia* non æque conveniunt, idèò quibum ex illis torpescit, maximè distinguendum est. Qui à sanguine est, non *martialibus*, quæ tunc summe nocentia forent; sed propriis incidentibus infarctum tollere opus est quâ autem methodo à lymphâ producto infarctui mederi oporteat, jam diximus.

X V I.

Ex dictis colliges. *Primo*, *Martialia* non convenire, cum à dissipatis humorum partibus serosioribus, vel nimâ valorum prelsione densitas dependet. *Secundo*, nec ubi partes solidæ nimium tensæ, aut aridæ fuerint. *Tertio*, Ea dumtaxat proficua fore, si propter laxatum partium textum humores torpescant, modò nihil contraindicet: Contraindicant autem humorum durities maxima, partis affectæ natura, ejus sensibilitas adaucta, inflammatio, ulcus &c. *Quarto*, Ut hæc medicamenta tutò exhiberi possint, humores indurati prius emolliantur, atque vasa laxata sint. *Quinto*, Nec sanguinis densitati, nec infarctui à sanguine, sed à lymphâ inducto, ferrum & ex eo parata prodesse; undè rationem habes, quare vasa obstructa referant, scirrhus tollunt, suppressas

evacuaciones restituunt, humoribus deperditam fluiditatem conciliant, atque eorum operâ humorum motus, ex quibus vita & sanitas dependent, juxta naturalis œconomix leges absolvuntur.

XVII.

Ad quid tot & tantæ distinctiones? an ne suppresso catameniorum fluxui, & aliis excretionibus restituendis, *martialibus* aptiora remedia inventa sunt? nulla sanè præstantiora modò indicata fuerint; verum semper non indicantur. Catameniorum fluxus & aliæ humorum secretiones ac excretiones, uti jam expositum fuit, vel propter vasorum secretoriorum & eorum quoque, ex quibus pars affecta componitur, spasmum, aut ariditatem imminuuntur, & ex toto aliquoties præpediuntur; quandoque propter lympham summè indurata. An iis ritè prius non distinctis à culpâ abfuturus eris? vel minimè, martialibus vasa rigida magis coustringentur, ficca penitus arefcent. Item si à sanguine vitium oria-
tur, partis affectæ sensum intendes, inflammatio superveniet in ulcus insanabile citò mutatura. Taceo varia alia, quæ exindè mala subsequi solent, quæque heu nimium? experimentis comprobata sunt, sed de iis fusiùs ff. sequenti.

XVIII.

Quibus inter morborum causas debellandis, aut alterandis *martialia* medicamenta conveniunt, definitum est: quæ ex illis pro dato affectu magis proficua fuerint, & quomodo iisdem uti oportet, superest inquirendum; in illis etiam multum peccatur. Ex ferro parata medicamenta alia aliis plus vel minus attringunt, atque pro eorum, quæ cum illis

admixta exhibentur, naturâ, plures alias qualitates habent, Medico dignoscendas; sed de iis jam egimus ff. præcedenti. Quænam inter illa diversis corporis affectibus sanandis aptiora sint, breviter inquiremus. Itaque 10. ubi partium textus maximè laxatus est, atque humores vaforum ictibus faciliùs cedere possunt, ea exhibenda sunt, quæ magis astringunt; qualia sunt *crocus martis* astringens, vitriolum *martis*, tincturæ, & ferrum in aceto, aliisque liquoribus aut spiritibus acidis solutum. 20. Si minùs astringendi indicatio fuerit, *crocus martis* aperiens, ferrum limâ in scobem tenuissimam redactum, imprimis in usu sint. 30. Ferrum in vino solutum partibus vini sulphureo-volatilibus, quas secum permixtas habet, humorum rarefactionem intendit, sopitos spiritus exsuscitat, atque eorum secretionem promovet; ideo tunc feliciter præscribitur; si unâ cum partium laxitate vires exolutæ fuerint. 40. Si alvum ducendi intentio sit, atque minùs astringere oporteat, crystalli tartari *chalybeati*, & tartarum *martiale* solubile præ aliis concinnentur. 50. Si sudoris promovendi necessitas fuerit, aut læsa perspiratio promovenda, atque intimi partium contextûs vasa firmanda, referendaque sint, flores salis ammoniaci *martiales* has indicationes tutò adimplent. Verùm cave, ne iis humorum motus atque corporis calor maximè intendatur, ut hæc avertam, in magnâ aquæ quantitate solutos hos flores exhibere soleo.

XIX.

Quæres an ferrum ipsius croco aperiendi præponendum sit? sanè quidem, modò in scobem tenuissimam fuerit redactum, & ubi minùs astringendum est. 10. In scobem tenuissimam reducendum est; alioquin nec in ventriculo, nec in intestinis debite solutum, & ut pote summum grave citò per anum ex-

cerneretur. 20. *Croco* anteponatur, si minùs astringendi intentio fuerit. *Martialium* vim astrictorim à salibus vitriolicis, quibus plus vel minùs abundant, pendere probatum fuit; ea autem salia eò majores vires exerunt, quò à substantia inflammabili magis sunt expedita; at quia ferrum, uti probat ejus major inflammabilitas, substantià illà inflammabili *croco* magis turget, ejus acida minùs libera, minori etiam vi agunt: contrà verò in *croco*, ubi sui juris magis facta multò magis astringunt. Ex quibus patet chalybem ferro etiam minùs astringere; quia majorem substantiæ inflammabilis quantitatem continet, fortè, quia illa salia ob strictiorem chalybis compagem, quàm in ferro, minùs ad agendum expedita sunt. Quibus adde ferri, sed imprimis chalybis scobem ut pote *croco* graviorem è ventriculo & intestinis citiùs multò decidere. Ergò quotiescumque minùs astringendum futurum erit, ferri, & chalybis scobem *croco* tutiùs exhibebis. Insuper scobis usu, non mala solùm effugies, quæ ex ferri paratis persæpè inferri solent, sed eò tutiùs ages, quòd veluti per gradus egeris.

X X.

Ita quoque pro varià indicatione, cum aliis medicamentis ferri varia præparata exhibentur. 10. Si non astringendi tantùm, sed etiam demulcendi & nutriendi indicatio fuerit, ut in inveteratis alvi fluxibus, aut aliis evacuationibus immodicis, unà cum lacte, vel sero lactis vel jusculis ex juniore pullo galinaceo paratis *Martialia* feliciter dantur. 20. Vel cum resolventibus, uti cichorio silvestri, fumariâ, nasturtio aquatico, apio palustri, chærefolio, asellis, aquillâ albâ, æthiope minerali &c. Si humore, incendiendi sunt & per vias urinarias excernendi. 30. Vel cum cardiacis, si vires verè debiles refocillandæ. 40. Vel

Vel eum ipsis narcoticis, ut quæ astringendo produ-
cunt, aut adaugent, mala avertantur. 50. Vel
cum catharticis, ut exuberantes pravi humores per
anum eliminentur. 60. Tandem cum remediis appro-
priatis, prout indicatum fuerit.

XXI.

Quomodò, seu quâ formâ & dosi *martialia* exhi-
benda sint, inquirendum superest. Unâ cum aliis
medicamentis pro datâ indicatione præscribenda fore
jam dictum fuit; tunc ergo sub eâdem formâ, quâ
illa remedia dantur, etiam concinnanda. Quæ si so-
la in usu sint, ea vel in aquâ ad ptisanæ formam,
vel in vino soluta, vel in jusculeo convenienti, vel
in decocti appropriati cyatho uno, aut altero, vel in
offâ primo cochleari, vel manè superhauriendo, aut
lac, aut serum lactis, aut jusculum, aut apozema. Vel
ferrum candens in lacte, vel lactis sero extinguitur.

XXII.

Quoad dosim. A minori semper exordiaris, ut ad
majorem tutò progredi possis, plures à magnâ dosi
malè se habere observatum fuit, qui à minori sanati
sunt; Ideò ne aberres, & morbum & ægrotantium
temperiem, ipsiusque partis affectæ indolem prius
confule. Verùm si parvâ dosi exhibeantur, quod sem-
per tutius erit, iis per longum tempus uti necessum
est; unde patet quare aquæ minerales vitriolicæ, quas
martiales aut ferrugineas vocant, etsi ferrum purum
non contineant, illæ enim aquæ à terrâ propriâ ferri
acidis vitriolicis plus vel minùs turgidâ suas virtutes
habent, unde inquam, tot tamque gravibus affecti-
bus sanandis ipso ferro, atque ex eo paratis multò
magis sunt accomodatæ; quin tamen credas, omni-

bus morbis debellandis aptas futuras esse, uti illis, qui de aquis tractant dicere solemne est; quippe si illis fides adhibenda foret, nullos ex corporis affectibus insanabiles diceret: at aquæ minerales, uti alia medicamenta, nisi pro datâ indicatione prolunt.

XXIII.

Qui in vasis humores stagnant, maximè si concreti fuerint, circulationi plus vel minùs inhabiles sunt: veluti totidem corpora humoribus extranea haberi possunt; quæque proinde, si *martialium* ope fluiditatem adeptæ, ad alia vasa cursum rursùs dirigant, humorum quantitatem adaugent, eosque, pro suis qualitatibus variè inquinant; unde mala prioribus pejora quàm sæpe oriunda: ut ergò tot tantaque, quæ exinde imminet, incommoda avertantur; ni soluti humores per ejusdem partis vasa excretoria foras erumpant, è corpore variis additis evacuantibus eliminantur. Dixi variis additis evacuantibus; nam, cum juxta divini Senis Consilium eò tendere oporteat, quò natura vergit; vergit autem, seu superfluos illos humores vel ad renes, vel ad alvum, vel ad cutim &c. propellit è vasis egerendos: Itaque diuretica, vel cathartica, vel diaphoretica, aut sudorifica, vel alia evacuantia prout indicatum fuerit, *martialibus* utentibus identidem exhibeas, & quoties visum fuerit, iteranda.

Sic etiam humorum hærentium excretionem promovebis; si iisdem humoribus jam solutis, vasa per apposita remedia ad excernendum prorites. Sed hæc hujus loci non sunt. Verumtamen cum nonnullis ne sentias, velim, *martialia* assumpturos evacuantibus semper prædisponendos futuros esse; nam ferosi humores exuberant, vel in vasis veluti infixi plus vel minùs concreti sunt. Si primùm, non unâ vice, sed pluries, etiam cum martialibus evacuantia convenien-

tia exhibeantur. Si secundum, expecta, dum iidem humores *martialium* operâ ad fluendum apti sint; alioquin nulla, vel irrita, fortè noxia evacuatio lubsecutura est.

PARAGRAPHUS V.

De abusu Ferri.

I.

IN erroribus, qui in ferri & *martialium* usu, committuntur, enumerandis, multum non immorabimur, eò enim frequentiores atque majores sunt, 1^o. quòd hæc medicamenta præ omnium manibus sint. 2^o. Quòd morbi, aut eorum causæ, quibus debellandis conveniunt, haud facillè distinguantur. 3^o. Quòd, quæ perpatrant, damna difficillè resarciri possint.

II.

Ille morbis tutò debellandis aptus est, qui cognitâ priùs corporis œconomiâ, morborum, quibus in vitæ decursu corpus humanum obijcitur, genium, seu quibusve signis se primùm monstrant, quomodo intenduntur, ac remittuntur, atque terminari solent, à Magistris peritioribus, Auctorum selectiorum lectione ac propriâ experientiâ didicerit; ita & causarum cognitio non minùs necessaria est, medicinam facturo: quantopere ergo, qui nullis Medicinæ principiis imbuti, nec morborum historiam novere, nec audire, illi ferrum & ex hoc metallo præparata exhibentes decipiuntur, aliosque decipiunt, & eò fre-

quentius, quòd eadem illa medicamina ad omnes permixtè morbos adhibeant. Adeò frequens est *martialium* usus, ut illa, Medicinam universalem crederes.

I I I.

Quantæ difficultatis fuerit, & morbos, ac eorum causas, quibus oppugnandis *martialia* conveniunt, dignoscere, facile patebit ex nostræ Dissertationis lectione: ergo quot & quantæ ab iis culpæ committuntur, qui nullâ morbi, causarum, ægrorum temperiei, aliarumque circumstantiarum habitâ ratione hæc medicamenta, alioquin optima, exhibent: & sanè cum hæc sit *martialium* natura & indoles; ut partium solidarum astringendo vires intendant; nam uti experienciâ constat, illa noxia futura sunt, ubi partes illæ nimium tensæ, aut aridæ, vel humores partium serosarum jacturâ, vel validiori vasorum pressione indurati fuerint? uti etiam, si quâcumque aliâ causâ summè concreti vasorum ictibus cedere non valeant.

I V.

10. Partes spasmo detentæ *martialium* acidis vi-
trioticis valdè instimulatæ magis atque magis tenduntur: atque convulsæ rigescunt; unde ad se se contrahendum ineptæ, propellendos humores retinent, ac pressione densant. Insuper humorum colis etiam constrictis, secretiones suppressæ manent, ac quæ adhuc vigeant, ex toto sistuntur; unde febris accenditur, facies rubet, totum corpus aestuat, diruptis vasis, sanguis impetu exilit, aut aliò diver-
tentes humores in vicinas cavitates irruunt, ibique collectis, hydrops supervenit, vel corporis habitus cachecticus fit, si serum in vasis intra textum cellu-

larem repentibus, vel in ipsis cellulis stagnet.

V.

20. Nec minora subsequenter incommoda, si aridis partibus solidis, medicamenta martialia exhibeas; partes illæ, quibus remolliendæ erant, humoribus jam destitutæ, vitriolicis acidis magis exsiccata arefcunt. Unde earum motus languescit magis, atque humorum fluxu inhibito, excretiones intercipiuntur, vasorum infarctus adaugetur, humores magis indurascunt; unde hydrops, febris lenta & alia insensibilissima mala superveniunt.

VI.

30. Vasorum ictibus eò minus humores pariunt, quò magis indurati sunt; hinc maximè errant illi; qui iisdem humoribus necdum remollitis, martialibus utuntur: sanè uti ff. præced. dictum fuit, Medicamina hæc vel humores inordinate solvunt, vel in eisdem humores, irritis resiliunt ictibus, quibus vasa vicina validè commota varios motus edunt, ac convelluntur, in illis & in remotioribus humorum motus intenditur, rubra cum albâ sanguinis pars in arterias lymphaticas irruit; ibique stagnante, Inflammatio accenditur, quam ulcera insanabilia, subsequuntur, vel humorum induratio nullis diluentibus emollienda; insuper plura alia mala subsequi, aut concomitari solent; scilicet, febris in lentam terminanda, partis affectæ dolor, scirrhus facilè mutatur in cancerum, hydrope aut marasmo vita cum morte commutatur.

V I L

Si ergò plurimùm errant, qui martialibus utuntur in omnibus affectibus spasmodicis, passione hysterica, affectione hypochondriacâ & quocumque alio corporis affectu convulsivo, sicuti in partium ariditate, hæmoptysi, saltem ratione morbi; nam ad horum-ce affectuum causas nonnullas alterandas, immutandasque, quandoque aptissima fore nos felix usus persæpe docuit: verum cave, dum causas arcere niteris, ne qui ex illis dependent, morbos exasperes; ideo tutiùs ages, si variis illis indicationibus simul satisfeceris.

V I I L

Inde etiam vides, quàm noxia fuerint hæc eadem medicamenta in cancro afflictis, vel internis ulceribus laborantibus. Ipsa intemperies sicca & calida martialia aut respuit, aut si illa exhibendi indicatio fuerit, nisi summâ cum prudentiâ ea adhibeas, faciliè certè lædes.

Ex dictis quoque rationem habes, quare jam sensilem nimis ventriculum invertunt, intestina doloribus torquentur, bilis acrior excernitur, alvus astringitur, totum corpus flavescit, aut exanthematibus figurâ, magnitudine, colore, ipsoque dolore diversis aliquoties infectum est, vel macie absimitur &c. Taceo varios, qui circa dosim errores committuntur. Sed quid plura, eo enim in martialibus præscribendis frequentius peccatur, *quod difficillimum sit*, ipso attestante Illustr. Stalh (a) practico felicissimo, *martialia ita administrare, ut ille, etiam regulis perspicuis, circumscriptis, erroribus & ambagibus eventibus, nullus*

(a) Ars sanand. cum Expectat. c. IV.

aditus pateat, aut locus relinquatur: qualis autem circumspectio, discretio, & peritia, ab illis numquam sperari, nedum expectari potest, qui toti in hoc remedii genere obhærentes, neque morborum genium agnoscunt, neque adhibendi aliquam methodum comprehendunt.

IX.

In *martialibus* facilè erratur, difficiliùsque multò, quæ inferunt, damna refarciuntur. Etenim hisce medicamentis nimium constrictæ aut summum aridæ corporis partes, difficillimè laxantur & emolliuntur, ex illis, quos accersunt, morbi quàm plurimi, aut remediis exasperantur, aut omnem persæpè medicinam respuunt: quem latet ulcera, caneros, febrem lentam & hecticam, hydropem &c. quæ ex illorum abusu oriuntur, insanabilia futura esse.

X.

Ne ergò circa *martialium* usum aberres, tibi nunquam excidat, *martialia* astringendo præcipuas suas vires exerere, eaque dumtaxat convenire, cùm partes laxatæ firmandæ sunt; quæque proinde jam nimis tensas, rigidiores efficiunt, earum intendunt motus, atque aridas magis exsiccant. Nam uti suo loco probatum fuit, *martialia*, acidis vitriolicis plus vel minùs turgent, ferri autem partes integrantes ostiolis vasorum lacteorum subeundis impares sunt, atque ex hoc metallo parata ferri naturam exuere, ipsique *eroci* modò ritè parati fuerint, terra sunt acidis vitriolicis plus vel minùs referta: quod si uti sæpè contingit, quia *Pharmacopolarum* aut incitiâ, aut incuriâ non concinnè elaborati sunt, quasdam partes verè metallicas retineant, interiùs assumpti, aut ex toto destruuntur, aut per anum partes illæ metallicæ excernendæ sunt. *Exustum ferrum, squamas*

ferri, seu batituram benè perustam, & omnis martis crocolum præcedentibus solutionibus, & subjunctâ uestione, paratos, non magis tangit aut commouet Magnes, quàm paleas & stramen. Ita Illust. Stalh. (a)

Quantacumque gravia fuerint, quæ ex intempestivo martialium usu, mala sublequi possint, ex iis optata comoda ægrotantes percipient, modò morbis, eorumque causis ricè distinctis, habitoque prius temperierum, aliarumque circumstantiarum respectu, exhibeantur: totidem remedia tonica sunt, quæ laxatas partes firmando, humoribus fluidioribus consistentiam; crassis, spissis & nimium consistentibus fluiditatem conciliant; unde languentium humorum motus in integrum restituitur, functiones debite exercentur, atque sanitas restituitur.

(a) Obser. Ch. Phys. Med. cur. mens. Septemb. C. 5. & Experim. Obser. & Animad. N. XVIII.



ERRATA.

P Ag. 8. lin. 6. hac. *leg.* hæc. lin. 20. visceribus extrahuntur. *leg.* visceribus efformata extrahuntur. l. 25. unitâ. *leg.* unita. p. 11. l. 2. ullatenus attrahit. *leg.* ullatenus, vel parum attrahit. l. 12. metallum destructum. *leg.* metallum plus vel minus destructum. p. 24. l. 10. textus. *leg.* textu. p. 25. l. 34. poterint *leg.* potuerint p. 27. l. 20. subcidentes. *leg.* subsidentes. p. 20. l. 12. præterea *leg.* præterea. p. 30. l. 21. coustringentur. *leg.* constringentur p. 32. l. 2. astrictorim *leg.* astrictoriam.

Le recueil périodique d'observations de
médecine chirurgie pharmacie &c. par M.
vandermonde Docteur Regent de la Faculté de
médecine après imprimé au Sudroit che-
vement rue St. Severin a d'ange continuera la-
1^{re} fois les observations qui auront directement
raport aux maladies, & vandermonde la physiologie
pathologie, hyg. & sém.

Dans la 2^e partie on traitera des découvertes
anatomiques et de tout ce qui concerne la
chirurgie rationnelle & l'instrumentale.

La 3^e partie renferme l'histoire naturelle
la chimie & la pharmacie.

Enfin, on finira par les thèses, jurements, coutumes
après Montpellier et autres, d'ailleurs, écoles de France,
des lettres manuscrites et pièces fugitives qui tendent
directement ou indirectement à la médecine chirurgie &
pharmacie.

Paris par l'impression 747. pl. 12. vol.
et 678. par M. de M.

731NS

ΔCD

